

COMMENTARII  
DE REBUS  
IN  
SCIENTIA NATVRALI  
ET  
MEDICINA  
GESTIS.



VOLVMINIS XXIII. PARS II.

---

LIPSIAE MDCCLXXIX.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Londini apud Fr. Elmsly. Edinburgi Io. Balfour. Lugd. Bat. ap. Fratres  
Luchtman. Parisiis Barroï senior. Venetiis Io. Bapt. Pasquali. Milano  
Ios. Galeazzi. Augustae Taurinor. Laurent. Giraud. Holmiae  
Magnus Sweterus.





I.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc.  
Par. Mr ROUX. Tom. XLIII. à Paris 1775. 12.  
pag. 576. Tom. XLIV. ib. eod. pagg. 576.

i. e.

Diarium ad medicinam, chirurgiam, pharmacia-  
m etc. pertinens, Auctore ROUX, Tom.  
XLIII. et XLIV.

**M**ore consueto per singulos indicabimus men-  
ses sequentia. Igitur:

*Mensis Ianuarius:*

P. 3.

1) Cl. BERNH. PEYRILHE dissertatio acade- P. 7.  
mica, de cancro, quam alibi \*) recensuimus.

2) DUPLAN observationes de duabus pleuriti- P. 19.  
dis speciebus, quarum altera in iuvene viginti quin-  
que annorum repetitis venæsectionibus in pede,  
altera vero in femina triginta trium annorum, cum  
diarrhoea, ventris duritie, borborygmis et tormi-  
nibus vehementibus coniuncta, per venæsectionem  
in brachio dextro, ptisanam et cantharides  
in suris applicatas, sublata est.

3) POMMEL observatio de variolis confluen- P. 28.  
tibus, quas leniora sequebantur symptomata, cu-  
ius rei causam fuisse hanc censet Cl. Auctor,  
quod puer ante aliquot dies ferro candente alte-  
rum læserat crus, quo facto vehemens inflamma-

N 2

tio

\*) v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 689.



tio suppuratioque accedens materiam variolosam ipsi subtraxerat morbo.

P. 30.

4) Epistola Cl. MAUDVYTI DE LA VARENNE de quadam peculiari variolas transplantandi ratione. Concernit illa potissimum morem inter Chineses receptum, quo crustas variolosas siccatas et in pulverem redactas ope gossypii indunt naribus, atque contagium variolosum sic producunt. Observationes variae illustrandae rei propositae inseruiunt.

P. 37.

5) Relatio de quatuor hominibus suffocatis in gypsi fodina, Auctore Cl. ROCHARD; purificandi quippe aëris causa suffumigia cum ligno iuniperi quod comburebatur facta erant, quae tamen aëris raritatem efficiendo, exhalationibus noxiis, maiorem conciliarunt noxam.

P. 48.

6) Cl. BANAV observatio de suffocatione a vaporibus carbonum. Cl. BANAV cuidam abbati suffocato auxilio fuit, vestimenta ei exuendo, aëri liberi illum exponendo, ac humectando corpus aqua frigida. Abbas in vitam reuocatus statim avidissime oxycratum potavit, ac vires aceti vinosi in ipso paroxysmo naribus frequenter admoti, quibus se quam maxime sensit levatum, refocillatumque, admodum laudavit.

P. 51.

7) Epistola ad Auctorem huius diarii a GAUTHIER de methodo hernias cauteriis curandi; duobus enim exemplis egregium huius remedii usum declarare confirmareque studet.

P. 64.

8) Observationes Cl. BOURIENNE de abscessibus in musculorum abdominis interstitiis. Tria exempla hic commemorantur, quae ab externa quum erant causa, felicem habuere euentum. Verum eiusmodi abscessus, si iusto serius deprehenduntur funestum augurari sinunt exitum, quia pus vel peritonaeum transire, vel sese in contextu celluloso diffundere solet.

9. Epi-



9) Epistola Cl. BECHEREL *de gutta serena feliciter sublata*, a subitanea mensium obstructione hoc malum ortum erat, eique saepius repetitis venesectionibus medebatur. Simile exemplum legitur apud SCHARSCHMIDIVM \*).

*Mensis Februarius:*

1) Cl. PLANCHONI observatio *de fluxione catharrhali vesicae*. Praemissa huius morbi descriptione omnia illustrantur, declaraturque decoctum vuaveursi cum nitro et glycyrrhiza quam maxime convenisse aegro, ut sanitatem recuperaret.

2) DESGERAUD observatio *de ascitide*. Oleo oliuarum cum spiritu salis ammoniaci volatili inuncto abdomini aegrum sanatum asseritur.

3) LAPEYRE observatio de operatione *empysematis* in infante post pleuresin pure in pectore collecto. Omnis cura pectoris incisione et puris emissionem potissimum absoluta est.

4) Cl. OTERRAS observatio *de particulae ossis fracti separatione*. Laesum erat os ob casum, quem perpeffus erat aegrotus.

5) Cl. CARLIER observatio *de fractura ossis femoris in inferiori parte per tormenta bellica*. Amputatio hoc in casu non adhibita est, sed separatio particularum ossis, suppuratioque copiosa totam curationem perfecit.

6) Cl. BYIOL relatio *de naturali quadam amputatione ossis fibulae*. In aegro videlicet, febre maligna vexato, separatio ossis fibulae facta erat, exfo-  
iatione autem non rite procedente, casu restituebatur is fortuito. Suppuratio enim aegro in genua prolapso superuenit, quae articulationis ligamentis consumptis, plenam effecit ossis separationem et aegro

\*) Vid. Relationes medico chirurgic. ann. III. p. 172.

pristinam valetudinem restituit. Varii casus amputationem concernentes adiecti sunt huic tractationi.

- P. 172. 7) Cl. IUVILLE epistola de *bracheriis elasticis in herniis inguinalibus*. Accurata harum descriptione et recta applicatione praemissa, de eorum egregio usu differitur.
- P. 181. 8) Cl. VILLAIN observatio de *febre putrida verminosa feminae*, quam aqua vino permixta feliciter propulsavit Noster.

*Mensis Martius.*

- P. 215. 1) Cl. POMA libellus de *syncho putrida*, quae per euacuationem criticam sanguinis nigricantis ex ano factam, quae libras duas et dimidiam sanguinis eiecit, penitus sublata est.
- P. 217. 2) Cl. GAPMAS observatio de *hemiplegia per apoplexiam serosam orta*. Iamdudum medici hac ratione hemiplegiam oriri posse docuerunt, et venaesectionem et vesicatoriorum applicationem cum fructu adhibuerunt, Noster vesicatoriis eam sanavit.
- P. 222. 3) Cl. THOMASSIN de *rachitide*. Quamquam BOERHAAVIUS alique asserunt, rachitidem morbum esse infantilem, nihilo tamen secius hanc in iuvene septemdecim annorum observavit Noster, atque huius mali causam in masturbatione positam coniicit, aegro tamen negante, nihil certi decernit. Fato vero extinctus est iuuenis, quum imperiti medici male hanc tractauerant rachitidem.
- P. 271. 4) Epistola Cl. DU CHANOT de *ruptura tendinis Achillis*, qua continetur historia viri quadraginta annorum, cui tendo hic ruptus absque futura, per approximationem ruptarum partium et ligationem pedis per vincturam in integrum est restitutus.
- P. 278. 5) Epistola Cl. PIETSCH ad Cl. MARTIN de *trepanationis in cranio laeso inutilitate*, eo videlicet in



in casu, si noua integumenta per naturam producta  
vulnus obducant cicatrice.

*Mensis Aprilis.*

1) Cl. MONTFILS *de virtute extractorum bor-* p. 314  
*raginis et buglossi in gonorrhoea venerea.* Illa ex-  
tracta in fontana aqua sumi iubet, atque affirmat  
in vniuersum aegros ita sanari posse; addi quidem  
possunt extractum altheae et graminis, sed Noster  
obseruauit haec additamenta nihil conferre, ideo-  
que conuenienter abesse posse; quae omnia va-  
riis exemplis vberius illustrantur atque firman-  
tur.

2) Cl. BOURLEYRE *commentatio de auxilio* p. 322  
*naturae in exfoliatione ossis cranii* non nimium con-  
tusi. Noster exfoliationem interdum esse exspe-  
ctandam arbitratur, quum natura ipsa ad hanc  
operationem sustentandam optima remedia soleat  
adhibere, experientiaque edoctus multa exempla  
lectu digna addidit.

3) Cl. IALOUSET *de operatione chirurgica in* p. 366.  
*orificio et collo vteri*, quae in femina triginta quinque  
annorum ab anno aetatis decimo quinto vteri pro-  
lapsu cum totius vaginae detorsione laborante, a Cl.  
Auctore instituta est, et qua effecit repositionem  
vteri. Verum inter ipsam grauiditatem vteri prola-  
psu absque vllis molestiis, paucis tantum difficulta-  
tibus in vrina mittenda exceptis, laborabat haec fe-  
mina. Partus tempore appropinquante Noster ac-  
ceritus, et orificium vteri difficulter detegens, illud  
margine duro et calloso, quod tribus diebus inter  
dolores partus non dilatatum erat, conspiciebat ob-  
situm. Quare propter cartilaginosa indolem ac  
crassitiem vteri, cepit consilium de collo illius inci-  
dendo, quo facto ob nimiam vteri contractionem  
ruptura colli sequuta est, atque tum, aliis incisio-  
nibus in vteri collo factis, totali disruptioni vteri offe-

cit. Quibus omnibus per vnus et dimidia horae spatium peractis, mortuus infans eductus est. Noster deinceps vterum reposuit, et, iniectionibus adhibitis, lochia bene fluxere. Non diu post menstrua apparuere, et femina sana, si pessario vsa esset, non prolapsu vteri iterum laborasset. Ex VAN SWIETEN praeterea et PORTAL casus similes commemorat.

*Mensis Maius.*

- P. 387. 1) Cl. PRIESTLEY experimenta et obseruationes *de differentia aëris*, ex Anglico sermone translata \*).
- P. 415. 2) Cl. ACHARD obseruationes *de duobus hydropicis, et de calculo vesicae*, qui in tunicis vesicae per mucositatem sese fixerat.
- P. 427. 3) Cl. HARMAND *de funestis causticorum et escharrhoticorum remediorum in cancro sanando effectibus*. Exemplo Ipsi est femina triginta sex annos nata, cui mammilla dextra cancrofa fuit, et quae exstincta est. Causam mortis ponit in sinistra applicatione emplastrorum corrosiuorum a quodam agyrta facta, atque sectione accedente docet, fieri vtique potuisse, vt per curam palliatiuam femina vitam per aliquod tempus seruasset.
- P. 441. 4) Cl. DEGRAVERS *de oculo vulnerato et humoris aquosi emissionem, subsequuto staphylomate*. Primo obtutu timuit Noster de obturatione pupillae, sed, staphylomate aperto, quo iris iterum facile in locum suum restitui posset, repetitis venaesectionibus, et suffumigiis emollientibus rite adhibitis omnia ex voto successerunt.
- P. 443. 5) Cl. DU CHANOV *de tendine Achillis rupto*. PETITI machinam huic rei causa inuentam tamquam

\*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 124. sq. 437.



quam prorsus inutilem reicit, atque methodum non multum ante commendatam \*) laudat.

6) Epistola Cl. MONTBALLON *de eodem argu-mento*, qua itidem methodus Cl. DU CHANOTY exemplis illustrata de meliori commendatur. p. 450.

7) ANT. LE CLERC *de graviditate quadam per octodecim annos imaginaria*. Femina parturiens crudelissimis inscii cuiusdam artis obstetriciae magistri manipulationibus male affecta erat, unde per vnus anni spatium aegrotando in matrice pungentes sensit dolores, donec sub finem decimi octauo mensis, recuperata aliquatenus valetudine, gravidam se factam indiciis quibusdam prodidit. Verum, finitis nouem mensibus, sopiti dolores redeuntes vitam eius per octodecim annos admodum molestant reddidere. Tandem defuncta est, ac cadauere dissecto conspicuum factum, eam nequaquam fuisse gravidam, sed matricis et ouarii tumore laborasse.

8) Cl. IUVILLE epistola II. *de bracheriis elastis ad hernias inguinales*. Prioris iam supra ad mensem Februarium mentionem fecimus. p. 463.

### *Mensis Iunius.*

1) Cl. PRIESTLEY *experimenta et obseruationes de differentia aëris \*\**). p. 483.

2) Cl. DUPLAN *de phthisi cauterio sanata*. p. 505. Omnis cura absoluta est equitatione, vaporibusque mediocriter calidis, quibus vlcus pectorale apertum est, quo facto inter scapulas fontanella applicata, aegra lactis et aquarum mineralium usu recuperavit valetudinem.

3) Cl. EMMANUEL *de tumore scirrroso ventriculi*. Vir sexaginta annorum grauatium dolorem sentiens circa stomachum, cuius causam in suppressa

N 5

tran-

\*) v. supra p. 198.

\*\*) v. supra mense maj. l. c.

transpiratione ponebat, varia medicorum sibi expe-  
tuit consilia, quibus indicabat rectum abdominis  
latus externe durum, vnde omnes de tumoris prae-  
sentia conueniebant inter se. Vexatus est conti-  
nuis vomituritionibus vehementioribus, emissione  
liquoris mucilaginosi, grumosi que atrum referen-  
tis colorem, et tandem exspirauit. Sectione facta,  
duo tumores scirrhusi et carcinomatosi humore  
quodam colorem rubri vini referente conspicui facti  
sunt, duodenum quoque et pylorus ex parte scirr-  
hosi fuere, ipsumque stomachum glandulae scirrhu-  
sae obsedere etc.

p. 525. 4) Cl. TESTART *de carbunculo*, qui feminae nu-  
cham occupans, sese versus humeros extendit, suc-  
cessiue ad apophyses vsque transversales occipitis  
et aures. Variis remediis adhibitis, ichorosa mate-  
ries acris per parua foramina transiens, gangrae-  
nam effecit. Corticis chinae vsus internus aequae  
ac externus vna cum incisionibus prudenter factis  
aegrae saluti fuere.

p. 530. 5) Cl. FIGUET epistola ad Cl. LEVRET *de ex-  
tractione corporis peregrini ex vagina uteri*. In me-  
dium profert Noster historiam de vlcere in vagina  
a nimis magno pessario existente, cuius medela per  
eius extractionem forcipis Leuretianae ope, per vi-  
ctum tenuem, ac emollientes, detergentes atque  
adstringentes iniectiones facta est.

p. 538. 6) Obseruatio Cl. FILLION *de vulnere per ab-  
domen transeunte vna cum apertura intestini*. Trede-  
cim videlicet annorum puer a tauro cornibus trans-  
fossus erat, vulnus inde inflictum et suppuratum,  
ruptumque intestinum liquoribus balsamicis, apto  
regimine praescripto et ipsius adeo naturae bene-  
ficio perfanatum est.

p. 552. 7) Cl. D'ARCEY experimenta *circa quasdam  
mixtiones metallicas, quae in calidam iniectae aquam  
rursus*



*rursus mollitiem ac fluiditatem assumsere.* Huius rei gratia praeprimis wismutho, stanno atque plumbo usus est.

Tom.  
XLIV.

*Mensis Iulius.*

1) Cl. FOVRNIER observationes *de febribus putridis et malignis*, per quinquaginta annos studiose collectae atque hic communicatae. Praemissa enim commentatione de natura et causis immediatis febrium, ipsae malignae febres, ne oboriatur confusio, a se inuicem probe distinguuntur, 1) in proprie sic dictas, quae omnes, absque omni aetatum sexuumque ratione habita, inuadunt, et frequentiores apud meridionales, quam septentrionales esse solent nationes, 2) in purpuratas, exanthematosas, et petechiales, 3) in malignam pestilentialem. Ceterum de signis, praesagiis, tandemque de recto vomitoriorum ac vesicatoriorum remediorum aequae, ac venaesectionum usu differitur.

2) Cl. LE CLERC epistola ad GOVBELLY *de noxio usu interno spirituosorum remediorum*, praeprimis in morbis pectoris: Inter iis aquae vitae et *liqueur du Sieur TREFENSCHIDLE* prorsus reiiciuntur.

3) Cl. LEAUTAUD observatio *de ulcere maligno cum febre ardenti sanato*. Repetitae venaesectiones, applicatio emplastri *manus dei* cum vnguento mucilaginoso mixti, inunctio laesae partis cum oleo rosarum et hyperici et aqua vitae suppurationem iterum prouocarunt, interne vero apozemata et remedia mitigantia, incrassantia et absorbentia admodum proficua fuere.

*Mensis Augustus.*

1) *Collectio operum physycorum et medicorum RICHARD MEAD in linguam Francogallicam translatorum* p. 99.

*rum a COSTE \**). Priores editiones, ne Londinensi \*\*) quidem excepta, non omnia continebant Cl. MEADII scripta. Prior enim editio, a LORRY 1751 publici iuris facta, tantum comprehendebat tentamen de venenis, (quod Gottingae 1749 cura OEDERI et Francofurti 1763 latine prodiit) tractatum de peste et variolis, translationem RHASIS de eodem morbo, commentationem de influxu solis et lunae in corpus humanum, discursum anniversarium ex instituto HARVCI habitum in collegio medicorum Londinensium, et dissertationem de nummis in honorem medicorum Smyrnae cufis. Quam quidem Lorryanam editionem iterum CAVELIERIVS sub nouo hoc prodire iussit titulo: *Relationes et praecepta medica duobus voluminibus*. Sed quamquam haec perfectissima dicatur editio, tamen in ea desiderantur commentatio de morbis, quorum in sacris fit mentio literis, descriptio Machinae Suttonianae renouandi aëris causa, et disquisitiones de scorbuto maris. Neque editio Amstelodami publicata omnibus numeris est absoluta, nam ommissa sunt praecepta medica, medicina sacra, et dissertatio de nummis. Itaque, ne Lectoribus de hoc defectu detur occasio conquerendi, omnia studiose congeffit COSTE, discursibus praeliminaribus vnamquamque commentationem instruxit, atque physicas, medicas et chirurgicas animaduersiones adiecit. Cl. WINTRINGHAM monita et praecepta medica cet. Cl. MEAD notis additis edidit \*\*\*).

p. 141. 2) Cl. LE FEURE *de vomica cum meditationibus de remediis causticis et escharroticis externe adhibitis et in cura cancri ab HARMAND proscriptis*. Vomica ruptam Noster per infusionem florum pedis cadi et hyperici

\*) v. Comm. nostr. Vol. XXI. p. 561.

\*\*) The medical Works of MEAD. v. ib. Vol. XV. p. 697.

\*\*\*) v. Comm. nostr. Vol. XXI. p. 725.



hyperici melle addito, pillularum MORTONI duobus granis, et de cynoglossa duabus dosibus mixtis, quas mane et vesperi aegra sumebat et clystere cum fero lactis, curare tentabat. At morti iam proxima videbatur aegra, igitur ad modum Cl. TISSOTI propinabat infusionem sambuci cum oxymelle squillitico, quo successu temporis vomitiones insequiebantur, omniaque ad meliorem conditionem vergere videbantur. Quare suadente Cl. POISSONNIER praescripsit ipecacuanhae vnum granum, pillularum de cynoglossa duo, balsami Peruviani doses octo, haec cum saccharo mixtae in pilulas redigebantur quatuor, quarum tres tribus horis capiebat, et, continuato hoc regimine, vigesimo quarto die convaluit aegra, et omnis cura per purgationes ex manna et terra foliata tartari finita est. Caeterum se in sequentibus defendit ob mortem ab ulcerato cancro productam, sibi que imputatam, et omnia transfert in agyrtam, qui ichorem longius retinendo eius in sanguinem refluxum non impediuerat; atque his subiicit, tutissimum remedium hic cauterium fuisse, quod exemplo addito pluribus docet.

3) Observatio Cl. GALLOT *de vulnere capitis cum p. 156.*  
*fractura cranii.* Id quod suppuratione, apto regimine, et aliis remediis convenientibus est sanatum.

*Menfis September.*

1) Cl. BUCHAN medicina domestica, e lingua p. 295.  
Britannica translata a I. D. DUPLANIL \*).

2) Consilium Facultatis medicae Parisinae *de p. 307.*  
*malo venereo infantum,* quo ad Inspectorum Xenodochii Aquarum Sextiarum quaestiones responde-  
tur. Collegium medicorum asserit, infectionem  
in neogenito difficulter esse cognoscendam, eamque  
se

\*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 580.

Se vix die duodecimo aut intra mensem prodere, praeprimis si mater mercurio vſa fuerit. Obiter conſuetudinem illam quatuor vel quinque liberos lactationis gratia vni committere nutrici, qua infectio facilis et communis poteſt fieri, reprehendit. Symptomata dein deſcribuntur, inter quae principem locum occupant palpebrarum glandulae, quae albam purulentamque gonorrhoeae ſimilem emittunt materiem; ſed in aetate tantum infantili curam palliativam ſperandam eſſe collegium decernit. Laudantur autem hic cinnabarina fumigia, praeferunturque mercurialibus. Modus procedendi is eſt, vt infans in corbi conſtitutus ſuper ſuffumigia teneatur, ita tamen, vt caput fumo non ſit expoſitum. Repetitio ſuffumigiorum per tres vel quatuor dies fieri debet, et prioribus quidem per quatuor vel quinque minuta, reliquis diebus per ſemihorium. Frequenter purgandi ſunt infantes, et poſt ſuffitus non ſtatim in cunas ponendi, ſed in aëre liberiori circumferendi. Omnis cura vt plurimum quindecim ſuffumigiis abſolvitur.

P. 322.      3) *De ratione taeniam propellendi.* Omnis cura eo redit. Iuſculum butyraceum aegro die ante curam eſt propinandum et clyſma emolliens adhibendum, quod dein ſpecificum ipſum ſequitur, cuius ſumma haec eſt: duae vel tres drachmae filicis maris (non ramosae dentatae) in vnciis quatuor vel ſex aquae filicis vel ceraſorum dentur, applicantur purgantia e panacea mercuriali quatuor decies dulcificata, e ſcammonii granis duodecim e ſex vel ſeptem granis gummi guttae, et cum confectione hyacinthorum fiat bolus. Rex Franco-galliae formulam huius remedii magnis ſumtibus tantam ſalutis civium cauſa publici iuris facere iuſſit, et NVFFERIA, quae vendidit, ab alio, cui olim vendiderat, propterea vocata eſt in iudicium. Quod  
reliquum



reliquum est hanc methodum etiam in PLINII hist. nat. L. XXVII. c. 55. his verbis inuenimus. *Fili-  
cis radix pellit — interaneorum animalia : ex his  
taenias cum melle — aluum soluit, primo bilem tra-  
hens, mox aquam, melius taeniam cum scammonii pari  
pondere, cf. DIOSCORIDES de mat. med. L. IV. c. 186.*  
Est autem, vti etiam monitum est in egregio libro \*)  
quem non satis ob magnam vtilitatem laudare pos-  
sumus, magna cautio suadenda hoc remedio vtendi.  
Dosis enim profecto magna est.

4) Cl. GALLOT de morbo soporoso ab iracun- p. 330.  
dia producto. Clysteres, vesicatoria, aqua cassiae,  
ptisana e radicibus paeoniae, glycyrrhizae, floribus  
sambuci et tiliae cum syrupo diacodii magnum le-  
vamen attulerunt aegro sanitatemque eius reuo-  
carunt.

5) Cl. DUBRANA de lue bovina in tractu Con- p. 335.  
domoenfi. Primum in causam morbi inquirat, do-  
cetque malum ad homines non transire, demum-  
que instituti explicat rationem. Observationes et  
experimenta in cadaueribus instituta prodidere  
omnem causam morbi in acido latuisse, cui cura-  
tio est accommodanda.

6) Cl. MORIN examen criticum commenta- p. 342.  
tionis BERTRANDI de abscessibus hepatis occasione  
capitis vulnerum abortis, cum animadversionibus pra-  
cticis de venae sectione. Cl. BERTRANDI a sympa-  
thia partium hos abscessus deduxit, multaque pro-  
tulit, quae communionem quamdam cerebrum in-  
ter et hepar declarare videntur, sed omnia hypo-  
thesibus superstruxit atque inuoluit.

7) Cl.

\*) Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch  
praktischer Aerzte. 2 Band. 4 Stück, p. 157. Ibi ex  
eodem tractatu omnia ea in linguam Germanicam  
translata, quae ad praeparationem regimenque ae-  
grorum eiusmodi, huius remedii nouitatem, taenia-  
rum diuersitatem cet. pertinent, reperiuntur.

- P. 378. 7) Cl. CHARNAUX *de laesa arteria radiali curata sine ligatura.* Huius rei causa applicauit splenia circularia et longitudinalia cum linteo carpto, et vinculis trium vlnarum in longum protensis, torcularique in superiori brachii parte appposito, vinoque aromatico et agarico adiecto. Cl. RUSSEY potissimum in hac methodo exemplum sequutus est.

*Menfis October.*

- P. 310. 1) Cl. VIVARES *de tumoribus cysticis in posterioribus repertis et post colicam violentam prouenientibus.* Femina colica et febre infestabatur, abdomen tensum et sensibile erat, et sub cartilaginibus sterni tres tumores versus dextram sese partem extendentes deprehendebantur, ope clysterum centum triginta et nouem bullae, ouis immaturis similes, crustis destitutis, variae magnitudinis et coloris, materiam meliceriti similem continentes, expulsae sunt. Ob infirmitatem, his abactis, nutrita est solo lactis sero, donec sensim sensimque solidiora edulia assumere poterat.

- P. 363. 2) Cl. IMBERT *de tumore ulceroso in mala, duas fistulas saliuales producente.* Hae fistulae sedem fixam in ductu saliuali Stenoniano occupauerant, posteriori loco posita leui quodam lenique splenio appposito sanata est, prior vero lapidis infernalis ope sublata.

*Menfis November.*

- P. 387. 1) Cl. GIRARD *lupiologia siue tractatus de tumoribus, qui lupiarum \*) (des loupes) nomine insigniuntur.* Tribus partibus hanc doctrinam complecti-

\*) v. Comm. nostr. Ildae decad. indic. triplic. sub verbo *Lupiae*.



plectitur, prior sistit theoriam horum tumorum, et naturam, characteres essentialis, differentias, sedem mechanicam, formationem, causas, phaenomena, accidentia considerat, et quale de iis sit iudicium ferendum: posterior de varia methodo circa eos praecipit, commemoranturque varii modi, quibus earum destructio, compressio, suppuratio, ligatura, amputatio et extirpatio tentata est. Simul de vsu causticorum agitur, de essentia, effectibus, ratione agendi substantiarum corrosiuarum et de electione earum, quibus additae sunt obseruationes, sententiam Nostri super hac re vltius confirman-tes. Tandem tertia pars de lupiis proprie dictis, de ganglio, de tumoribus cysticis oculi etc. differit.

2) Dissertatio Cl. BOUTEILLE ad Cl. DARLUC P. 398. *de variolarum inoculatione*, et Cl. REBIERIVS *de va-* P. 415. *riolis inoculatis*. Singulare quid de puella contagio varioloso infecta hic commemoratur, quae statim post partum non frequentes variolarum eruptiones absque suppuratione est passa, quas furunculi per annum fere persistentes comitati sunt. Haec puella, annum quum ageret aetatis vigesimum sextum, more Suttoniano inoculata est, statim, operatione peracta, in regione humerorum dolores cum febre sensit, maculae apparuerunt rubrae et colorem pomorum aurantium referentes. Perspiratio vero odorem allii prodidit, verum variolae minime eruptae sunt: itaque altera vice huic methodo sese submitteus quatuordecim diebus post vna tantum variola in manu erumpens suppuraui.

3) Obseruationes Cl. MARCHAND *de abscessu* P. 439. *ani*. Nouem hic exempla leguntur, quae eo P. 545. potissimum tendunt, vt dissectio intestini recti dissuadeatur et ea methodus praecipiat, qua ex  
Tom. XXIII. Pars II. O legibus

legibus artis in vnoquoque abscessu aperiendo et tractando more consueto versari solent chirurgi; nihilo tamen secius Noster concedit, fieri posse, vt in quibusdam exemplis necessitate et rebus sic P. 453. iubentibus sectio sit facienda. Examinis critici super commentatione Cl. BERTRANDI de abscessibus hepatis pars tertia, qua inordinatam sanguinis circulationem tamquam tertiam talis abscessus causam examini subiicit, addendo insuper nouem observationes.

*Mensis Decembris.*

P. 484. 1) Cl. BORDEU *de morbis chronicis* eorumque comparatione cum morbis acutis, de eorum periodis, natura et ratione eos aquis mineralibus Bargaribus aliisque sanandi. In priori hoc tomo theoria generalis morborum et analysis medica sanguinis proponitur, additis in fine disputationibus de cachexia purulenta et gangraenosa.

P. 512. 2) Cl. BOUTEILLE dissertatio, *de inoculatione variolarum.*

P. 524. 3) Cl. GALLOT commentatio *de duobus symptomatibus peculiaribus*, in duobus aegris obseruatis. Prius symptoma in femina viginti sex annorum circiter contigit, quae, diarrhoea a suppressa transpiratione oborta, affectus sensit spasmodicos, dolores in toto corpore, delirium soporosum et maniacum, tumorem pedum et digitorum, ob contractionem, immobilitatem etc. singulare in hoc casu fuit, quod manus nigro colore tinctae fuerunt, qui quidem color calida aqua abstergi poterat, sed tamen iterum fiebat conspicuus. Auctor hoc symptoma tribuit gangraenae in visceribus ortae et latenti. Posterius in nobili quadam femina sese prodidit a cephalalgia et doloribus in latere dextro infestata etc. cuius in capite oscillatorius audiebatur sonus.

4) Cl.



4) Cl. PARIS observationes de morbis Turcarum. P. 534.  
*rum.* Ad morbos Graecorum et Armeniorum communes, indigestio et inflammatio stomachi referuntur, quorum causa immoderatus vini esse solet usus, Armenii tamen magis sobrio vitae generi dediti non tam acriter his afficiuntur. Sobrietas quoque Turcarum laudatur, at opii usus et aromata somnolentiam et maniam, usus narcoticorum relaxationem et diminutionem toni, sensibilitatis, contractilitatis et motus partium inducunt. Phthisis dorsalis nervosa cum febre, magna infirmitate, dolore fixo in vertebrae colli, respirationis difficultate, indigestione, et hystericeis symptomatibus, ac irritatione et sensibilitate nervorum comitatur. Iste complicatus morbus difficulter curam admittit, neque lac aegris convenit propter stomachi infirmitatem. Turcae, Graeci et Armenii quoque abutuntur scarificationibus. In cephalalgia statim accersitus chirurgus, qui vinetura collum constringere et incisiones circa aures facere debet, quo sanguinis exeat portiuncula et dolores capitis leventur. Commemoratio de extractione aciculae, quam iuuenis in P. 552. canalem urethrae intulerat, et quae ad radicem usque processerat. Alius iuuenis ope acus nexorii pice sutoria obducti, illam extraxit.

II.

Chimie experimentale & raisonnée. Par Mr. BAUME'. T.II. à Paris. 1773. 8. 1 Alph. 18 Plag.

i. e.

Chemia experimentalis et rationalis. Auctore Cl. BAUME' Vol. II. \*)

O 2

Quam-

\*) vid. supra. p. 54

p. 1.

**Q**uamquam si nitrum cum gypso destillationi subiicitur, paucus tantum et tenuis latex acidus vas destillatorium transcendit, magnam tamen nitri partem a gypso sub hoc labore destrui, residuum in retorta nitrum calcareum et tartarus vitriolatus arguunt. Arcta enim nitrosi acidi cum terris calcareis est affinitas. Quae cum longe remotior sit inter terram vitrescibilem et acidum nitrosum, mirum non est, ex nitro ope aluminis longe fortius acidum expelli posse. Vere enim tale acidum plus valet eo, quod per vitriolum acidumve vitriolicum nitro affusum inde colligitur; etiamsi non ita multos vapores spargit, nec colore tam profundo conspicuum est. Debilius est, quod mediante argilla elici solet. Quodsi tamen omne id, quod in recipulum destillauit, abiicitur, donec vapores surgentes rutilare incipiunt: acidum sat coloratum et fumans obtinetur, idque eo copiosius, quo ditior argilla acido vitriolico fuerat, tantoque magis coloratum et fumans, quo plus ferri eidem inhaeserat. Quam tenax vero acidi vitriolici argilla sit, vel inde apparet, quod vasorum murrhinorum et sic dictorum lapideorum (*de grés*) massa insignem tamen ignis violentiam experta, acidum nitrosum ex nitro segregare valeat. Cl. Auctor hac ipsa occasione de apparatu illo (adiecta icone) exponit, quo in aquae fortis officinis vulgo uti solent. Peculiaris vero fornacum est structura, quos *galeres* vocant, ita comparata, ut singulo fornaci viginti quatuor et plura vasa destillatoria imponi possint, senis argillae binisque nitri partibus repleta. Massa in vasis residua, argilla et tartaro vitriolato inuicem mixtis constat. Quam si cum aqua et alcali sufficiente decoxeris, et liquorem deinceps percolaveris, hoc consequeris, ut per euaporationem tartarum vitriolatum, difficulter alias ex hac massa segregandum, obtineas.

p. 9.



Ex acido falis et alcali vegetabili, *sal febrifugum* SYLVII nascitur. Idem ex confusis liquore alcalino et salino terreo emergit. Ignis illud non destruit, quemadmodum etiam acidum vitriolicum et nitrosum in miscela eius dirimenda parum valent.

Ex sale lixivo vegetabili et aceto destillato *terra foliata tartari* progignitur. Quae cum nitro fixo cineribusque clauellatis paratur, squamoso habitu micam aemulatur. Atque hoc ab aliis huic parti alcalinae admixtis salibus neutris proficiscitur. Nitro fixo enim aliqua nitri veri copia, cineribus clauellatis vero tartarus vitriolatus et sal commune inest. Propterea etiam in aceto vini salium neutrorum alcalinis adhaerentium indicium est; siquidem illo acido lixium sal non prorsus satiaueris, et solutionem ad syrupi usque consistentiam inspissaueris; quae deinceps post aliquot dies salium neutrorum crystallos deiicit. Terrae foliatae tartari vnciae octo sub destillatione praebebant acidi concentrati grana octo liquoris alcalini volatilis vncia vna cum drachma vna et quadraginta octo granis: salis alcalini volatilis ficci grana sedecim.

*Alcali fixum minerale*, perinde ac vegetabile p. 24. ab igne in vitrum conuertitur. In aqua dissolutum, vel glaciei admixtum frigus auget. Cum calce viua coctum, *saponariorum lixiuum* constituit, quod ad siccitatem usque euaporatum, atque deinceps in crucibulo fustum lapis causticus chirurgorum vocatur. Quem quidem ideo ad aërem liberum diffundere arbitratur Cl. Auctor, quoniam, accedente ex calce materia ignea, alcali minerale ad vegetabilis naturam accedat; eandemque ob causam lixiuum saponariorum ita causticum esse, ut calcis adminiculo, partim quae iam adfuerat ignea materia, partim quae sub vstione intrat, retineatur et sali lixiuo uniatur. Argumenta, quibus hanc suam sen-

tentiam ornare studet, partim ab expedita et facili lapidis caustici fusione, partim inde petita sunt, quod tale alcali causticum, tam diu igne exagitatum donec abundans phlogiston destructum fuerit, in pristinam naturam redeat, et purum alcali minerale praebeat, siquidem in aqua prius solutum fuerit. Non vero in sola calce, veru etiam in terra pura vitrescibili, et metallicis cineribus alcali causticum producendi potentia est, ita vt mediante illa ignea materia quae ad sal lixiuum accedit, aliqua harum terrarum copia ab initio cum alcalino sale misceatur; deinceps vero, destructo phlogisto, ista vincula abiiciat.

p. 46.

*Sal commune*, antequam super igne colliquetur, excandescit; Fusum vero substantias salinas peregrinas ipsi admixtas derelinquit iisque innatat, dein vero refrigeratum spiculis splendentibus adamantis instar politis conspicuum est. Passum ignis maiorem vehementiam fumi albi specie assurgit, qui carbonum flammam eximio calore coeruleo tingunt. Nunquam vero per solum ignem sal commune in partes suas constitutiuas dissolui potest. Neque haecenus eo peruenire licuit, vt acidum salis vel sal ipsum commune cum phlogisto combinaretur, etiamsi non dissimile vero est, posse eiusmodi sulphur aut phosphorum salinum vel ab ipsa natura vel arte produci. Cuius argumenti opportunitate Cl. Auctor ad fulminis naturam quasi in transitu declarandam ducitur; quam cum electricitate quidem plurimum conuenire fatetur, neutiquam vero igni puro similem esse censet. Forsitan fulminis materia, sulphuris diuersis generibus inter se commixtis, efficitur.

p. 72.

Sali, ex alcali minerali et aceto vini producto, Noster *terrae foliatæ crystallisatæ* nomen tribuit.

Notatu



Notatu dignum est, solutionem crystallorum sodae in aceto vini destillato, colore coeruleo conspicuam esse, quem Cl. Auctor a coeruleo Berolinensi sodae inhaerente deriuandum esse opinatur. Vt vero crystallos euaporando obtineas, cauendum, ne alcali minerale prorsus acido saturetur, quod, tamen nil impedit, quo minus post euaporationem sal manifesto neutrum relinquatur. Sub destillatione hoc sal nihil alcalini volatilis liquoris explodebat, sed acidos saltem et empyreumaticos vapores.

*Alcali animale* siue *volatile* super igne auolat, p. 75. antequam ipsa aqua eius crystallis inhaerens, transcendat. In aëre satis frigido dissipatur. Idem facile contingit, si aqua calida soluatur, sub qua solutione incredibilis fere aëris copia euoluitur. Cum frigida aqua vel glacie alcali volatile insigne frigus producit. Calce viua aut in aëre libero extincta omnis huius salis alcalini densitas atque soliditas tollitur, ita vt deliquescat, et ne iteratis quidem destillationibus pristinam formam recuperet. Quam cohaerendi impotentiam perinde atque auctam alcali volatilis acredinem non aliunde repetendam esse Cl. Auctor censet, quam ab illa ipsa ignei principii admixtione, quae in lixiuio saponariorum quoque deliquescentiae causa est.

*Sal ammoniacum secretum GLAUBERI*, quod ex p. 81. acidi vitriolici cum alcali volatili coniunctione nascitur, quadantenus volatile est ita, vt destructionis expers in vasis clausis sublimetur. Ad aërem non, vti sal mirabile, in puluerem defatiscit, sed potius aëris humiditate madorem contrahit.

*Nitrum flammans* aqua facillime dissoluitur, eamque ipsam ob causam aegre sese in crystallos redigi patitur.

*Spiritus MINDERERI*, quem aptius forsan *sal* p. 82. *ammoniacum acetosum* diceres, potest omnino, sed

admodum difficulter in crystallos coagulari, si per dies fere quatuordecim liquor ille salinus in loco sicco spontaneae euaporationi relinquatur.

p. 90.

Multa salia terrea alcali volatilis ope in partes suas resolvuntur, alumen nempe, gypsum, nitrum calcareum, sal ammoniacum fixum et sal acetosum calcareum, quorum omnium acidis, pristino nexu sublato alcali volatile nunc nubit, et nova salia media cum iis constituit.

GEOFFROY primus fuit, qui de salis ammoniaci vulgaris origine et loco natali certi quid memoriae proderet, LEMERI Consulis Cairiensis literis edoctus\*). Ibidem ratio et instrumenta exponuntur, quorum auxilio in Aegypto sal istud parari consuevit. Neutiquam tamen arte in illis locis componitur, sed sublimatione saltim obtinetur. Nostri Auctoris consilio et indefessa opera officina huic sali elaborando in Gallia dicata fuit.

p. 98.

Repetita salis ammoniaci sublimatione, aliqua eius particula destruitur, ita ut alcali acidum derelinquat, seorsimque auolet. Pro diuerso ignis adhibiti gradu, salis sublimati figura varia est. Quod si enim ignis admodum lenis fuerit, crystalloformae, perinde ac si aqua sal solutum fuisset, plumulas imitantur; si paullo fortiolem calorem ad-moueris, sal in massas ex acubus, cinnabaris crystallos mentientibus, conformatas, et subtus crystallicis cubicis (vere ammoniacalibus) obsitas coit; si denique vehementi igne utaris, massa densa dura, fere transparens et in superficie sarmentorum figuras ostendens (*garnie d'une sorte de ramage*) attollitur.

p. 100.

Salis volatilis alcalini et salis marini terrei ex sale ammoniaco et calcarea terra praeparatio. Quemadmodum, si igne torquetur sal ammoniacum, ob terrae calcareae indolem minime volatilem salis acidum

\*) v. comm. Acad. Parisin. de anno 1716.



acidum ab alcali volatili abreptum huic terrae iungitur, ita e contrario, si viam humidam delegeris, acidum a terra adiecto sale volatili separatur. Augmentum ponderis, quod sali alcalino sub hac operatione accedit, Noster Auctor ab aqua in terra calcarea latente repetit. Spiritus salis ammoniaci p. 107. per calcem ad aërem liberum extinctam, expulso. Sal volatile hac ratione ab acido suo segregatum sub forma liquida semper apparet. Quae remanent, eiusdem indolis sunt cum residuo ex sublimatione alcali volatilis paullo ante proposita; ita tamen, ut oleum calcis ex residuo destillationis cum calce viua institutae ortum, per alcali volatile sub ipsa operatione enatum non destruat, quod omnino in illo oleo calcis ex sublimatione salis volatilis relicto fieri solet. Neque etiam mixtum utrumque alcali volatilis genus dirimit hanc nostram calcis viuae in salis acido solutionem; perturbat saltem, parumque terrae deiicit. Discrepat vero alcali volatile calcis viuae adminiculo paratum ab eo, p. 112. quod creta expulsit, grauitate specifica; quae in illo spiritus vini leuitatem propemodum aequat, in hoc vero aquae pondere maior est. Quatuor spiritus alcalini vnciae aëris accessui expositae intra decem horas septem drachmas perdidisse reperiuntur. Fluidum inde relictum sapore destitutum succum violarum vix mutabat, sed grauitatem specificam aquae obtinuerat.

Sal volatile per calcem viuam ex sale ammoniaco prolicitum duplici modo ita cogi potest, ut sub forma solida compareat. Alterum proposuit DUHAMELIUS, ut nempe spiritum volatilem aliquoties de calce, super qua iam fuerat destillatus, denuo et iteratis vicibus abstrahi iuberet. Inde calx ipsa pinguem aut viscidam quasi formam induit, alcalino sale in massam solidam coeunte. Aliam sal volatile p. 114.

latile solidum per calcem viuam expellendi rationem Noster describit. Tres nempe vnciae calcis viuae cum totidem sanguinis bubuli bene exsiccati vnciis calcinantur, donec materia flagrare desinat, quae denuo, addito sanguine exsiccato, igni iterum committitur, vt intra horae spatium excandescat. Refrigerato isto puluere omni calcis virtute nunc priuato, alcali volatile solidum ex ammoniaco sale propellitur, massa nigra, sal commune in se continente, in ipsius vasis fundo relicta.

p. 123. A gypso vsto ita afficitur sal ammoniacum, vt aliqua pars salis volatilis sub liquida, alia sub solida forma adscendat, reliquum vero sal ammoniacum absque mutatione eleuetur. Gypsum crudum copiosorem liquorem, parcius sal concretum extricat. Caput mortuum ab ytroque labore albidum relinquitur. Alabastrum purum nullum alcali volatile elicit.

p. 125. *Aquam regis* Cl. Auctor ita parari iubet, vt libra vna spiritus nitri vulgaris quatuor vnciis salis ammoniaci affundatur eaque miscela, donec sal solutus fuerit, continuo agitetur. Tantopere vero spiritus nitri cum sale ammoniaco efferuescit, vt rubri etiam vapores assurgant, neque si omnia inter se mixta fuerint, penitus motus internus cesset: quapropter etiam paritati in hac aqua regia paranda studendum esse Noster monet, cum diutius asseruata extrudere epistomia vel ipsa adeo vitra displodere soleat. Tribuit hoc nitro cuidam flammanti ex salis ammoniaci parte volatili ac nitroso acido pro-  
genito.

p. 129. *Borax* partibus aequalibus alcali mineralis et salis sedatiui constat. Hoc sal posteriore loco nominatum quorumlibet acidorum ope ex borace separari potest. Boracis vero genus cernitur triplex; primum crudum s. *Tincal*, alterum, *Borax depurata* Chi-



*nensum*, tertium denique et optimum, quod denuo instituta depuratione obtinetur. Quae vero sit in India Orientali huius salis praeparandi ratio, nondum satis constat. Alii ex aqua quadam minerali venas cupri praeterfluente extrahi, alii aeruginem et pingua ei admisceri, alii denique ex adipe, argilla et fuligine sibi inuicem superstratis et terra obrutis post aliquot annos boracem progigni voluerunt. Postremorum maxime sententiae Noster suffragatur, fultus tum experimentis a se ipso in hoc genere institutis, tum boracis crudae dissolutione et depuratione. Reperiit enim eiusmodi solutionem in filtro, per quod colaretur, materiem terrestrem albicantem satis subtilem relinquere; illam vero ipsam euaporatione tentatam partim in cryсталlos rudiusculas rubellas coire, partim sub specie liquoris rubri spissi adipem rancidum redolentis relinqui. Qui liquor denuo inspissatus et rancorem magis iamiam prodens, sub destillatione aquam oleumque crassum praebuit, illi, quod ex adipe elici solet, satis simile, residua in vase destillatoria massa salina, boracem crudam calcinatam aemulante. Inanis vero est nonnullorum opinio, adipem ideo boraci adiectum esse existimantium, ut ne, aëre accedente, fatiscat in puluerem.

Terra ex solutione boracis crudae in fundum p. 131. vasis delapsa, salis sedatiui adeo tenax est, ut ne iteratis quidem lotionibus eo prorsus destitui possit, nisi coctio saepius repetita accesserit. Acida quaevis illam coniunctionem soluunt, sale sedatiuo inde separato. Sal sodae adiectum ex illa boracis terra cum aqua cocta boracem restituit. Quae inde relinquitur terra, ita iam omni sale sedatiuo spoliata atque nuda quasi deprehenditur, ut frustra ex illa quicquam salini elicere tentaueris. Ex his omnibus constat, boracem crudam plus acidi sedatiui continere

lum soluit. Sulphuris satis auidus est niccoli regulus, cumque illo commixtus durior flauidiorque euadit. Igni tunc expositus, scintillas spargit fulgidas. Nec non hepatis sulphuris misceri potest, producta inde massa metallica ex viridi flavescente, cupri mineram referente.

p. 305. *Regulus antimonii* vehementiore igne excandefactus, in vasis clausis auolat. Vbi vero aëri accessus patet, in flores niueos, aciculatos, micantes conuertitur; quos ita parari commodissime Noster suadet, vt crucibulum, quo continetur metallum, inclinato situ super igne collocetur atque extra furnum parumper emineat, imposito alio crucibulo subinde mutando, quod flores in se recipiat. Granum dimidium florum aquae vnciis octo solvitur.

p. 309. Quod si autem, lento igne aëre non excluso, regulus antimonii vritur, grisea calx inde nascitur, ipso regulo volatilior, facilius in flores convertenda atque eadem, qua flores, aquae copia solubilis.

p. 312. Acidis difficulter soluitur regulus antimonii, omnium optime tamen aqua regis ex acidi salini singula nitrosi quatuor partibus, ita vt metallum minutim concisum sensim sensimque iniiciatur.

p. 320. Non eodem semper ignis gradu calx antimonii in vitrum conuertitur. Quando vero difficulter fluit, Cl. Auctor fusionem antimonii crudi mica exigua adiuuari posse expertus est, atque tunc praeter vitrum aliquot grana reguli in fundo vasis reperiri.

p. 325. Duplex est *kermes minerale* praeparandi ratio. Atque illud quidem quod fusione paratur, additione pauci sulphuris inter fundendum opus habet, quo sulphuris particula ab ignis ardore diffusi solita compensetur, et hepar sulphuris, quo metallica



tallica pars omnis solui debet, sufficiat. *Sulphur antimonii auratum*, si a diuerso praeparandi modo secesseris, cum kermes minerali prorsus conuenit. Videtur autem in utroque praeparato regulina pars sulphuri multo laxius adhaerere, quam in antimonio crudo, cum illa emetica virtute polleant, qua destitutum hoc est. Alteram kermes mineralis speciem notissimam illam coctione cum alcalino liquore paranda, LEMERIO Cl. Auctor vendicat, cui inuentionis gloriam Carthusiani praeripuerant, pharmacopolae cuidam GLAUBERI discipulo illam tribuentes. Alkali cum antimonio crudo coctum, causticam indolem acquirit, neutiquam vero si cum regulo coquatur. Ipsum lixiuium saponariorum cum antimonio coctum, affuso acido sulphur antimoniatum praebet, quod tamen a praecedente terrae calcareae praesentia differt. Nec non ex scoriis, quae sub reguli antimonialis ex antimonio crudo praeparatione oriuntur, kermes minerale et sulphur antimonii auratum elici potest. Vtrumque vero, si vritur, calcem antimonii praebet, ex qua deinceps, addito phlogisto, regulus antimonii restitui potest.

Regulum ex antimonio diaphoretico restituere difficillimus labor est. Quem cum aliquando GEOFFRAEVS fusciperet, calcem illam vehementi igne cum sapone nigro vrens, aperto post quinque horas crucibulo, iamiam refrigerato, vidit materiam cum strepitu ac odore sulphureo flamma consumi. Aqua solui posse antimonium diaphoreticum, ROVELLIVS auctor est. Ex cunctis antimonii praeparatis fieri potest, dummodo phlogiston omne abigere memineris.

Sal ammoniacum aqua solutum cumque antimonio per aliquod tempus digestum aliquam

metalli portiunculam soluit. Sal inde productum coloris est ex coeruleo albidum.

P. 355. Zincum inter omnia metalla tenacissimum est; hinc cum in mortario vix contundi possit, satius est illud igne liquatum aquae infundi atque sic in granula redigi. Lento igne in griseum calcem mutatur, quae, addito phlogisto, formam metallicam facile recuperat: vehementiore autem igne inflammatur et in calcem niueam difficillime reducendam conuertitur. Calx ista *florum zinci* nomine vulgo cognita, ipso zinco ponderosior est, ita ut sedecim metalli vncias, postquam in flores conuersae fuissent, sex drachmis et quinquaginta quatuor granis auctas fuisse Noster repererit. Ipsi autem flores flammae tantum impetu fugantur, per se enim igni expositae in auras abripi nequeunt. Neque vehementissimo igne funduntur, metallum vero ex iis, addito phlogisto, non, nisi in vasis accurate clausis, potest restitui.

p. 359. Omnia acida mineralia Zincum facile soluunt. HELLOTUS auctore omnium plurimum soluit acetum destillatum. Atque ex hac solutione, dum destillatur, liquor aethereus inflammabilis, deinceps flores albi pariter flamma coerulea flagrant, tandemque oleum flauo aut viridi colore tinctum assurgit. Idem contingit cum florum zinci solutione. MALOVIUS zincum ab alcalinis salibus tam volatilibus, quam fixis solui contendit. Neque cum sulphure neque cum sulphuris hepate misceri potest: fusum cum alterutro, a particulis peregrinis metallicis liberatur. Cum nitro detonat flamma fulgidissima; residuum alcali aqua solutum Gallis dicitur *alkahest de Respour*.

p. 367. Cum arsenico zincum via humida misceri nequit. An fusione possint iungi dubium adhuc est.



est. Certe MALOVINI experimenta nihil aliud efficere videntur, quam hoc; parvam arsenici copiam zinco tenacitatem suam et splendorem demere. Cum regulo antimonii combinari potest, non vero cum regulo niccoli et antimonio crudo.

*Bismuthum* in vasis clausis ignitum adscendit P. 372. integrum. Ponderis augmentum, quod calci accedit, in ratione est  $20\frac{34}{88}$ : 19. Vehementiore igni vltum flammula coerulea flagrat hoc metallum, surgente fumo crasso luteo. Sic maxima eiusdem portio in flores absumitur luteos. In vniuersum autem calx bismuthi omnis ab igne se fugari haud patitur; in vitrum potius pellucidum atque flauum abiens.

*Hydrargyrum* per se calcinatum (*Mercurius* P. 390. *praecipitatus per se*) vna decima parte metalli pondus superat. In vasis clausis sub crystallorum rubrarum specie rubinorum instar adscendit, nec absque phlogisti additione in metallicam formam redit.

*Mercurius* a calore ita extenditur, vt vehe. p. 393. menti ardore vltus, vasa ferrea, quibus inclusus esset, magno cum fragore rupisse visus fuerit.

*Mercurii* in acido nitroso soluti color ab p. 403. initio coeruleus est, donec acidum prorsus metallo saturatum est. Inde per refrigerium crystalli aciculatae enascuntur, quae, in ipso balneo arenae refrigerato liquore, ad perpendicularum positae sunt, contra vero, si ab igne ille sublatus fuit, prostratae iacent. Relinquitur muria coloris vinosi, ex qua aqua destillata affusa pulvis mercurialis flavus, turpetho similis subsidet. Potest autem corrosiua nitri mercurialis indoles mitigari partim eius in charta bibula exsiccatione, partim solutionibus in aqua saepius repetitis. Ex his per euaporationem progignitur sal crystallorum cubicarum specie,

specie, aqua parum solubile; eademque si dilutum fuerit, puluerem flauum demittens. Alcali fixum, lateritium, vitriolica salia, flauum puluerem ex nitrosa mercurii solutione deiiciunt. *Mercurius praecipitatus ruber* ab igne subitaneo destruitur ita, vt secedat acidum vaporum rutilantium specie, et aliqua metalli portio resuscitetur; lente vero administrato igne acidum fugatur quidem, mercurius vero non restitutus intra vnus fere mensis spatium in calcem rubram conuertitur, quae etiam ab igne destillatorio attolli se patitur, mercurioque per se praecipitato omnino similis est.

p. 410. *Mercurius*, Auctore HOMBERGIO, acido salis per se solui potest, dummodo per sat longum tempus cum eo digestus fuerit. *Mercurius praecipitatus albus*. *Mercurius sublimatus corrosiuus*. Eius drachmae duae cum granis duodecim calore modico vnciis aquae purae quatuor solui possunt. Cum balneis optimo cum fructu Noster illo vsus est, in morbis venereis. Triginta fere balnea ei ad sanationem visa fuerunt sufficere. Nunquam salinae fluxum inde oriri expertus est, vergente potius medicamenti virtute ad aluum et vesicam. Gingivae tamen intumescunt, percepto simul metallico sapore.

p. 420. *Mercurius dulcis*. Crebrius repetita huius salis sublimatio plus nocet, quam prodest. Quauis enim vice aliqua mercurii particula euoluta abigitur; quo fit, vt mercurius dulcis, acido salis iam non prorsus per metallum saturato, plus minusue de mercurii corrosiui indole participet. In panum sublimatorum mercurii dulcis superficie puluis ex mercurio corrosiuo et dulci mixtus reperitur. Possunt vero vterque a se inuicem separari affusa aqua, qua corrosiuus soluitur, dulci integro relicto. Acidum salis cum mercurio nullo modo ita iungi potest,



est, ut sal inde oriatur, quod plus mercurii, quam sublimatus corrosius et minorem metalli copiam, quam sublimatus dulcis contineat. Semper enim utrumque sal separatim sublimatur. Hinc etiam fieri non potest, ut aequales mercurii sublimati corrosiui et dulcis portiones per sublimationem inter se in vnum sal coeant. Optime itaque mercurii dulcis innocentiae consulitur, si loco repetitarum sublimationum, ille aqua feruida, cui paucillum salis ammoniaci admixtum fuit, lotus super porphyrio denuo tritatur. Parum enim in solvendo mercurio dulci potest sal ammoniacum.

Per alcali tum fixum, tum volatile mercurius p. 432. sublimatus corrosius destruitur. Idem sulphuris hepate adiecto contingit, acido salis alcali fixum sulphure autem mercurium aggrediente. Acidum nitrosum, dum feruet, mercurium corrosivum solvit; crystalli vero ex hac solutione per refrigerium enascentes non aliae sunt, quam ipsius mercurii corrosiui. Cum sale ammoniaco is tam arcte iungitur, ut neque crystallisatione, neque sublimatione a se inuicem possint separari. Adiuvatur autem mercurii sublimati in aqua solutio addito sale ammoniaco; ita, ut tres aquae vnciae, novem drachmis salis ammoniaci foetae, quinque mercurii uncias in se recipere possint. *Butyrum antimonii*, interdum parallelepipedorum formam affectat; dum scilicet refrigerio inspissatum fuit. Acidum nitrosum ei affusum reguli antimonii in aqua regis dissolutionem sistit; quae tamen intra paucos dies albescit, calce antimonii paulatim sedente. Caeterum decima fere acidorum pars vaporibus absimitur, dum illa inter se miscentur, assurgentibus. Mercurius sublimatus corrosius cum bismutho destillatus speciem quandam *butyri Bismuthi* praebet.

p. 451. HOMBERGII experimentis constitit, mercurium aqua regis solui posse; praecipitari deinceps puluerem album, qui tandem rursus soluatur. Alio vero aqua regis non qua talis hic agere videtur. Ab initio nempe mercurius acido nitroso soluitur; deinceps vero cum acido salis combinatus ex solutione delabatur; tandemque ab aqua, quae menstruo admixta est, iterum suscipitur. Arguit hoc crystallorum ex euaporata solutione prodeuntium indoles; in quibus quippe ne minimum quidem acidi nitrosi vestigium apparet.

p. 452. Acetum destillatum non quidem hydrargyrum ipsum, sed tamen calcem illius soluit. Ex hac solutione per refrigerium crystalli micaceae splendidae nascuntur.

p. 456. Ab alcalinis salibus hac sola ratione solui potest mercurius, ut eius solutioni nitrosae alcalinus liquor sensim sensimque instilletur, donec mixtum fluidum ad alcalinam naturam omnino inclinasse videatur.

p. 462. Ut hydrargyrum ex cinnabari destillatione eliciatur, limatura martis adiaci plerumque solet, etsi alcalia terraeque calcareae idem efficiunt. Hoc vero plane singulare est, odorem alcalinum volatilem surgere, dum cinnabaris cum marte destillatur. Alkali cinnabarini humida etiam via destruit, quod eo magis mirandum est, cum Cl. Auctor expertus sit, aethiopem, et post aliquot annos cinnabarim, ex mixtis inuicem atque coctis hepate sulphuris et hydrargyro ortum fuisse. Idem contingit, si hepatis sulphuris volatili aut ipsum hydrargyrum aut eius varia praeparata e. g. vitriolum mercuriale, turpethum minerale, solutio mercurii nitrosa, mercurius praecipitatus ruber aut sublimatus corrosiuus admiscetur, ita ut cinnabaris inde mox intra



tra breuius, mox intra longius temporis spatium oriatur.

*Tinctura mercurialis Comitum DE LA GARAYE* p. 469.

ex vna mercurii viui, quatuor salis ammoniaci partibus inuicem exacte tritis et cum spiritu vini super igne digestis paratur. In morbis venereis, singula vice guttae huius tincturae decem aut duodecim cum tribus aut quatuor aquae cyathis exhiberi possunt. Aluum vix mouet, forsitan salinae fluxum parumper adiuuat.

Cum regulo Cobalti, antimonii et niccoli p. 470.

mercurius sese combinari haud patitur. POTIVS tamen regulum antimonii cum calce paratum refert mercurio misceri posse. MALOVINVS antimonio crudo iunxit tam trituratione, quam fusione. Quae tamen experimenta accurate instituta fuisse Noster negat; quippe cum ipse viderit, mercurium ne diuturna quidem trituratione cum antimonio plane extinguere posse, neque eandem cum sulphure antimonii aut ipso antimonio misceri. Idem MALOVINVS zincum et mercurium fusione miscuit, nactus inde miscelam variae duritiei pro diuersa singulorum inter se proportionem.

*Stannum* malleo cussum rigescit fragiliusque p. 474.

redditur; calefactum vero pristinam tenacitatem atque mollitiem recuperat. Videtur autem in vniuersum metallorum elasticitas in duritiei et eius, qua citius tardiusque fundantur, facultatis ratione esse, ita, vt, quae duriora sint, difficiliusque fundantur, ea sub ictibus mallei rigidiora fiant et maiorem acquirant elasticitatem. Verosimile autem est, metallorum, quae cudentur, particulas in angustius volumen cogi; testante id pondere specifico, quo illa metallis fuis antecedunt.

p. 475. Exiguo calore stannum liquatur; dum ex-  
candescit, flamma surgit fulgida, adscendentibus  
simul floribus albidis. MARGGRAFIUS candidam  
calcem, quae in vase exacte clauso, ipso stanno  
integro relicto, adscenderat, arsenicum fuisse exi-  
stimat. Vehementissimo igne adhibito, apparue-  
runt in crucibulo, cui stannum inditum fuerat,  
duo florum genera; alterum aciculatum candi-  
dum, alterum brassicae capitatae floribus simile,  
coloris lateritii: praeterea calx puluerulenta alba,  
et sub ea vitrum hysgini coloris, relicta subtus  
stanni non mutati portiuncula. Acido vitriolico  
super igne stannum soluitur, nascentibus inde,  
post aliquot dierum refrigerium, crystallis. Ni-  
troso corroditur saltem cum feruore. Solutio  
stanni, cum acido salis in arenae balneo facta, va-  
pores spargit arsenicales; per euaporationem in  
crystallos splendor aciculatas cogitur. Earum  
duplex genus est, alterum candidi, alterum rosei  
coloris. Si magna huius salis copia simul para-  
tur, crystalli micaceae sunt, sali sedatiuo similes.  
Aqua regis stannum facillime aggreditur atque  
soluit. Paullo tardius autem in hoc labore ver-  
sandum est, alias acidi nitrosi praepotens efficacia  
metallum absque dissolutione corrodit. Tandem  
aceto quoque stannum solui potest. Caeterum  
hoc notabile est, calces stanni, ex solutionibus eius-  
dem acidis delapsas, longe difficilius posse in  
metallum conuerti, quam quae vitione paratae  
fuerunt.

p. 498. Cum arsenico facillime stannum fusione  
combinatur. Labor iste tunc maxime ex voto  
procedit, quando sal neutrum arsenicale adhibi-  
tum fuit. Regulus stanni inde natus, fragilis ad-  
modum et lamellosus est, neque funditur, nisi  
igne rubens. Arsenicum omne ne vehementissi-  
mo



mo quidem igne ex hoc metallo separari potest. Neque cum regulo Cobalti Niccoli et Antimonii coniunctionem inire stannum respuit; ex antimonio crudo autem sulphur ad se rapit. Fusum cum Zinco praebet metallum pro diuersa vtriusque proportionem plus minusue durum atque ductile.

*Plumbum* fusum paulatimque refrigeratum, p. 512. si ferro pulsatur, tinnit; cusum vero hac facultate destituitur. An ab aqua pura solui aut corrodi possit dubium adhuc est: aquae feleniticae aliquantum omnino soluunt, donec recens plumbum est, nec terra iamiam incrustatum. *Nitri saturnini* crystalli triangulares sunt, angulis truncatis. Puluis griseus ex solutione plumbi nitrosa delabi solitus, cum mercurio nihil commune habet, quod chemici nonnulli somniarunt, sed plumbum est semicalcinatum. *Vitriolum plumbi*, cuius crystalli spicula referre solent, non modo acidi vitriolici ope, verum etiam salibus vitriolicis mediis adhibitis ex nitrosa plumbi solutione praecipitatur. Eadem ratione *plumbum corneum* cum acido salis nascitur. Cum vero ex huius dissolutione aquosa, affuso acido vitriolico, decidat vitriolum saturninum; apparet summam esse plumbum inter et vitrioli acidum affinitatem. Aqua destillata in parando *magisterio plumbi* nihil valet; sic potius id confici debet, vt nitrosae plumbi solutioni alcali purum affundatur. Saccharum saturni a salibus vitriolicis destruitur; acido vitriolico, plumbum, acetofo vero alcali salis vitriolici arripiente.

Plumbum cum Zinco et Cobalto fusione p. 538. misceri nequit. Cum antimonii regulo diuersas progignit metalli species, pro varia plumbi et reguli antimonii inter se proportionem duriores aut molliores.

P. 544. Calces *ferri*, quas *crocus* vulgo dicunt, colore variant pro diuersa metalli puritate. Ferri purissimi calx coccinea est, neque colorem istum igne vehementiori adhibito exuit.

P. 550. *Chalybis* conficiendi modum triplicem Cl. Auctor ex REAUMVRIO enumerat. Mox nempe ex ferro fuso (*fer de greuse ou de fonte*) extra furnum refrigerato, mox ex tali, quod intra furnum ipsum refrigeratum est, mox denique in ferro cuso (*fer forgé*) cum cemento quopiam ignitus paratur, eaque chalybis species praestantissima est. Cementum duplex REAUMVRIUS proposuit, alterum ex vltae fuliginis sedecim, carbonum contusorum octo, cineris totidem et salis communis quinque vnciis; alterum ex cinerum, fuliginis et carbonum singulorum octo, salis marini quatuor vnciis. Ad singulam ferri libram vnciae binae cum drachmis tribus alterutrius cementi requiruntur. Ex eodem Auctore septem ferri genera describuntur, ex quibus, quod diffraetum neque lamellarum neque granulorum species affert, chalybem praestantissimum progignit. Experimentis circa cementa varia institutis effectum est, ea esse optima, quae plurimum materiei purae inflammabilis praebeant, inter salinas vero substantias sal commune reliquis esse praestantissimum. Ferrum cusum; ferro fuso, dum fluit, immersum, in chalybem idoneum conuertitur. Notatu denique et hoc dignum est, chalybem, tam pondere, quam volumine ferrum exsuperare; ita ut non possimus non suspicari, accessisse aliquid ex cemento ad ipsam ferri substantiam. Extinctionem chalybis igniti plurimum posse ad maiorem duritiem ipsi conciliandam, nemini ignotum est. Varii huius extinctionis modi ab Auctore Nostro recensentur. Solet autem eo durior chalybs fieri,  
quo



quo magis igne excanduit et frigidior fuit aqua. Prae reliquis id extinctionis genus notabile est, quod Gallis *trempe en paguet* dicitur; immergitur nempe aquae frigidae chalybs in pyxide cum cemento conclusus atque ignitus. Non admodum vero necessarium est aquae ad chalybis extinctionem adhibendae quicquam adiici. REAUMURIUS experimentis cognouit ad chalybis extinctionem spiritum vini et oleosa omnia minus idonea esse ipsa pura aqua; huius vero virtutem in hac re aequare acetum vini succumque raparum. Aquae forti immersus chalybs parum ignitus, tantam assequitur duritiem, ut lima amplius tractari recuset. Quod si denique ad naturam chalybis ipsam respicimus, Noster ferro cuius aliquantum sulphuris aut calcis ferri non metallici inhaerere arbitrat, quod vitione cum cementis instituta partim destruat, partim in metallum abeat.

*Vitriolum martis* dum aqua soluitur semper p. 570. aliqua ochrae martialis portione destituitur, quae fundum vasis petere solet. Id prohibendi duplex ratio est; nimirum aut acidi vitriolici tantillum affunditur, aut solutio aliquoties coquitur. Ex aqua ad colcotharis vitrioli lotionem adhibita sal quoddam euaporatione obtinetur, micaceum, in quo partim terreae, partim ferrugineae basi acidum adhaeret. Vitriolum cum inflammabili quadam materia vsum pyrophorum producit, vulgari tamen inferiorem.

Calces ferri materiam inflammabilem, qua p. 582. priuatae fuerunt, facillime recuperant, dummodo cum oleo vel pinguedine igni committantur, ita tamen, ut aëris accessum remoueas. MAIAVLTIUS medico Parisiensi hoc inuentum debetur.

*Crocus martis aperitiuus* STAHLII, qui ex p. 590. *tingtura martis alcalina* affuso acido nitroso decidit,

a magnete quidem non attrahitur, acidis vero solvi potest. Nitrosa eius solutio coloris straminei est, qui in nulla alia martis solutione observari solet.

p. 591. Vapores ex solutione martis in acido salino prodeuntes allium redolent flammaque admota cum strepitu accenduntur.

p. 596. *Lixivium phlogisticatum* s. *sanguinis*, quo affuso ex solutione vitrioli martis *coeruleum Berolinense* praecipitare neminem fugere arbitramur, carbonum vegetabilium ope haud infeliciore cum successu, quam cum carbonibus ex animali regno petitis praeparari potest; in illis tamen vehementiore igne, quo vrantur, opus est. Caeterum nulla est aluminis in conficiendo coeruleo Berolinensi necessitas; neque, ut color eius fiat floridior, ad salis acidum refugiendum erit, dummodo lixivio sanguinis, antequam cum vitrioli solutione confundatur acidum quaecunque adpersum fuerit. In coerulei Berolinensis natura explicanda, Noster MACQVERVM sequitur, qui ferrum hac operatione phlogisto abundanti onustum reddi existimat; repudiatis GEOFFROY et MAINONII opinionibus quorum alter sanguinis oleosam partem bituminoso ferri principio iunctam coerulei coloris causam esse autumabat; alter vero colorem ferri proprium et nativum quasi hoc labore restitui volebat, dum nempe ferrum liquore alcalino phlogistico praecipitatum omni materia aliena et salina alias ipsi adhaerente priuaretur. Posset forsitan absque vitriolo fieri coeruleum Berolinense aethiope vel limatura martis et lixivio phlogistico, inuicem commixtis atque per sat longum tempus digestis. Per destillationem ex coeruleo Berolinensi alcali volatile tam fluidum, quam solidum et oleum empyreumaticum elicitur; atque  
idem



idem semper huius laboris est euentus, siue animale siue vegetabile carbonem in lixiuio sanguinis parando adhibueris. Coeruleum Berolinense ab affuso lixiuio alcalino omni orbatur colore; liquor filtratus *alcali phlogisto saturatum* (*alcali Prussien saturé*) sistit, succineo colore tinctum flores persicae redolens, alcalinam naturam neque sapore neque efferuescentia cum acidis, neque coloris coerulei vegetabilium mutatione prodens; omnia tamen metalla ex solutionibus acidis deturbans. Semper tamen huic lixiuio phlogificato aliqua coerulei Berolinensis particula inest, quae, adperso acido, manifestatur. Tutissima vero ratio illud ab omni coerulei Berolinensis admixtione liberandi est, si acetum destillatum affundas, quod acidi genus nullo ferro adulteratum esse solet; deinceps vero omni peregrina substantia exclusa tantum salis lixiui addas, quantum ad saturandum acidum sufficiat.

Sulphuris et ferri aquae adminiculo inter se p. 608. mixtorum spontaneum incendium plurimi Auctores a frictione particularum deriuare conati sunt. Quorum sententiae haud suffragatus Noster, illud incendii phaenomenon aliunde potius repetendum esse censet. Cum nempe aquae magna erga ferrum, nec minor sit ferri erga sulphur propensio, efficitur inde, vt ferrum, ab aqua corrosum diuisumque subtilissime, sulphur aggrediatur, quod, hac ratione euoluta aliqua phlogisti sui portione vehementer immutatur. Dum itaque ignis paulatim extricatur, calorque identidem augetur; fieri non potest, quin aqua vaporibus absumatur, atque tandem exsiccata materies prae summo calore, sulphur, quod a ferro nondum fuit destructum, flamma manifesta deflagret. Terrae motus atque concussiones a simili causa pendere videntur.

tur. Caeterum et hoc notabile est, ferrum, si igne probe excandefactum est, statim adperso sulphure colliquari.

- p. 616. *Crocus Martis* ZWELFERI ex nitri cum ferro detonatione ortus. *Flores salis ammoniaci martiales* falso plerumque ita praeparantur, ut plus ferri, quam salis ammoniaci adhibeatur. Namque cum ferrum dirimere soleat coniunctionem, quae inter alcali volatile et acidum salis est, cauendum erit, ne ferrum prae sale ammoniaco dominetur. Id enim tantum, quod ferri vim eludit, in flores compingi solet.
- p. 621. Ferrum cum arsenico, regulo cobalti, nicoli et antimonii coniungi potest. Cum bismutho, plumbo, et mercurio combinari recusat. Mercurium sublimatum corrosivum humida via in partes suas constituentes resoluit. Zinco perinde ac stanno imbracteari atque hac ratione a rubigine defendi potest.
- p. 632. *Cuprum* vehementissimo igne tortum flamma coerulea flagrat, floribus simul auolantibus ex viridi cinereis.
- p. 648. Quod cuprum ex solutionibus suis ferri adminiculo sub forma metallica praecipitetur, ferroque immerso apponatur, id Noster abundanti ferri phlogisto, quod cupro soluto sese admisceat,tribuendum esse censet.
- p. 656. *Cuprum album* ex cupro et arsenico fabrefactum diutius protracta atque iterata fusione molitiei et tenacitatem, quam perdiderat, recuperat, constante tamen colore argenteo.
- p. 658. *Metallum Principis ROBERTI et aurichalcum*, (*Tombac, similor, cuivre jaune*) ex cupro, quod notum est et zinco fiunt. Quo plus, cupri additum fuit, eo obscurior color est. Vehementi igne zincum omne abigitur superstiti cupro rubro sincero.



sincero. Arsenico pallidior color huic metallo conciliatur.

Cum bismutho, Auctore GELLERTO cu. p. 662. prum coniungi potest. Mercurium ex acido nitroso sub metalli specie deiicit. Dirimit etiam eiusdem cum acido salino coniunctionem. Cum stanno mixtum rigescit, fragiliusque redditur. Oriuntur inde varia metalli compositi genera ad campanas, et tormenta bellica idonea. Cum ferro Noster cuprum nunquam fusione miscere potuit.

### III.

Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniae et Noruegiae, in ducatibus Slesuici et Holsatiae, et in comitatibus Oldenburgi et Delmenhorstiae : ad illustrandum opus de iisdem plantis, Regio iussu exarandum, florum Danicae nomine inscriptum ; editae ab eius operis Auctore GEORGIO CHRISTIANO OEDER. Volumen tertium, continens Fasciculos VII. VIII. IX. seu Tabulas CCCLXI—DXL. Hafniae. Typis Claudii Philiberti 1770. Volumen quartum, continens Fasc. X. XI. XII. seu Tabulas DXLI—DCCXX. ibid. 1777. fol.

Splendidi huius operis continuationem indicaturi id, quod iam alibi enarrauimus \*), repetamus, Ill. O. F. MÜLLERVM a fasciculo XI. eius editionem curasse, atque ita diligenter, ut eadem elegantia atque cum ipsis plantarum prototypis con-

Q 4

venientia

\*) vid. Comm. Nostr. Vol. XXI. p. 173.

venientia confectas reperiamus icones, qua se priorum voluminum commendarunt tabulae. Exceptis enim paucis quibusdam, quarum color a naturali plantarum nonnihil recedit, imaginibus, omnes plantas ita bene repraesentant, ut primo intuitu easdem cognoscas. Eadem etiam est adhibita solertia in florum partibus sexualibus extricandis, atque fasciculo duodecimo adiunctus est index plantarum omnium alphabeticus, et earum, quae iam depictae sunt, et quarum imagines sequentibus fasciculis tradentur. Reperiuntur itaque plurimae plantae Europae toti indigenae, adeoque satis notae, primum tamen viuis coloribus illustratae, quaeque, si opus perfectum reddendum erat, abesse non poterant: Vix dubitamus, quin plurimi botanici elegantissimas et fidas harum plantarum icones sibi comparent vel sint comparaturi. Ideoque hic nonnullas rariores tantum, atque novas, vel eas, quarum LINNEVS nondum meminit, indicemus.

Ad priores referendae videntur.

- Tab. 361. *Dentaria bulbifera* LINN.  
 - 364. *Ruppia maritima*.  
 - 386. *Cardamine petraea*.  
 - 389. *Arenaria tenuifolia*.  
 - 418. *Koenigia Islandica*.  
 - 557. *Lepidium latifolium*.  
 - 559. *Silene armeria*.  
 - 566. *Anemone Groenlandica*.  
 - 567. *Lepidium Groenlandicum*.  
 - 568. *Scilla bifolia*, in insula Feroë habitans.  
 - 569. *Lepidium Alpinum*.  
 - 585. *Chelidonium Glaucium*, creuit in Iütlandia.

Tab.



Tab. 624. *Arenaria peploides*: in littoribus Daniae et Noruegiae.

630. *Hordeum maritimum*.

Nouas has notauimus.

Tab. 371. *Carex diuisa*, spica composita, spiculis rotundis confertis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo subtereti. HVDS. 348. In locis sabulosis maritimis.

Tab. 425. *Carex*, spica mascula terminali, femininis tribus quatuorue subsessilibus axillaribus distantibus per totum culmum foliosum, caule repente. In arenosis maritimis et syluaticis prope *Wemmeltofte* Sicellandiae.

Tab. 432. *Carex*, spica vnica subrotunda, glumis ouatis, breuissime aristatis. AN HALL. 1354? In arenosis maritimis *Noruegiae*.

Tab. 442. *Carex* spica mascula et femineis tribus subsessilibus in summo culmo approximatis, cum folio singulae suo, infimo culmum excedente. AN HALL. 1374? In vliginosis syluaticis Daniae.

Tab. 444. *Carex* spica mascula et femineis duabus ouatis approximatis subsessilibus in axillis succingentium foliorum. AN *Carex montana* LINN. In vliginosis.

Tab. 441. *Iunci pilosi* LINN. var. floribus fasciculatis HALL. in Noruegiae syluis subalpinis.

Tab. 390. *Saxifraga* foliis caulinis palmatis petiolatis, caule bulbifero subramoso et multifloro. AN *S. bulbifera*. In Islandia.

Tab. 688. *Rosa mutica* germinibus globosis, pedunculis petiolisque glabris, caule aculeis raris flaccidis. HALL. 1107. In fruticeto rupestri littoris *Dröbakensis*.

Tab. 691. *Plantago squamata*, foliis semicylindraceis integerrimis basi glabris, scapo teretibus subpiloso. Flor. Fridrichsd. 126. In sabulosis Ducatus Slesuicensis.

Tab. 701. *Agrostis sylvestris* petalo exterioribus pubescente, arista dorsali longa. Raro in agro Fridrichsdalensi.

Tab. 703. *Carex maritima* spicis pendulis: masculis pluribus, calycibus aristatis. In littore Dröbakienfi.

Multae species nouae ex Cryptogamiarum classe: vt Tab. 394. *Fucus* fronde cartilaginosa, plana, supradecomposita, segmentis linearibus, apice globuliferis. Quaeritur an sit *F. gigartinus*, LINN. differt tamen hic apice setifero.

Tab. 405. *F. digitatus* alueariorum Loesel. Pruss. 4. 17. videtur nobis *Clauariae* species, forte *C. fastigiata*, LINN.

Tab. 408. *F. cartilagineo corneus* teres, vagis ramis multifidus, apicibus acutis. An *F. albus* HUDSONI.

Tab. 420. *F. fungularis* IMPERATI 748. MORIS. III. 645. vix dubitamus, quin ad *Agaricos* pertineat.

Tab. 652. *F. roseus* frondibus membranaceis repandis laciniatis petiolatis, caule tereti subramoso. An *F. rubens* LINN. In Sinu Dröbakienfi.

Tab. 651. *Conferua sericea*, filamentis geniculatis ramosis, ramis fasciculatis, confertis, viridibus. Enum. Flor. Dan. 69.

Tab. 653. *Ulva incrassata*, fronde ramosa, ramis simplicissimis teretibus lubricis apicem versus crassioribus. Raro in Sinu prope Laurvig.

Tab. 462. *Lichenoides gelatinosum atrovirens*. BILLEN. 140. t. 20. f. 24. *Marchantia* LINN.

Tab.



Tab. 463. f. 1. *Lichen gelatinosus*, laminis verticalibus vndato crispis, superficie densi cespitis irregulariter crispa, peltis marginalibus spadiceis. f. 2. *Lichen gyrosus*, gelatinosus, laminarum verticalium marginibus subaequalibus, superficie densi cespitis eleganter gyrosa: peltis marginalibus spadiceis. Ambo terrestres in vmbrosis.

Tab. 464. *Peziza polymorpha*, atrofusca, carne cerea gelatinosa, primum caua, per maturitatem farcta, pileo e medio succrescente rugoso in stipite breui crasso. In cortice ligni fagi. vid. MÜLL. aët. Holm. 1762. f. 3.

Tab. 469. f. 2. *Peziza radiata*, pileo patente membranaceo fibroso striato et zonis picto. In Islandia.

Tab. 566. *Lichen Groenlandicus*, foliaceus repens, lobis ad horizontem obliquis, rotundis concavis, fungulis marginalibus, viridulo glaucescens, inferne niger. Edulis est in Groenlandia, eoque multi contra haemoptysin non sine fructu vtuntur.

Tab. 467. f. 1. *Mucor*, (Trichia) capitulis miniatis, stipitibus breuibus nigris. f. 2. *Mucor* (Trichia) capitulis pyriformibus rubro aurantiis, stipitibus breuibus albis. Ambo habitant in cortice *Vini sylvestris* f. 3. *Mucor* (Trichia) capitulis nigris, stipitibus longioribus fuscis. Parasitica in aliis plantis.

Tab. 468. f. 2. *Lichen leprosus*, cinereo glaucescens, sine scutellis, crusta rimis infinitis diuisa. In faxis *Bornholmiae*. f. 3. *L. leprosus*, albicans crusta rimosa, insulis subrotundo angulosis, scutellis glaucis albo margine. *Ibidem*.

Tab. 470. f. 1. *Lichen leprosus*, ruber tuberculis nigris. f. 3. *L. gelatinosus*, imbricatus, lobis obtusis laceris, peltis fuscis proliferis. Ex Islandia.

Tab.

Tab. 472. f. 3. *Lichen leprosus*, crusta alba glaucescente, rimis in maculas subrotundas diuisa, tuberculis atris, in lineas curuas dispositis. In scopulis maritimis Noruegiae.

Tab. 478. *Bryum* foliis striatis acuminatis reflexis, capsulis sphaericis subnutantibus, maturitate striatis. In saxis irriguis alpium Noruegarum rarius.

Tab. 538. f. 1. *Bryum* foliis capillaribus, capsulis oualibus erectis in pedunculis breuibus. f. 2. *Bryum* foliis fetaceis curuatis, capsulis erectis obtuse ouatis, capitello oblique rostrato: apophysi capitulo subiecta. In humo atra irrigua prope Christianiam.

Omittimus Fungos nouos, vt *Amanitas*, Tab. 491. 540. 599. 600. *Eluelam* Tab. 534. *Phallos marcidum* et *conicum* Tab. 654. *Trichiam*, *Pezizam*, *Merulium* Tab. 655. 656. Id momentes Tab. 657. 658. *Clauarias* egregie depingi, in quibus Cl. MÜLLER loco seminum animalcula protrudi vidit, quemadmodum in Aëtis physicis Berolinensibus egregie exposuit\*) vnde etiam easdem animalibus adiunxit \*\*). Tab. 660. *Conserua stellaris* depingitur, de qua plura in diario, naturae scrutator dicto \*\*\*), disseruit Cl. Auctor.

Animaduvertere licebit haec. Fasc. IX. T. 483. *Pulmonariae*, quae hic dicitur *angustifolia*, nimis lata pingi folia, vt nobis magis varietas latifoliae videatur, quam vera species Linneana, quae foliis prorsus lineari lanceolatis instruitur, Tab. DXLV.

in

\*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 686.

\*\*) Zool. Dan. Prodr. p. 256.

\*\*\*) *Naturforscher* VII. St. S. 189.



in *Sambuco nigra* saepe stamina sex picta sunt, quae tantum quina adesse deberent. In T. DLIV. *Eryngii campestris* florem vnum, anatomicè dissectum, et magnitudine auctum desideramus. Quae hic Tab. DLXIV. *Agrostis stolonifera* dicitur, omnino *Alopecurum geniculatum* repraesentat. Myosotidis scorioidis naturalis amoenusque color in Tab. 583, vix arte est satis imitatus. Neque apud nos locum habet, quod hic dicitur, flores eiusdem in locis aridis corollas luteas nancisci. *Teucrium scordium*, quod hic Tab. 593. floribus purpureis pictum est, nobis semper floribus coeruleis obuenit. De Anthemide, Tab. 685. depicta, ipse Cl. Auctor dubitat, an sit *tomentosa* LINN. etsi descriptio ab Eodem data satis conueniat.

#### IV.

NIC. IOS. IACQVIN *Miscellanea Austriaca ad Botanicam, Chemiam, et historiam naturalem spectantia, cum figuris partim coloratis. Vol. I. Vindebon. 1778. 4to pagg. 212. tabb. aer. 21.*

Collegit Cl. IACQVIN in opusculo, cuius summam iam indicabimus, varios tractatus, quos partim Ipse, partim alii in Vniuersitatibus Austriacis scripserunt, siquidem sic fuerint comparati, ut vi-  
torum doctorum mereri videantur attentionem. Continentur vero in primo hocce volumine:

I. NIC. IOS. IACQVIN *Genitalia Asclepiadearum*. Exposuit hic structuram partium florem p. 1. constituentium diuersarum *Asclepiadum* plantarumque his affinium, quorsum *Periplocae*, *Cynancha*,

*cha*, *Apocyna* atque *Stapeliae* pertinent. Retulerunt adhuc botanici has plantas omnes ad earum vegetabilium censum, quibus natura stamina quinque donauit. Cl. Auctor vero primus oculi armati ope detexit corpuscula vulgo pro staminibus habita hoc nomine neutiquam esse insignienda, sed alia quaedam, quorum in singulo flore reperiuntur decem. Nos in natura harum partium exponenda propterea erimus breuiiores, quod iam olim, cum I. T. KOELREVERTERI super eadem re\*) indiceremus commendationem, rem ipsam fusius exposuimus. Incitabatur vero KOELREVERTERVS, ad harum plantarum disquisitionem, Cl. IACQUINI exemplo, cuius quoque asserta vario modo emendare studuit. Sic *Periplocam Graecam* quinque modo gaudere staminibus, antheras *asclepiadearum* male pro fertililibus haberi, quia pollen contineant nullum, ipsarum corpusculum truncatum, vt a LINNEO dicitur, male cum stigmate comparari, asseruit. His, introitus loco, a Cl. Auctore Nostro recensitis, singulae KOELREVERTERI obiectioni satisfacere est annisus. Quod ad *periplocam* attinet *graecam*, docet plantam respectu numeri antherarum decandris vtique esse associandam, quamuis ipsi quinque modo contingant filamenta. Cum itaque singulo filamento anthera duplex infideat, minime reprehendendus videtur Noster, si plantam ipsam decimae systematis Lineani classi inseruerit. In denominatione antherarum, suam sententiam propterea non mutauit Cl. IACQUINVS, quod dubium a KOELREVERTERO motum, potius verba, quam rem ipsam spectat, parum enim certe interesse videtur, vtrum massa foecundans gluten sit, an puluis tenuissimus, si ab

hac

\*) v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 4.



hac ipsa materia modo foecundationis negotium peragatur. Corporis truncati figura cum alia re nulla tam idonee comparari posse Nostro videtur quam cum stigmate, quare donec obseruatis meliora fuerit edoctus sententiae suae deditus manebit. His praemissis transit ad *Asclepiadearum* p. 9. Vindobonae viuentium generationem describendam. *Apocynum Sibiricum*, *Apocyno cannabino* LINNAEI simillimum et *Periploca Graeca*, anthera in quouis filamento praedita sunt duplici. *Periploca Africana* similis est *Asclepiadi Vincetoxico*, *A. nigrae* et *Cynancho acuto*, vagina ab nectario adscendente pistillumque ambiente, staminibusque decem stigmati adnatis; hincque Gynandriae Decandriae, nec *periplocae* generi, annumerari debet. *Cynanchum erectum* bracteis vaginae loculamentis destitutis et stigmate elongato conico crasso a congeneribus differt. Reliquae *Asclepiadis*, quas disquisiuit, species, gynandrae sunt, squamis nectariferis cingunt stylos, antherasque in bracteis ex duplicatis nectarii productionibus confectis recondunt. *Stapeliae* tubercula staminifera angulis marginalibus stigmatis adnata, ab alarum interiorum productione facciformi teguntur.

Ex situ hoc insolito antherarum atque vaginarum, minus recte Cl. KOELREYTER collegisse videtur, quod per facculos hos materia foecundans deferatur ad germina; cum via pollinis exsudentis ad stigma accommodatior sit, atque cum facculi hi pistillum in marginis puncto modo tangant nec ei accrescant. Formam florum iam nominatorum a tabula prima ad quartam tradi curauit.

2. *Compositiones medicamentorum pharmaceuticae generales*, a IOS. SONNAVER. Nobis libelli huius p. 32.

huius perquam docte scripti summam, alia occasione accurate exponere animus est.

p. 133. 3. NIC. IOS. IACQVIN *Semperuium sediforme monstrosum*. Aberrauit planta a naturali forma racemis superius foliosis et floribus petalis quatuordecim instructis. A *Sedo rupestri*, cui *semperuium* hoc vel LINNEO teste simillimum est, differt, quod huius folia in apicem acutum attenuentur, quae illi sint obtusiora; luteo deinde colore *sedis* petala a *semperuiui*, albi nimirum, distinguuntur; caulis denique, qui ad efflorescentiam usque in *sedo rupestri* nutat, in *semperuiuo sediformi* semper conspicitur erectus. Figura huius plantae tabula quinta cernitur.

p. 135. 4. EIVSD. *fungi quidam subalpini*. Primus illorum est *clathri* species, quam pro *denudato* LINN. Noster habet. Omnis huius fungi superficies rubra est, praeter verticem fuscum. Cortex capituli, insidet nimirum fungulus stipiti erecto tenui, glaber est et in breues pilos ita immutatur, ut nunc globus filorum rubrorum conuolutorum supersit. Vertex fuscus non mutatur. Quam naturam cum induit fungus, semina expellit plurima rubra minima. Fungus ipse in tabula sexta conspicitur. In tabula septima vero *Lycoperdum pififorme* LINNAEI reperitur, quod rarius descriptum cum *Lycoperdo epidendro* multum conuenientiae alit. In tabula octaua fungus repraesentatur super *Agarico reticulato* etc. MICHELII natus, pultiformis, parum mammillaris, luteus, quam microscopio teste *Lycoperdis* annumerari possentur. *Hydnum gelatinosum monstrosum* acubus totum fungum obsidentibus tabula nona reperitur.

Fungus



Fungus in tabula decima depictus est *Peziza coronaria*, cyathiformis vtrunque glabra, limbo laciniato erecto; color intus fuscus, foris pallidus. *Boletus medulla panis*, LINNÆO incognitus, crustaceus albus, super lignis putridis diffusus, in superficie superiore foraminulis perforatus, suaveolens, in tabula undecima est depictus. Tabulae duodecimae mandatus est *Boletus leptocephalus* stipitatus, pileo plano tenui, orbiculari, supra cervino subtus albo, stipes rarius centro pilei inseritur. A *Boleto perenni* LINN. differt eo, quod fasciis illis diuersicoloribus, quae *Boleto perenni* tribuuntur, sit destitutus. *Tremella mesenteriformis* apud LINN., quamvis ab aliis multis descripta, non reperitur. Est vero gelatinosa, tremula, pellucida, alba vel lutea, in plicas intorta, stipite caret. Figuram ipsius tabula 13. offert. *Tremella rufa* ad longitudinem dimidiato infundibuliformis, gelatinosa, firmula tamen, ad solem pellucida, in tabula decima quarta cernitur. *Tubulifera arachnoidea*, fibris basi tela arachnoidea conuexis quam maxime accedit ad *tubuliferam Ceratum* florae Danicae. Est fungus gelatinosus, connexus, in superficie exhibens minima tubercula, quae apices sunt fibrarum crassarum, totum fungum constituentium. Tab. decima quinta ipsius formam diuersam sistit. In tabula decima sexta tandem depingitur *Tremella hydroides* IACQVINI, compresso plana, difformiter digitata, hirsuta, gelatinosa.

5. REV. FRANC. XAV. WULFEN, *plantæ rarior* p. 147.  
*iores Crainthiaca*. *Draba Fladnizensis*, a nemine adhuc descripta, in editissimis iugis super Alpes Fladnizenses radice perennat. *Cardaminen bellidifoliam* male cum *Cardamine resedifolia* ab HALLE-RO coniungi, ex descriptione illius exhibita de-  
 Tom. XXIII. Pars II. R mon-

monstratur. *Saxifraga burseriana* caule vniifloro semper gaudet, seiungenda itaque est illa huius plantae varietas, cui est caulis multiflorus. *Astragalus vralensis*, *Ranunculus Pyrenaeus*, *Cineraria Alpina*, *Primula villosa* et *Gentiana* quaedam, nana dicta, quarum plantarum plurimae LINNAEO iam cognitae sunt, descriptae reperiuntur. Cum de *Primula villosa* diceret omnium *Primulae* specierum characteres, in LINNAEI scriptis non sufficientes, accuratius exposuit. Plantae nominatae, praeter *A. vralensem* tabulis 17. et 18. sunt delineatae.

p. 164. 6. FR. RVBEL. *Agaricum officinale: dissertatio inauguralis medica, publicae disquisitioni submissa* Viennae d. 20. Febr. 1778. emendata et aucta. Praemissa veterum de ortu *Agarici* sententia, in locum natalem fungi inquiri Cl. Auctor, suis aliorumque observationibus persuasus affirmat, fungum in iis solummodo nasci regionibus, quae larices proferre solent. Colore variat, princeps tamen albus vocari potest. Inseritur Cl. WULFEN descriptio huius fungi, quae legi utique meretur. Iam de tempore colligendi *Agaricum* ad medicos vsus destinatum. De viribus *Agarici* multum disceptatur a practicis, sunt enim alii, qui salutares, alii, qui noxias ipsi adscripserunt facultates. Audiuntur quoque chemicorum super hoc fungo meletemata, quibus propria Cl. IACQVINI enchiresis subiuncta est. Tabulis 19-21. diuersae figurae fungi sunt delineatae.

p. 164. 7. *Aqua aërea Pragensis excerpta ex dissertatione inaugurali medica publicae disquisitioni submissa* a IO. MICH. HORNSTEIN. Viennae d. 20. Nov. 1777. Hanc, proxime indicaturi, iam omittimus.



*Das entdeckte Geheimniß der Cryptogamie. Eine der Chur-Pfälz. Academie der Wissenschaften zugebracht gewesene Preisschrift. von IOSEPH GOTTLIEB KOELREYTER der Arzneywissenschaft D. Fürstl. Badischer Rath und Professor der Naturgeschichte; der Russisch Kaiserl. Academie der Wissenschaften und der freyen oeconomischen Societät zu St. Petersburg; der Chur-Pfälz. Academie, der Fürstl. Hessisch. Societät der Wissenschaften, und der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde Mitglied. Carlsruhe. 1777. 8. Bogen 10.*

i. e.

**Cryptogamiae mysterium detectum, Auctore IOSEPHO GOTTLIEB KOELREYTERO.**

**C**onsiderat Cl. Auctor in hac diatribe in primis fructificationis plantarum cryptogamicarum partes et quamvis recentissima HEDWIGII observata, saltem in muscis, saepe contrarium demonstrant, tamen adhuc multa alia memorabilia et notatu digna in eadem leguntur. Postquam igitur demonstrare conatus est, in plantis cryptogamicis antheras haud necessarias esse, neque pulverem in capsis lycopodii, polytrichi et aliorum muscorum contentum pollinis munere fungi, ad Iungermannias progreditur, in quibus eam partem, quam SCHMIEDELIVS corollae nomine insigniuit, pro parte mascula habet, quam ex substantia corticali oriri, atque serpentinis et succosis vasculis ornari monet. Sub hac parte mascula reconditur globulus siue pars feminea, quae ex

p. 9.

R 2                      medul.

- p. 15. medullari nascitur substantia. Sic quoque in fructificatione et umbellata siue conica, et stellata Marchantiarum obseruauit membranam aliquam fuscam, et vesiculas, quae masculae partis loco sunt, atque ouaria, in quibus semina offenduntur, quae a nonnullis pro antherarum puluere sunt habita. Foliola, quae in calyciformibus foliorum
- p. 28. cauis animaduertuntur, alius generis semina vocat, quae nouas possint facile procreare plantas, quemadmodum variis obseruationibus comprobasse sibi persuadet.
- p. 30. Grana, quae ex tuberculis Blasiae proueniunt, semina sunt, puncta autem siue corpuscula illa nigro virescentia, quae foliis insident, pro foliorum gemmis agnoscit. In Anthocerote vagina externa partem masculinam constituere videtur.
- p. 32. Deinde muscorum partes fructificationis perscrutatur, atque calyptram corticalem, vasculosam, et succo plenam masculam partem nominat, atque experimentis institutis suam opinionem confirmare annititur. Polytrichi, nimirum communis, nonnullas capsulas, quas pro veris seminum capsis habet, quasque semina continere dicit, calyptris pilosis orbauit, atque cognouit capsulas calyptris orbatas interiisse, capsulas vero calyptris ornatas incrementum laetum cepisse. Quamuis autem ex his concludat, calyptram esse partem fructificationis masculam, tamen illa experimenta in multis aliis muscis instituta nihil aliud fortasse probant, quam calyptram defendere et munire capsulas, ne exsiccant, intimamque esse coniunctionem operculum inter et calyptram,
- p. 41. qua deleta vigor capsularum pereat. Verum enim vero nobis illa placuerunt, quae Cl. Auctor de perichaetio Polytrichorum et Hypnorum habet,  
quod



quod in prima musci iuuentute cum calyptra conexum putat, atque de interna calyptra, quam MEESE et LEERS iam obseruauerant, proponit.

Flores stellatos siue rosulas *Polytrichi com-* p. 61.  
*munis*, qui mense Martio et Aprili conspiciuntur, atque ex squamis variis, luteis clauis atque fusi-  
formibus corporibus componuntur, hermaphro-  
ditos agnoscit atque arbitratur luteis cla-  
vis auram seminalem contineri, corpuscula fusi-  
formia vero esse semina singularis naturae. Idem  
de *Mniorum* rosulis sibi persuadet, quae similem  
propemodum habent structuram et partes. Pul- p. 67.  
vis *Lycopodii* non pollen antherarum est, sed se-  
mina constituit, quia in aqua non intumescit, se-  
minis formam habet atque aliae partes fructifica-  
tionis adsunt, nimirum membranae quaedam,  
quae ex corticali substantia originem ducentes  
capsam loco antherae circumdant.

Filicibus autem inuolucra siue velamenta p. 76.  
quaedam data sunt, quae ab initio alba, sensim  
magis fusca, succis copiosioribus repleta, ex vasis  
serpentinis constantia atque tempore coitus splen-  
dencia ex corticali substantia prodeunt, atque ma-  
sculinas partes fructificationis constituunt, cum e  
contrario femininae partes ex medullari substantia  
originem ducant, atque illis subiiciantur. Quae p. 97.  
inuolucra in variis *Polypodiis*, *Aspleniis*, *Adiantis*  
et aliis filicibus varia notat atque quoque de se-  
minum numero, varia figura et colore multa  
egregie et accurate commemorat. Sic quoque  
*Ophioglossum*, *Onocleam sensibilem*, *Osmundas* ea-  
rumque partes dilucidat, partesque fructificatio-  
nis distinguit. Mox enarrat quaedam experimen- p. 109.  
ta, quae cum filicibus instituit, quibus apparebat,  
collectiones capsularum inuolucro remoto interi-

- p. 112. re neque semina matura offerre. Semen filicum eadem ratione inflammabile est, quemadmodum
- p. 115. semen Lycopodii. Neque florem Equiseti omisit, quem diligenter examinavit atque putat externam scutorum atque capsularum seminalium membra-
- p. 122. nam masculam esse partem. Denique de Chara, Marsilea, Pilularia et Isoëte pauca adiungit.
- p. 124. In Lichenibus quoque assumit medullosam substantiam semina formare, corticalem vero et externam superiorem laminam succo plenam fructificationem exercere. Similem substantiam duplicem, medullarem aliam, aliam corticalem in Fuco, Ulua, Tremella, Conferua et Byssu quoque supponit. Fere eadem ratione explicat exemplo Lycoperdi stellati fructificationem in fungis.
- p. 131. Denique collegit nonnullis propositionibus libelli sui summam, quarum praecipuae et principales sic se habent: in plantis cryptogamicis, uti in perfectis, sexum locum habere; omnes earundem veros flores seu partes fructificationis utriusque esse sexus, itaque flores hermaphroditos; hasce plantas cryptogamicas non habere pollen, sed loco eius algis e. g. Jungermanniiis, et Marchantiis esse masculos sacculos, muscis calyptras, filicibus involucria, fungis membranas; plantasque cryptogamicas habere semina vera neque vanum aliquem pulverem; tempus, quod hucusque in muscis et reliquis plantis cryptogamicis inflorescentiae tempus iudicauimus, esse seminationis et fructus tempus; denique magis per semina, quam vlla alia ratione etiam plerasque plantas cryptogamicas vna hac ratione seruari. Quod etiam acriter contra eos defendit, qui plantas cryptogamicas cum polypis comparant, autumantes per  
gemmas



gemmas propagationem fieri. Atque haec sunt pauca ex pluribus, primae lineae ex libro lectu dignissimo, qui praeter indagationem plantarum cryptogamicarum multas alias egregias annotationes continet. De eo verum dubitamus, quod p. 135. Cl. Auctor sperat, hoc suo inuento genera et ordines Linneanos atque totum systema cryptogamicum multas mutationes expertura esse.

# VI.

CHRISTIANI FRIDERICI LVDWIGII, epistola ad FRIDERICVM ANDREAM GALLISCHIVM. M. D. De sexu muscorum detecto. Lipsiae. Literis Breitkopfii. 1778. 8.  $\frac{1}{2}$  plag.

Subiungimus hanc gratulatoriam diatriben, quippe quae in historia botanica literaria notatu digna sit, quum in ea, et testibus oculatis, et ipsius Auctoris experientia demonstratur, KOELREVERTERVM, virum clarissimum, neque primum, neque recte muscorum sexum detexisse. Etenim iam anno 1774. aut 1775. HEDWIGIVS, botanicus oculatissimus, M. D. Chemnizii, femineos et masculos flores muscorum detexit, ideoque KOELREVERTERO, qui anno 1776. observationes suas instituere coepit, prius. Detexit item HEDWIGIVS veras muscorum antheras, iisque adposita fila succulenta articulata, vt et pistillum: atque plurimos ex muscorum familia dioecios, pauciores monoecios, paucissimos hermaphroditos inuenit. Tempore igitur antecedunt HEDWIGII obseruata, atque analogiae cum reliquis plantis melius respondent: nos autem de iis ipsis, quae Cl. HEDWIGIVS ipse iam euulgauit, dicemus paullo inferius plura.

VII.

Conamen mappae generalis medicamentorum simplicium secundum affinitates virium naturalium, noua methodo geographica dispositorum, Auctore GEORG. CHRISTPH. WÜRTZ M. D. cum tab. aen. Argentorat. 1778. 4. sumtibus sociorum Bauer et Treuttel. pagg. 221.

**P**rima pars huius libri agit de praestantia methodi geographicae in delineandis corporum naturalium affinitatibus, quam speciminis inauguralis loco in Argentina Academia iam defendit; secunda vero pars mappam ipsam per principia sua illustratam sistit, in qua potissimum theoria enucleatur a Nostro, vnde totum de medicamentorum affinitatibus systema tam sanae rationi, quam experientiae consentaneum erui et haec scientia in certiore aliquem ordinem redigi queat.

Praemissis variis veterum ac recentiorum naturae scrutatorum tentaminibus de scala et nexu naturae, de methodo naturali, de systemate naturae cet. ad methodum aliquam detegendam Cl. Auctor animum adstrinxit, qua singuli hi diuersissimi nexus non amplius in scala quadam systematica, sed in decussionibus potius in natura ipsa dictitatis omni luce depingi et per singulos affinitatum gradus delineari possent, et inuenisse quandam credit, quae ni optima, tamen reliquis omnibus praestare, et ad hanc scientiam commodissime gratissimeque applicari posse videtur; putat methodum mappalem, cuius specimen in adiecta tabula, materiae medicae affinitates exhibente, proposuit Cl. Auctor. Est methodus,



us, quae mapparum geographicarum tramitem et constructionem exactissime consequitur, quae regnorum loco, genera, urbium autem, species delineat, affinitates per vicinitatem, istarumque gradus per varias huius distantias designat. Cuius praestantia antequam fusius demonstraretur, in haecenus usitatae methodos, num nimirum inter eas iam aequae utiles sint, ac Nostri methodus, inquiritur, ne omnis novitatis suspicio atque studium a se remoueatur.

Perquisitis ergo plurimis haecenus cognitis p. 12. methodis, in quibus omnibus affinitates corporum vel plane neglectae, vel, uti Nostro videtur, non satis accommodatae sunt propositae, suae ipsius novae methodi praestantiam vberius persequitur. Ac primum quidem est ea simplicior, minus p. 18. praeceteris implicita, nec tot linearum intervallu eget: *Secundo* gratior acceptiorque, inde surgit Lectori aspectus. *Tertio* nexus eiusdem substantiae cum pluribus aliis generibus (qui antedictis methodis non nisi cum nimia rerum complicatione sisti potuissent) commodissime designat, eandem istis interponendo. *Quarto* corpora, quae characteres plurium generum participant, non cum singulis hisce aequo gradu conveniunt; si ordinem naturalem itaque pressiori pede secuturi sumus, etiam hi gradus erunt determinandi, quod nulli autem iterum, praeter mappalem, methodo datur; tam commode absque verborum ambage sensui exhibere. *Quinto* corporum varias mixtiones, prouti hae innotuere, non rationi per longas dissertationes et vastum verborum apparatus demonstrat, sed sensibus ipsis gratissime quasi depingit. Atque illud ipsum, ultimo loco positum,

hanc methodum aliis potissimum praestantiorem reddere arbitratur.

p. 24. Omnia omnino corpora ex iisdem principiis sunt conflata et eadem germina fouent in tribus naturae regnis. Haec sunt elementa, quae, ut inde totus orbis conderetur, creauit Summum Numen et ex quibus, licet quadruplicis modo generis, tamen per diuersissimas coniunctiones tam admirandum varietatum spectaculum nobis elaborauit. Constant ergo animalia, plantae et mineralia eadem materia elementisque; differunt sola, qua composita deprehenduntur, horum proportionem. Quam ut experimenta dilucidarent, diu chemici tentarunt, nequaquam autem artem detexere illius differentias vno eodemque intuitu sensibus exhibendi, qua solis oculis, seposito omni ratiocinio, omnes illae in suo nexu conspici, diiudicari et cuique experimento chemico iterum applicari possent: hunc defectum, autem luculentissime supplet, uti Noster ratur, mappalis theoria, omnes istas per solum locum indigitans. Pone enim quatuor elementa ad quatuor plagas cardinales, uti in geographicis versus Orientem, Occidentem cet. cum corpora proportionem differant, quaedam plus terrae. alia plus aquae cet. in se ut contineant, necesse est: itaque ubi plus terrae corpori inest, admove proprius terrae, ubi plus aquae, aquae e. f. p.

p. 28. Omnium in genere corporum in rerum natura offendendorum differentiam in sola ipsorum elementorum *proportionem* esse positam ratur Noster et eandem sententiam de medicamentis fouere cogitur, ut et de eorundem virtute in sola ipsorum



rum *mixture* latente. Quae Nostro ergo plus terrae fouere videntur, versus plagam terrestrem ponit, quae plus aquae, versus eam e. f. p. Ita per distantiam relatiuam a quauis plaga elementa, eorum proportionem insimulque rationem, ex qua hi effectus medicati elucescunt, designat; ita, si notum est principium acre irritare, ex simplici huius tabulae aspectu mox elucet, in quonam gradu, quodque genus hoc praestet, pro sua nimirum ab eodem distantia cet. Has simplices elementorum vires denuo ratiocinium in compositas coniungat, sic si aliquod genus pari interuallo duabus plagis, acri et terrestri sit interiectum, concludas ad vim intermediam inter aequam roborantem ac irritantem; e. f. p. Quod nimirum in mappa sua quodlibet genus compositam vim gerat, ex quatuor elementaribus quidem conflata, sed ad eam eo magis accedentem, cui propius adscriptum: vt ita primo intuitu ad omnes virium combinationes ex sola distantia a quatuor plagis cardinalibus concludere possis, nec vastissima medicamentorum farrago memoriam amplius sua mole molestat. Mappa itaque haec generalis medicamentorum simplicium in icone est addita.

Progrediamur nunc ad alteram partem. Va. P. II. riis praemissis de principio actionis medicamentorum, de applicatione ad corpus humanum, in qua ad idiosyncrasiam et indiuiduorum mixtiones est respiciendum, experientia probatur, medicamenta non nisi relatiue agere. Hoc apparet ex diuersitate effectuum pro diuersitate corporum variantium, remediorum e. gr. laxantium, emeticorum, mercurialium cet. Relatiuos p. 46. porro aequo modo esse effectus per totum naturae ambitum assentiuntur quaecunque ceteroquin corpora p. 48.

corpora naturalia. Quae enim aliis animalibus infesta, eadem aliis vicissim plane sunt proficua. Homines purgat helleborus albus, brutis est idem venenum. Aqua bibitur ab omnibus lubenter et hydrophobici eam anxie reformidant cet.

p. 51. In sectione altera principiorum disquisitionem, ex quibus medicaminum verae diiudicari queant affinitates, Noster tradit. Haec sunt classificatio ex ordine naturali, GALENI principium, criteria ex sapore atque odore, observationum fides, adminiculaque ex chemia.

p. 64. Quibus perpensis nec vbique laudatis probatisque ad sectionem tertiam progreditur Noster et affinitates virium naturalium latere probat in sola mixtionum cognatione et hoc variarum mixtionum principio Nostri mappae nititur constructio.

p. 73. Iam de sensu chemico Noster agit. Mixtionem vero naturalem appellat, quae sensibus nostris percipitur, dum pharmaca non analytice per partes et ingredientia seorsim considerata, sed in concreto et compositione, qualia quaecunque in pharmacopoliis afferuantur, rimatur et proportionem relatiuam quatuor elementorum, in quocunque medicamento integro obtinentem, nullis nec verbis, nec experimentis determinandam, sed sensibus omnino dignoscendam et sua hac methodo exprimendam credit. Haec est, de qua semper in huius tractationis decursu est locuturus Cl. Auctor, designans proportionem quatuor elementorum, inter pharmaca relatiuam, composita vis, ex quacunque tali oriunda et quam chemiam antea appellauerat, ex illa facili ratiocinio deducenda erit, nunquam licet verborum descriptionem admittat. Prior semper posterioris est



est basis, dum enim mixtionem naturalem ignoras, nec inde compositam vim chemicam deduces, nec cognosces vim cuiusque medicamenti absolutam, nec ex priori iam praesagire ad quemque statum relatiuam, nec cum certitudine tuum remedium poteris adhibere.

Habitus alicuius corporis chemicus Nostro p. 75. dicitur, ex quo dignoscere possumus: an prae alio vel plus terrae, vel phlogisti, vel aëris, vel aquae vehat, qui itaque indicat mixtionem ipsius naturalem. Hoc fieri ex habitu, scilicet relatiue, plus quam verosimile redditur.

In sectione secunda Noster progreditur ad p. 83. criteria mixtionis naturalis. Sunt duo elementa solida, *Terra et Phlogiston* et duo pariter fluida, *Aqua et Aër*. Corporibus vel potius his ipsis elementis insunt characteres tanquam fundamenta et fulcra qualiscunque distributionis. *Soliditas* 1) p. 89. phlogistica viuida, acris torrida 2) terrestris, rigida. *Laxitas* in solidis, alias autem fluiditas 1) aquosa succositatis speciem prae se ferens 2) aërea, vappida languida, lenis blanda spongiosa? turgida?

Criteriis mixtionis naturalis demonstratis, p. 107. notas addit et ad sectionem tertiam progreditur Noster, cui inest demonstratio mappae sensualis. Postea ad demonstrationem mappae rationalis ve- p. 110. nit ac primum quidem de phlogisto agit. Quod Cl. Auctor intelligit semper in statu suo subtilissimo, purissimo et maxime elementari, nec varias distinctiones specificas chemicorum curat cet. Phlogiston porro esse acrimoniae principium Noster probat.

Ergo

- p. 134. Ergo accedit Cl. Auctor ad demonstrationem praecipuarum affinitatum ac primum quidem differit de roborantibus, dein de absorbentibus, adstringentibus, subadstringentibus, ad quae proxime accedunt amara. Porro agit de purgantibus et quidem specificis, incidentibus, aromatibusque.
- p. 148. Citri corticem crude ad aliquas drachmas manducatum valide purgare, Ipse Noster expertus est.
- p. 151. Cum aromatibus arctissimum affinitatis vinculum alunt irritantia, rubefacientia, inflammantia nec aliter differunt, praeter vehementiorem acrimoniae gradum. Tum sequuntur emetica, resinae,
- p. 156. purgantia resinosa siue irritantia. Sipientia tantumquam acria agunt. Vis aromatum, resinarum irritantiumque calefaciens non solo stimulo, quo solida afficiuntur, sed et simul cuidam acrimoniae phlogisticae, quam fluidis inducunt, est tribuenda.
- p. 161. Transit Noster ad resoluentia, quibuscum conveniunt incidentia ratione effectus, minime autem ratione agentis principii. Diuretica, fragrantia purgantia, eccoprotica, emollientia demonstrationem mappae rationalis finiunt.
- p. 188. Cum vero per instituti nostri rationem brevitati nobis esset studendum, synopsis totius systematis argumentorum, quam Noster addidit, trademus.

I. Medicamentorum vires quatenus per practicas observationes illustrantur, non nisi sunt relatiuae ad quemque statum, morbum et praesentium conditionum consensum; ergo nil certi et constantis ad generales pharmacorum affinitates stabiliendas nobis inde affluit commodi.

II. Inest tamen medicamentis aliquid sempiternum ab ipsorum existentia nunquam separabile, illorum naturam constituens, et ex quo  
tanquam



tanquam ex generaliiori principio, omnes hi relatiui euentus, diiudicandi erunt, vis scilicet cuius absoluta.

III. Hanc autem non nisi in ipsorum mixtione latere, atque ab hac sola pendere, colligere licet ex consideratione: mixtionem cuiusuis corporis et corpus ipsum, esse synonyma. Cum autem in vltimo delitescat haec vis, et insita esse debet illi priori.

IV. Sin autem a mixtione pendeant vires corporum absolutae, a se inuicem debent differre in ea ratione, qua mixtiones a se inuicem discrepant.

V. Qualescunque mixtiones, chemica analyfi diiudicatae, ad eadem fere principia reducuntur: quo ergo a se inuicem distant, ab horum sola varia proportione deriuandum.

VI. Huic autem exhibenda chemica experimenta nequaquam sufficiunt; sed alia patet via, qua clarius, distinctius accuratiusue determinetur; via experientiae pie respondens.

VII. Est ea, quae sensuum diiudicatione exaratur, cuiusque characteres et principia Cap. II. §. II. explanauit Cl. Auctor.

VIII. Cum illorum ope, an et in quam proportionem, alterum quoddam prae altero corpus vel plus principii inflammabilis, vel terrae, vel aquae etc. vehat, relatiue delineare possimus, per eandem facilem gratamque encheïresin, quoque de singulorum corporum mixtionibus, in quibus absolutae vires sunt positae, certiores nos reddimus. Ergo has vltimas securissime sensuum interuentu possumus exponere, earumque affinitates, sola ad quatuor cardinalia puncta relatione, incorrupte exhibere.

His

- p. 189. Quo facto in capite quarto notas miscellas Noster proponit, in quibus partim ad varias obiectiões respondet, partim superius dicta illustrat, GALENI famam tuetur, qui de qualitatum cardinalium miscela loquitur et quem Noster imitatum vel secutum esse minime videri vult, ne si sua ipsius proposita forsā nonnullis displicerent, fama illius magni viri ita obscuraretur; et ultimo loco quaedam signa, ob varia commoda nominibus adiecta, explicat.
- p. 200. Mappae vsum et applicationem nunc ostendit Noster, ac primum quidem in facile eligendis remediis, dein in iis apte componendis atque recte praescribendis.

### VIII.

Apparatus medicaminum tam simplicium, quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus. Vol. II. Auctore IO. ANDREA MURRAY. Gottingae. Apud Io. Christ. Dieterich 1779. 8. pagg. 465.

Vtilissimi huius instituti iam tum, cum primum volumen \*) recensuimus, laudata ratione, breuiter quaedam exempli gratia ex hoc altero volumine, quod, vti primum, lubenter atque facile perlegimus et alios quoque ita perlecturos esse speramus, excerpemus. In quo continentur sequentes stirpes:

Rotaceae	Rhoeades
Sepiariae	Putamineae
Bicornes	Siliquosae
Asperifoliae	Papilionaceae
Verticillatae	Lomentaceae
Personatae.	<i>Gentianae</i>

\*) v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 353.



*Gentianae rubrae* radix est praestantissima in- p. 11.  
ter amara, comparari potest cum Quassia, ventri-  
culi et intestinorum debilitati, inertiae bilis sub-  
venit, pituitam tenacem ventriculi soluit, acidum  
primarum viarum frangit cet. Febrifugum inprimis  
ante tempora Corticis Peruviani, antaithriticum,  
anticalculosum cet. fuit. *Centaurii minoris* herbam, p. 18.  
quae *Gentianae* similis est, praefert Noster sum-  
mitatibus, quippe quae fere insipidae sunt.

*Oliuarum fructus*, praeter multos usus hic se- p. 33.  
dulo et vberius narratos, profunt quoque morsui  
serpentum. Sed conciliare diuersa ista de effectu  
huius olei testimonia arduum Noster putat, quo-  
niam plerumque species serpentum non est signi-  
ficata. Iteratis itaque tentaminibus res videtur  
dignissima. Praeterea huc pertinet vulneris pro-  
funditas, pars laesa, irae gradus, copia salivae ira-  
ti animalis cet.

*Vuae ursi* folia, quorum commentationem p. 54.  
Noster \*) scripsit, lithontripticam exferunt vim.  
Aliae huius plantae partes, paucis exemplis exce-  
ptis, vbi baccae maturae in puluerem redactae et  
radix in decocto sunt exhibita, in medicum usum  
non transierunt. Addit praeterea quoque eorum  
praestantiam in oeconomia. *Vitis idaeae* baccae et p. 69.  
folia nondum recepta sunt in officinis, merentur  
vero prae multis aliis. *Baccae* eximie refrigerant,  
sitim sedant, putredinem refraenant et refocillant.  
Adstringit herba potenter, vt et inter co-  
riarias locum habeant. In calculo pellendo \*\*)   
aemulatur

\*) vid. Comm. Nostr. Vol. XV. p. 164.

\*\*) vid. ibid. Vol. XIV. p. 674. Decad. IIdae suppl.  
p. 165. Vol. XVIII. p. 40. vbi de variis vacciniis  
speciebus agitur, quas et Cl. MYRRAX addidit.

- aemulatur vuam vrsi, quid quod praefertur vuæ.  
*Rorismarini sylvestris* herbae utilitas cernitur quo-  
 que in tussi conuulsua, angina strangulatoria LIN-  
 NAEI, vt gargarisma, inque exanthematibus lepro-  
 p. 85. fis, vt decoctum pro lotione \*). *Alcannae verae*  
*s. Orientalis* radici substituitur in officinis radix *an-*  
*chusae tinctoriae*. Adstringendi vim illi adscribunt  
 et coloris rubri grati conciliandi ergo addunt de-  
 p. 91. coctis, tincturis cet. Cineres *tamarisci* sal mira-  
 bile GLAUBERI verum erogant.
- p. 114. *Herba Scordii* calidae est naturae, ventriculi  
 robur restituit, putredinem efficaciter coërcet,  
 obstructions viscerum reseat, sudorem mouet.  
 Et haec quidem experientia saepe repetita docet.
- p. 150. *Mentha piperita* reliquis menthis efficacior est  
 odore forti non ingrante fragrante, saporeque sat  
 p. 153. acri aromatico et camphoraceo \*\*) gaudet. *Pu-*  
*legium* plerumque cum mentha crispa vi conue-  
 nit.
- p. 183. *Linariae* herba et flores. Suspecta planta  
 tam ob affinitatem, quam odorem, dum recens  
 est, virosum, qui Ebulum aemulatur, saporis sub-  
 amari ingrati. Alias igitur anthirrini species, vt  
 Anthirrinum maius, Orontium, spurium, Cymba-  
 laria, quarum passim in libris de materia medica  
 mentio fit, silentio hic praeteriit Noster, quum  
 sibi quaedam dubia de effectuum hisce adscriptorum  
 veritate obuissent. Vnguentum de linaria in  
 haemorrhoidibus coecis et dolentibus externe ap-  
 plicatum praestat.
- p. 197. Gratiolae menstruum optimum est aqua. Prae-  
 cipua vis purgans latet in pulposa substantia et ideo  
 decoctum diu paratum, efficacius Noster censet  
 infuso. Herbam conquassatam externe in arthriti-  
 de

\*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 265.

\*\*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 476.



de et rheumatismo, nec non tumoribus a coagulo tam lacteo, quam sanguineo, vt ecchymosi, praestantissimum resoluendo effectum exserere narravit Cl. TISSOT fratri Nostri ADOLPHO Professori Vpsaliensi. Radicem vix cedere herbae recentiorum exempla monstrant, ex quibus patet, stirpem hanc, resoluendo tenaces humores et materiam peccantem multiplici via, e. gr. ptyalismo, diuresi, euacuando salutarem suam efficaciam exercere.

*Papaveris nigri* semina, capitula, *albi* semina p. 215.  
folia. Ex utroque papauere *opium*. A bono opio p. 223.  
requiritur, vt vniforme, laeue, tenax sit, pondus constituat quoad molem suam leuius, nullas interne sordes prodat, dissectum scintillas salis volatilis oleosi exhibeat, amaritiae, calore ac acrimonia emineat, empyreuma non spiret, candelae admotum mox ardeat, aqua omnino solvatur, solutum rubicundam tincturam praebet. Effe- p. 234.  
ctus opii, vtut multiplices, duplicem tamen opii potentiam spectant, alteram, qua stimulum exercet, alteram, qua sensum obtundit motusque fibrarum pacat. Ob potestatem vires vitales feruendi et augendi ad efficacissima cardiaca refertur opium a Cl. TRALLES \*) aliisque. Transit No- p. 245.  
ster ad varios morbos, quibus auxilium opium affert. In hisce nominatim virtutis eius, somnum inducendi, dolores mitigandi, spasmos delendi et excretiones omnes nimias, praeter sudorem, sistendi ratio est habenda. Latus igitur tam acutorum, quam chronicorum patet campus, in quibus ob horum vitiorum aliquod opii exhibendi necessitas subest. Egregiam rursus, vti solet Cl. MURRAY; hic omnino inuenias collectionem multorum morborum tam acutorum quam chronicorum, quibus opio vsi sunt medici externa et

S 2

interna

\*) v. comm. nostr. Vol. XVIII. p. 670.

interna, et alia atque alia, quae pertinent ad eius historiam et ad varia praeparata. Opium crudum vero iure meritoque hic omnibus praeparatis praefertur a Nostro.

- p. 316. Nobis pariter, vti Cl. MURRAY magis placet syrupus de *eryfino* simplex GEOFFROY ex succo et melle, quam LOBELII aliorumque nimis compositi ac praeparati syrupi.
- p. 319. *Cardamines* flores antispasmodicam vim habent \*).
- p. 341. *Cochleariae hortensis* herba antiscorbutica gaudet virtute. *Bursa pastoris* est superflua.
- p. 355. De anodyna vi atque emolliente *Meliloti*
- p. 385. Noster dubitat, discutientem externam vero largitur. Cantharidum, externe si vt vesicatoria applicantur, dolores mitigat melilotus.
- p. 398. Pulpa *Cassiae* laxat sine torminibus vel exaestuatione, acore suo temperat, sitim refraenat, bilem vitiatam corrigit atque lotium interdum tingit. Perpetua vero haec decoloratio lotii ex cassia dici saltem nequit.
- p. 415. *Terra catechu* f. *Iaponica* potius est extratum, cuius origo et vsus fusius enarrantur. *Campechense* seu *CompeSCANUM* lignum *Sappan* lignum a
- p. 436. quibusdam dicitur. *Senegae* vulgo f. *Senekae* *E-dinb.* radix \*\*) in paucis officinis adhuc venalis existat, etsi maiore iure, quam tot alia remedia, adesset efficax haecce resoluens et per varias excretorias vias aliena euacuans.

*Monitum* tandem communicat hic Noster: „Quum ad cognoscendas stirpes officinales, vt quaslibet alias, iconum fides et elegantia haud exiguum adiumentum afferat: adiciere hic interest

\*) v. comm. nostr. Vol. XX. p. 690.

\*\*) v. comm. nostr. imae decad. Suppl. p. 96. item Vol. XV. p. 516. et Vol. XX. p. 456.



est designationem earum, quae absoluto iam primo libri huius volumine in publicam lucem prodire, vna cum paucis quibusdam, quae et ad praesens volumen pertinent. Ob defectum harum saepe in BLACKWELLIAE opere subsistere antea coactus fui, quae necessitas serius rarior fuit, suppetentibus figuris praestantioribus. IOANNIS MILLERI Illustrationem Systematis sexualis Lond. a. 1777. Fol. max. et REGNAULTI Botanique mise à la Portée de tout le Monde, à Paris, inde ab a. 1774. Fol. max., quorum operum pretium icones praecipue constituunt, per numeros significare non vacat, quum vtrumque per fasciculos absque ordine prodierit. Possessores vero horum facillimo negotio Tabulas in ordinem Systematis Linneani redigere poterunt, quodsi factum fuerit, quaerentes imaginem significatam non alia norma egebunt."

Quae itaque ad primum ac secundum volumen pertinent icones, has simul inuenias.

#### IX.

Via et ratio formulas medicas conscribendi in usum praelectionum Academicarum edidit D. CHRIST. GODOFR. GRVNER Sereniss. Duc. Saxo-Vinariens. et Isenacens. a Consil. Aul. Bot. et Theoret. in Vniuers. Litt. Ienae Prof. Publ. Ord. Facult. Med. Assessor Acad. Caes. nat. Curios. et Mogunt. Scient. vtil. nec non Societ. Acad. Principal. Hass. Sodal. Halae apud Ioannem Iacobum Gebauer. 1778. 8. plagg. 146. praeter praefationem.

**I**ure meritoque vrget Cl. GRVNER, vti ex praefatione

tione intelleximus, simplicitatem in formulis medicis conscribendis et sponte promittit remedii inuentionem, morbi modo cognitione acquisita, quippe quae primum sit in facienda medicina. Hanc simplicitatem sequebatur quoque Cl. Auctor in hoc tractatu, in quo conscribendo ita est versatus, vt sine vilo verborum ornatu scitu necessaria et commoda proponeret, vsus auctoritate ac praeceptis clarissimorum virorum, inprimis Ill. GAVBII, deinde noua, si quae exstabant, adderet, tandem exempla subiiceret, quae apud probatissimos artis nostrae Auctores se reperire meminerat. Quaedam formularum exempla adhibenda duxit Cl. Auctor, non quod probaret, sed vires ingenii excitaret ad perspicendam differentiam, quae inter laudabilem ac malam formulam intercedit. Praeterea scripta huc pertinentia Noster accurate et studiose commemorat.

p. 6. Basis, adiuuans, corrigens atque constituens formulam medicam efficiunt: Quibus explicatis et variis vtilibus cautionibus additis, adiungit Noster pondera atque mensuras, medicamento-  
rum doses et praecepta generalia, quae spectant ac-  
curationem, prudentiam, mixtionem, simplicitatem  
selectum cet. in praescribendis medicis formulis.

p. 25. Viam et rationem nunc persequitur Noster in explicandis formularum praeceptis. Atque Cl. GRVNERO videtur natura rerum imitanda, quae res medicinales duplices esse voluit, aut *solidas* aut *liquidas* ideoque his placita sua accommodat. En tabulam et normam:

## Caput I.

### De

Regulis in confectione medicamentorum solidorum obseruandis.

Se&t.



Se&ct. I. De Pulueribus. Quo pertinent *Aspergo, puluinaria, sacculi, cucupha, frontale, errhinum, dentifricium, scutum stomachicum siccum.*

Se&ct. II. De Bolis.

Se&ct. III. De Electuario, sub quo deprehenduntur *morsuli s. tabulae, rotulae, pastilli s. trochisci.*

Se&ct. IIII. De Pilulis.

Se&ct. V. De Vnguentis, balsamis, linimentis.

Se&ct. VI. De Emplastro et Cerato, quo et *sinapismus et vesicatorium* referuntur.

Se&ct. VII. De Suppositoriis et Pessariis.

## Caput II.

### De

Regulis in confectione medicamentorum fluidorum obseruandis.

Se&ct. I. De succis expressis.

Se&ct. II. De Infusionibus, maxime Emulsionibus.

Se&ct. III. De Decoctionibus s. Apozematis.

Se&ct. IIII. De Potionibus et Misturis.

Se&ct. V. De Lin&ctibus s. Eclegmatis.

Se&ct. VI. De Iniectione s. Enemate. Quo referatur *collutorium, gargarisma, clyisma.*

Se&ct. VII. De Epithemate liquido s. Fomentatione. Huc *balnea, collyrium, apophlegmatismi, stomatica, et cataplasmata* pertinent.

Atque ita his regulis in singula sectione, quas hic repetere nequimus per instituti nostri rationem, traditis, exempla formularum addit, a SCHLEGEL, TISSOT, LUDWIG, KLEIN, WHYTT, MONRO, PRINGLE, STÖRCK, COLLIN et aliis compositarum.

X.

*Neue Sammlung von Versuchen und Abhandlungen  
der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.  
Erster Band. Mit illuminirten Kupfern. Dan-  
zig bey Daniel Ludwig Wedel. 1778.*

i. e.

*Noua tentaminum et tractatum collectio So-  
cietatis physicae Gedanensis. Vol. I.*

**I**ntermissam inde ab anno 1756. seriem actorum  
cum Societas non impedire posset: nunc *nouo-  
rum* actorum nomine in edendis commentariis  
pergere coepit. Praemittitur itaque factorum et  
mutationum, quae Societati contigerunt, relatio,  
atque nomina Sociorum nouorum. Tum ipsi se-  
quuntur tractatus:

p. 1.      1. *Nouae de usu visus observationes*, Auctore  
MICH. CHRIST. HANOV. Physicae et satis subtiles  
sunt disquisitiones caussarum, cur, si trans radios  
calami scriptorii videas, colores iridis appareant;  
observationum, quibus extra focum res mire au-  
geri apparet. Deinde ostendit, oculos res etiam  
minutissimas accurate videre, situ quodam obiecti  
conueniente; et, quibus caussis, res etiam remo-  
tae clare perspiciantur: exempla deinde et obser-  
vationes nonnullorum, qui et in tenebris viderunt,  
refert, et denique oculi artificialis correctionem  
docet.

p. 20.      2. *Disquisitio, quo modo systema mundi in  
venere et Luna appareat*, Auctore GODOFREDO  
REYGER.





esse putat. Haec quoque in omnibus phosphoris  
adsunt. Omittimus reliqua.

P. 174. 8. *Tentamen cum ligno quassiae, institutum*  
a IO. GVIL. JOHN. Quatuor sectionibus Noster  
hanc rem persequitur, quarum prima particulas  
constitutivas quassiae complectitur, altera attinet  
eius effectus in varia salia, tertia spectat eius vim  
putredini resistantem, ubi et cum cortice Peruvia-  
no illud comparatur, et quarta respicit edulco-  
rantem vim quassiae, an et quatenus ei haec possit  
tribui. Multa experimenta hic legi possunt.  
Quod attinet ad partes constituentes quassiam \*),  
ei plus gummosi, quam resinosi Noster adscribit et  
quoniam utrumque aegre purum elicitur per ten-  
tamina, Noster utrumque coniungit et nominat  
gummi resinosum, quo tamen gummi eminet. cet.  
Ad effectus quassiae in varia alia \*\*) monstrandos  
Cl. SCHLEGGERI experimenta repetiit et dis-  
quisiuit Noster. Quassia fibras non ita solidas  
atque firmas reddit, uti cortex Peruvianus, adeo-  
que minus resistit putredini quassia quam cortex.  
Denique quassia serum sanguinis in statu quieto  
quodammodo increstat et condensat, impedit vero  
insimul, quominus fibrae sese coagulent, id quod  
de cortice minus dici potest. Quassiae inest ae-  
que ac cortici vis fermentans a qua edulcoratio  
pendet. Qua occasione de aëre fixo s. gas syl-  
vestr; \*\*\*) disputatur.

P. 200. 9. *Cogitata de terra bituminosa, Auctore*  
CAROLO AVGVSTO THERKORN. De ea in pri-  
mis,

\*) v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 551.

\*\*) v. ib. Vol. XX. p. 322.

\*\*\*) v. ib. Vol. XXII. p. 694.



mis, quæ in Saxoniae variis locis effoditur, bituminosa terra agit: atque primo de facie eiusdem externa et situ, in quo inuenitur, egit, deinde corpora naturalia indicauit, quæ eidem immixta sunt, tum eiusdem partes constitutiuas disquisiuit, et vsum ostendit, denique de origine coniecturas subiunxit.

In venis sed hinc inde cumulativè non pro- p. 201.  
cul a superficie telluris inuenitur hæc terra bituminosa, ideoque ex loco natali difficulter effoditur. Discrimen eiusdem a Turfa et lithanthrace. In ea pyrites, lignumque bituminosum et vitriolum, etiam conchyliæ reperiuntur: quorum singulorum exemplar in tabula aenea depingitur. Partes constitutivæ sunt aqua acida, spiritui vitrioli simile sal, oleum æthereis vaporibus iunctum, sal acidum, et ferri ochra. Adhibetur, loco ligni, ad calefaciendum vario modo; vitriolum exinde coqui potest; oleum et sal medicamentum præbere posset: atque cineres eiusdem fimi loco vtilis sunt.

Acidum vitriolicum calore telluris agere p. 207.  
incipit, atque terram, ligno, quod resinosas partes cum terra communicavit, mixtam penetrat, sicque partes igneæ et terreæ intime iunguntur, sicque oritur terra bituminosa: Quod si per multa secula hæc actio continuaverit, lithanthrax oritur.

10. *Cogitata de mammalium generibus et speciebus, impostèrum detegendis*, a FRID. AVGVST ZORN VON PLOBSHEIM. Nouiter detectis animalibus indicatis, præsertim a Cl. ZIMMERMANNO dissentit: neque a proportionè inter regiones detectarum et incognitas, ad multitudinem animalium nouorum colligi posse, neque multa  
magna

magna animalium genera latere, neque ideo ea  
in posteris temporibus detegi posse arbitratur.

P. 234.      11. *De Electro et Lyncurio veterum*, Auctore  
D. IO. PET. ERN. VON SCHEFFLER. Electrum esse  
demonstrat Calcedonium flauum, eiusque discrimi-  
men a Carniolio flauo subiungit: Lyncurium au-  
tem a falsa lectione nomen habere, esseque les-  
gendum Ligurium lapidem, sicque eum esse To-  
pazium Bohemicum.

P. 247.      12. *Descriptio conchyliorum*, Tab. II. III.  
*depictorum*, Auctore F. A. ZORN VON PLOBSHEIM.  
Maxima ex parte haec conchylia e regione Austr-  
ali aduenerunt, nonnulla tamen sunt Magellanica.  
Icones sunt elegantissimae. Species omnes nouae  
e genere *Turbinis*, *Mytili*, et quidem varietas *My-*  
*tili frondis* LINN., noua species *Mytilorum ven-*  
*tricolorum*, quae intus splendore violaceo, eo-  
quo *Anomia cepa* pollet, superiore, nitet: varietas  
*Trochi scabrici* LINN. *Patella*, vt videtur, *granatina*  
iunior: *Muricis Erinacei* varietas, *Buccinum*, *Vo-*  
*luta Lapponicae* LINN. simile; et aliud eiusdem  
structurae, sed minus.

Has descriptiones, diligenter factas, sequi-  
tur catalogus Conchyliorum, quae Societati a D.  
HUMPHRON missa sunt, nominibus Anglicis, ad-  
dita descriptione succincta. Numerus est 182.

P. 288.      13. EIVSD. *descriptio Ferri natiui*, quod CL.  
PALLAS \*) inuenit, et cuius exemplar, hic Tab.  
IV. depingitur. Eiusmodi icones vero nobis pa-  
rum prodesse videntur, neque enim colore, ne-  
que figura conueniunt ea frustra, quae nos ipsi  
vidimus et possidemus. Color brunus, hic pi-  
ctus

\*) vid. EIVSD. iter Tom. III. p. 417.



Etus, non est ferro proprius, potius a croco martis pendet \*).

14. GODOFREDI REYGER relatio de vitae p. 291.  
gestis PAVLI SWIETLICKI, Pastoris Gedanensis.

15. CHRISTIANI SENDEL *vitae descriptio* p. 297.  
BALTHASARI HAGEMEISTERI, Mercatoris.

16. Elogium IACOBI THEODORI KLEIN, p. 300.  
Auctore EODEM.

# X.

GEORGII PROCHASKA Med. Doct. et Professoris  
Anatomiae in Vniuersitate Vindebonensi  
Extraord. De carne musculari tractatus  
anotomico-physiologicus. Tabulis aeneis  
illustratus. Viennae ap. R. Graeffer. 1778.  
8. pagg. 136. Tab. VI.

Demonstrat Cl. egregii huius libelli Auctor, p. 2.  
vnicuique musculo inter sepimenta data esse  
cellulosa mox maiora, quemadmodum deltoideo,  
quem tanquam musculum ex pluribus constantem  
assumere possemus, mox minora vel exigua, sicuti  
videre est in musculis transfuersim sectis. Sed  
fasciculi hi musculorum intersepimentis circum-  
scripti continent iterum plures alios fasciculos in-  
tersepimentis distinctos, ita, vt demum vltimi  
fasciculi meras contineant musculares fibras.  
Verum enim vero et in minoribus animalibus p. 8.  
musculos inuenit, qui plane nullis dissepimentis  
distinguerentur. Vt fibrarum muscularium natu- p. 25.  
ram

\*) cf. MEYERI experimenta in Berl. Beschaeft. P. II.  
et III.

ram intelligeret, carnis bubulae elixae lacertum  
duas tresue lineas crassum fuit, obtuso aliquo  
instrumento contudit, donec mollis euaderet, et  
postea tela cellulosa sic soluta, in liquore limpidio  
abluta filamenta seu fibrae musculosae apparebant.

**p. 27.** Quae fibrae microscopio obseruatae latae conspici-  
ebantur. Sed an illa latitudo a contusione  
lacerti?

Porro longitudini ipsius musculi aequales  
has fibras in ipso sartorio longissimo omnino mu-  
sculo inuenit, atque irregulariter polyedras neque

**p. 32.** cylindricas, ut *MVYSIVS* habet. Crassities fibra-  
rum muscularium variat partim pro diuersitate  
animalium, ita, ut potissimum in quibusdam pisci-  
bus mira sit varietas, partim pro aetatis diuersita-  
te, quae omnia iconibus egregie declarauit.

**p. 39.** In capite tertio primae sectionis fila carnea,  
ex quibus fibrae musculares componuntur, consi-  
derauit eaque, uti fibras, haud circularia, sed mox  
recta, mox serpentina via progredi vidit, eorumque  
substantiam diaphanam atque crassitiem diuersam

**p. 49.** inuenit. Numerus filorum carneorum pro diuer-  
sitate crassitiei fibrarum differt, neque vltimum  
filum musculare cauum apparet, sed solidum est  
et vix diuidi potest. Quapropter *Cl. Auctor* cum  
*MVYSIO* in filis carneis finem muscularis diuisio-

**p. 51.** nis assumit. In fasciculis fibrarum, fibris muscu-  
laribus et filis minimis deprehenduntur rugae,  
quae mox profundiores, mox altiores, modo pau-  
ciores, modo frequentiores occurrunt, atque a  
cellulosae telae filis, arteriis, venis et nervis, mu-  
sculum percurrentibus efficiuntur. Denique de-  
monstrata vasorum omnis generis neruorumque  
in musculis existentia, de structura musculari cor-  
dis, ventriculi, intestinorum, et vesicae urinariae  
quaedam



quaedam subnectit. Cor habet fibras haud paral-p. 62.  
lolas, sed anastomosantes, atque crassiores, quam  
musculi voluntarii; vesica vrinaria fasciculos  
reticulatos musculares; oesophagi denique inte-  
stinorumque tunica, partim ex longitudinalibus,  
partim orbicularibus componitur.

In altera sectione Cl. Auctor suam de actione p. 68.  
musculari opinionem seu theoriam proponit, qua  
credit, a sanguine inter fila, fibras et fasciculos  
musculorum serpentine moto muscularem abbrevi-  
vari carnem, ab imminuta vero sanguinis copia  
rursum elongari. Indicat, quoque a minima irri-p. 79.  
tatione, ab ira, pudore, sanguinem protinus con-  
geri in vasa, et explicat noua sua theoria adiutus  
phaenomena actionis muscularis, quae HALLE-  
RVS *de partibus corporis humani sentientibus  
et irritabilibus* proponit. Sic demonstrat; cur p. 94.  
musculi in frustra dissecti singula pars vi se contra-  
hendi polleat, ita, vt dicat, in omni frusto adesse  
neruos et vasa humores continentia, variis vaginis  
inclusa, quae irritata facile actionem muscularem  
producere possent. In quarto postea capite of-  
fert quaedam dubia, quae contra suam contractio-  
nis musculorum theoriam moueri possent, eaque  
soluere annititur. Irritatus enim musculus subito p. 97.  
contrahitur, irritata vero alia pars, neque subito  
rubit, neque rursus subito pallescit. Quod ex  
organorum, vasorum minimorum et coloris san-  
guinis diuersitate illustrat. Has duas sectiones  
sequitur tertia, quae continet tabularum explica-  
tionem. Depinguntur enim figuris sexaginta et  
sex in sex tabulis variae carnis muscularis sectio-  
nes, quas Cl. Auctor in variis animalibus instituit,  
atque administravit.

XI.

EIVSDEM de structura neruorum tractatus anatomicus tabulis aeneis illustratus. Vindobonae 1779. 8. pagg. 137. Tab. VII.

**I**n tractatus huius prima sectione omnis aevi Auctores eorumque placita de neruorum structura a Graecis inde ad MARIAM DELLA TORRE, qui in omni cerebri, cerebelli, medullae spinalis et neruorum substantia globulorum congeriem magnitudinis variae assumit, enarrat et prosequitur.

p. 49. Mox autem ipsam neruorum structuram, eorundemque inuolucra considerat Cl. Auctor, qui praeter iam nota inuolucra cellulosa telam neruum ambientem et intersepimenta, quae a pia matre orta medullam neruorum distinguunt eamque duram reddunt, descripsit.

p. 57. Postea neruorum funiculos perscrutatur, atque inuenit *olfactorium neruum* duobus oriri funiculis, *opticum*, mox in plures dirimi tenuiores funiculos, tertium par pluribus, quartum vno ordini funiculo. Quintum par plurimos numerat funiculos, quemadmodum reliqua cerebri paria; cum e contrario omnes spinales nerui, quorum triginta numerauit paria, duplici tantum principio

p. 67. ortum ducant. Postquam igitur demonstrauit, corticalem et medullarem cerebri, itaque quoque neruorum medullasam substantiam ex multis minutissimis fieri globulis, qui cellulosa tela et vasis coërcerentur et sanguinis globulis octies minores essent, vna cum R. DELLA TORRE monet globulos hos in neruorum medulla ordinem aliquem seruare atque in fibras disponi, cum e contrario in cortice et medulla cerebri promiscue ponantur.

In



In sectione tertia tabulae aeri insculptae ex- p. 83.  
plicantur. Tab. I. fig. 3. ff. depingit arbusculum  
cinereum in oliuaribus corporibus, et gg. cine-  
ream in corporibus pyramidalibus posticis sub-  
stantiam. Tab. II. fig. 3. depingit fungositatem  
aliquam substantiae medullofcae neruorum ab am-  
putatione brachii ortam. Praeterea variorum pa-  
rium ex funiculis ortus, varii plexus atque neruo-  
rum interior structura iconibus illustratur.

## XII.

Diff. de nono pare neruorum cerebri. Aucto-  
re IOANNE FRANCISCO WILHELMO BOEHMER.  
Goettingae 1777. 4. c. tab. aen. 2. pl. 8.

**T**ribus haec disputatio absoluitur sectionibus,  
quarum prima Auctores, qui de nono neruo-  
rum cerebri pare scripserunt, indicat, altera ana-  
tomicam eiusdem descriptionem sistit et tertia  
functiones noni paris atque nonnullos morbosos,  
qui ab eo laeso pendent, affectus pertractat. Pri- p. 1.  
mum itaque a GALENO vsque ad SABATIERIVM  
omnium celebrium anatomicorum descriptiones  
commemorat, diiudicat et inter se comparat;  
paulo post vero ad ipsam paris noni descriptionem  
abit.

Refutata ANDERSCHII cerebri neruorum di- p. 21.  
uisione, qua scilicet nono pari decimi paris nomen  
imposuit, descriptoque arteriae vertebralis et ner-  
vi accessorii WILLISII itinere, initium noni paris ex  
anteriori superficie inferioris medullae oblonga-  
tae partis et quidem ex sulco, qui inter corpora  
pyramidalia et oliuaria intermedium est, ex pluri-  
bus filamentis compositum demonstrat. Filamen- p. 29.  
tosae origines, quae quatuor inprimis fasciculos

- formant, ambiunt vertebralem arteriam seque  
mox in duos inprimis ramos vel in vnum saltem  
colligunt, qui per aperturam externam canalis  
condyloidei anterioris egreditur atque in progres-  
su cum furculo nerueo octauo paris atque neruulis  
a ganglio ceruicali superiori nerui intercostalis  
exortis connexus, arcum format et ad musculos
- p. 34. ossis hyoidei abit. Ex arcuata hac nerui via pro-  
venit *ramus descendens*, qui cum alio a ceruicalibus  
descendente arcum efficit atque alios furculos plu-  
res musculis coracohyoideis, sternohyoideis, ster-
- p. 38. nothyreoideis largitur. Denique progressum  
nerui noni ad musculos linguae eiusque apicem  
vsque considerat.
- p. 40. In tertia sectione examinat et pertractat GA-  
LENI, BOERHAAVII et WILLISII de vsu noni  
paris opiniones, et affirmat lingualem hunc ner-  
vum motum tantum spectare, atque in voce re-  
genda, et masticationis ac deglutitionis negotio
- p. 52. multum valere. Explicat porro varia morbosa  
symptomata, connexionem arteriam vertebralem  
inter et nostrum neruum, phreniticorum linguam  
tremulam, ebrietate affectorum loquelam impe-  
ditam vel deficientem, paralyseos linguae prae-
- p. 53. gressum ante apoplexiam et alia. Denique con-  
sensum noni paris cum aliis cerebri paribus  
atque symptomata hinc prouenientia perscru-  
tatur,



XIII.

*Versuch einiger praktischen Anmerkungen über die Nerven, zur Erleuterung verschiedener Krankheiten derselben, vorzüglich hypochondrisch und hysterischer Zufälle, entworfen von D. IACOB FRIDRICH ISENFLAMM. Erlangen bey Wolfgang Walther 1774. 8. 200 Seitt. außer der Vorrede.*

i. e.

Tentamen nonnullarum practicarum annotationum supra nervos ad illustrandos varios morbos, inprimis hypochondriacos et hystericos. Auctore Cl. IACOBO FRIDERICO ISENFLAMM.

**P**ertinet hic lectu dignus liber ad anatomiam practicam et vbique profecto respicit Cl. Auctor in eo ad medicinam clinicam. Quapropter vel prorsus omisit ea, quae inutilem subtilitatem et obscuritatem theoriae de nervis sapiunt, vel breuissime eam theoriam persequitur, quatenus nempe nervi quibusdam morbis sunt expositi. Non immodeste inscripsit Cl. Auctor hunc librum tentamen, quod ipse facile largitur, offerri in eo asserta non omnibus numeris absoluta vel non satis definita vel non clare illustrata et certo probata. Ratio est habenda medico causae efficientis et effectus, atque attendenda irritabilitas corporis humani, a qua pendent ipsorum medicamentorum effectus varii. p. 9.

Ad descriptionem nervorum nunc sese accingit Noster, nec curat hic eorum situm, distributionem coniunctionemque, sed potissimum p. 24.

T 2                      respicit

- respicit ad naturalem seu impeditam neruorum  
**p. 33.** actionem. De fluido nerueo quidem varii varie sentiunt, attamen vtrum sit electricum seu electricitati simile seu cum ea affine, coniunctum et mixtum, an talis electrica materia in corpore humano quodammodo mutata et elaborata, non discernit; saltem arbitratus est Noster, sapientissimum Creatorem elementa (*Grundtheile*) eiusdem materiae in omnia nutritioni et conseruationi corporis humani seruiencia corpora, quid quod in aërem ipsum seu secundum nonnullorum virorum doctorum sententiam in vniuersam naturam distribuisse.
- p. 36.** Primum et secundum par neruorum et molli portio septimi paris seruiunt soli sensui, caeteroquin non est confectum, num nerui sensus et motus simul seu separatim insint corpori. Omni difficultate non esse destitutam hanc rem Noster asserit. Sedes animi esse sensorium commune videtur.
- p. 51.** Viscera habent suum definitum irritabilitatis gradum et eius incrementum humorum affluxum  
**p. 77.** et ita secretiones potest augere. Quemadmodum omnibus febribus quid superuenit, quod cor ad celeriore contractionem stimulat, ita omnibus in morbis neruosis quid apparet, quod naturalem motum fluidi neruei impedit vel mutat. Nihilominus tamen, aucto cordis stimulo, respicit Noster ad fluidum nerueum, quod suos effectus hic coniungit.
- p. 96.** Variis monitis, de retrogredientibus et reprimentibus miasmatibus morbosis eorumque pessimis effectibus, praemissis a Nostro atque exemplis illustratis, duplicem quaestionem seu obiectionem mouit: Qualem habeant haec miasmata singularem rationem, mixtionem et naturam, vt ad hos  
neruos



neruos sese conferant, neque ad alios. Proditne hoc similitudinem seu connexionem cum fluido nerueo ; porro quodnam huius celeris mutationis quoad sedes harum materialium in nervis sit fundamentum, siue cur hae tam subito a nervis externarum partium ad nervos internarum depellantur, cum hae acrimoniae potius, externas partes occupantes, in vicinas externas partes transire deberent. Rheumatici facile sentiunt hanc celerem mutationem et diligenter enarrant, quomodo rheumatismus vagetur et ab externis ad internas partes sese conferat e. gr. ad cor, pulmones, ventriculum cet. et palpitationes cordis, anxietates, nauseam et vomitum efficiat ; cet.

Diuerſis ſymptomatibus, ſi catamenia et haec p. 110.  
morrhoides minus rite fluant, diſquiſitis, quae  
nervos turbant, Noſter quaestionem mouit:  
eſtne medulla ſpinalis continuatio cerebri, at-  
que ita pars cerebri ipſius, ſiue ramus nerui  
magnus ? Reſpicit nempe Noſter hic potius ad  
actionem, quam ad ſubſtantiam medullae. In p. 116.  
conſenſum neruorum inquiri et variis exemplis  
illuſtrat Cl. Auſtor, nec non diuerſitatem ſyſte-  
matum neruoſorum in aliis atque aliis oſtendit.  
Inter exempla idioſyncraſiae notamus hoc: Duo p. 153.  
bus catulis quotannis vena ſecabatur vere, et au-  
tumno, euacuatione aluina inſtituta. Accidit in-  
terea, vt alter, qui ſanguinem videbat et accurate  
attendeſcit, inopinato inciperet trepidare et ocu-  
lis caliginofiſ in lypothymiam cadere, aqua  
adſperſa reſipiſcebat et venaſectio tum intermit-  
tebatur. Quoniam hic caſus Noſtro mirus vide-  
batur, petebat, vt proximo aequinoctio idem ten-  
tamen inſtitueretur, ſed reſuſabatur, et nonnullis  
menſibus poſt moriebatur catulus. Qualis imbe-

- cillitas atque mollities in animali alias rabido?
- p. 170. Exemplum exsiccati nerui optici hic narratur.
- p. 185. Malum hypochondriacum et hystericum iam Noster coniunctim contemplatur, quoniam vtrumque magnam sensibilitatem et irritabilitatem praese fert et magnam alit similitudinem. Malum hoc est cum et sine materie, cuius symptomata singulari sensibilitati, mobilitati, irritabilitati, debilitati, rigiditati laxitatieque adscribantur et
- p. 197. sedes in abdomine. Tensio non cadit in neruum, etiamsi haec neruis interdum tribuitur. Vberius hic inquiri Noster in vocem tensionis in neruis, varie de hac disputat et triplicem modum tensionis huius contemplatur.
- p. 219. Confectum est, actionem neruorum ope substantiae medullosae, et valde probabile ope motae materiae neruosae fieri. A pressione neruorum alii atque alii oriuntur effectus. Senes et teneri infantes malo hypochondriaco et hysterico non adeo facile sunt expositi.
- p. 232. Nullum esse symptoma, hypochondriaco et hysterico malo solenne, quod non deriuari et explicari possit a praeternaturaliter magna vel parua neruorum sensibilitate et aucta vel imminuta irritabilitate viscerum et aliarum musculosarum partium, vno exemplo probat Noster, quod cernitur in vrina spastica eiusmodi aegrorum, plerumque prodromo insultus hypochondriaci s. hysterici.
- p. 238. Quaeritur porro: num ii, qui inter eruptionem dentium et variolarum tentantur conuulsionibus, adultiori aetate, malo hypochondriaco et hysterico eo magis sunt expositi? Incrementum et decrementum, progressus et finis vtriusque mali admodum variat. Quapropter Noster et remedia hic non prorsus reiicit, vti nonnulli solent,



solent medici, sed quaedam offert, diuersis vtriusque huius mali accommodata gradibus. Motus eiusmodi hominum sit diuersus. Attenuantia, resoluentia, roborantia cet. remedia interdum vix sufficiunt ad symptomata hypochondriaca et hysterica compescenda. Necesse igitur erit, vt neruis naturalis gradus sensibilitatis et visceribus idem gradus irritabilitatis concilietur. Hoc fit supprimendo aut excitando neruos. Prius efficiunt narcotica, anodyna et antispasmodica e. gr. opiata crocus, asa foetida, camphora, moschus, castoreum cet., posterus praestant aromata et plantae, quae multum volatilis salis et olei in se continent. Et his remediis competit recte nomen neruos roborantium remedium, quae Noster distinguit a neruinis reliquis remediis et speciem neruinorum appellat. Inter quae horum vtrorumque remedium num phosphorus cum saccharo tritus et in epilepsia non frustra adhibitus, erit referendus? quaeritur a Nostro. Radice poeoniae et visco p. 260. querno similibusque remediis Noster cum fructu vsus est in morbis neruosis. Omnia remedia vniuersalia antihysterica et antihypochondriaca prorsus Noster reiicit.

Quaecunque hic de hypochondriacis et hy. p. 279. stericis morbis eorumque causa proxima a Nostro docte et vtiliter asserta sunt, possunt de omnibus morbis cerebri et neruorum dici et, diuersae proximae causae, hos morbos sistens, habita ratione, ideam, quae de morbis neruosis in genere et in specie nobiscum hic communicatur et de eorum proxima causa, vtilitatem posse afferre arbitratur Noster iis, qui varia remedia et alias atque alias medendi his morbis neruosis methodos pro eorum diuersitate adhibent. Quapropter

etiam reliquos morbos nervosos hic Cl. Auctor omisit.

XIV.

*Des Herrn D. OLOF ACRELL chirurgische Vorfälle in dem Königl. Lazareth und ausserhalb demselben angemerkt. Erster Band. Nach der zweyten mit beträchtlichen Vermehrungen und Kupfern versehenen Ausgabe. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. IO. ANDREAS MURRAY, Göttingen bey Iohann Christian Dietrich 1777. 8. 479 Seitt. praeter dedicationem praemonitionem et praefationem. Zweyter Band ib. eod. 472 Seitt.*

i. e.

Casus chirurgici. Auctore OLOF ACRELL, Vol. I et II.

**N**on solemus quidem versiones indicare, sed autographos ipsos, attamen diligentia huius et assiduitatis studium Cl. MURRAY nostram instituti rationem hic facile mutarunt. Praeterea accedit et augmentum huic versioni Germanicae, quod deest ipsi Suecico libro, tres nempe tractatus in appendice, quorum duo Cl. MURRAY a Cl. Auctore Ipso sunt traditi et unus est ex actis Holmienstibus \*) repetitus. Prima versio Germanica \*\*), secundum primam Suecicam editionem facta non laudatur a Cl. MURRAY et ab aliis et insuper destituta est his novis iisque multis vtilibus additamentis. Nos vero, cum primam huius

\*) v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 353.

\*\*) *Chirurgische Geschichte etc. Lübeck und Leipzig 1777. 8.*



huius lectu dignissimi libri editionem \*) iamiam indicauimus, ea, quae nouiter addita sunt, potissimum curabimus et ex iis quaedam, quantum licet ob breuitatem, qua nobis studendum est, exempli loco repetemus. Nam sunt profecto Lectores ad ipsum librum legendum a nobis incitandi. Seruauit Cl. Auctor eum ordinem, quem loco non multum ante, laudato legimus, nouis autem exemplis ditauit et in Germanica hac versione Cl. MURRAY eam appendice, qua destitutus est Suecicus ipse liber, uti supra monuimus, locupletauit. Gratus itaque offerendus tradendusque est Cl. MURRAY animus pro studio huius Germanicae versionis edendae, ut linguae Suecicae minus gnari fructum utilitatemque sat magnam inde etiam capere queant,

Pars I.

De fungoso et cancroso tumore in et sub p. 36.  
sinistro osse bregmatis. Qui sequebatur, capite ita vehementer impacto, ut aeger lipothymiam pateretur. Resipuit autem non diu post et secure se negotiis suis dicauit. Atque ita annus vnus et dimidius praeterlabebantur sub insolitis capitis doloribus nullaue medicina utebatur aeger. Interea tumor crescebat, qui aegri et adstantium attentionem excitabat. Aeger vrgebat incisionem, medentes eam recusabant. Tandem autem tumor incidebatur et, euocato partim tenui, partim coagulato sanguine, sopore afficiebatur aeger, sensu et motu carens. Post tres dies conuulsionibus obiit, singulari memoria hic vir gaudebat eamque sine vlla mutatione vsque ad mortem seruauit.

Bis emphysemata capitis ex onere capiti im- p. 43.  
posito et ex ictu eius Noster obseruauit. Erat et 46.  
tumor elasticus in parte capillata capitis et frontis

T 5

sine

\*) v. comm. nostr. Imae decad. Supp. p. 656.

sine fluctuatione, qui laxantibus et epithematibus ex aceto, absynthio, mentha crispa, melissa citrata et lauri baccis intra viginti et vnum diem sine crisi disparebat. Noster eiusmodi tumores flatulentos sine vlla laesione capitis deriuat a pressione contextus, qua solida robur suum amittunt et fluida nimis copiose affluunt et dein sese extendunt. Cl. GOOCH \*) hunc casum quidem descripsit, attamen videntur obseruationes eius cum laesione capitis fuisse.

- p. 63. Labium inferius praeternaturaliter magnum Noster feliciter curauit. Dicitur eiusmodi labium *Leopoldinum*, quoniam Imperator Romanus LEOPOLDVS eiusmodi labium habuit, inprimis si ira commotus fuit.
- p. 130. Lentem crySTALLINAM calculosam Noster extraxit coloris flauo fusci, rotundam, grauem, calculo similem nuclei parui cerasi magnitudine. Quae non erat lamellosa, sed granulosa, et habebat cum aliis concretionibus calculosis in corpore humano similitudinem.
- p. 143. De hernia et fistula lacrymali earumque diversitate ob causarum, quas Noster, vti solet, accurate enarrat, varietatem, hic recenset, quae aliam atque aliam sanationem poscit, hic propositam et exemplis illustratam.
- p. 166. Narium sarcomatum feliciter sanatorum duo exempla cum methodo sanandi traduntur.
- p. 172. Ranula est tumor, continens tenacem et limo similem aquam, sedens plerumque sub lingua. Si magnus est hic tumor turbat loquelam. Ob similitudinem cum ranis facta est a nonnullis Auctoribus haec denominatio. Alias possunt eiusmodi tumores aliis quoque oris in locis oriri, vbi ductus saliales et vasa absorbentia sunt. Atque ita ap-  
parent

\*) v. comm. nostr. Illdae decad. Suppl. p. 592.



parent eiusmodi tumores in labiis, genis faucibusque. Quod si enim tenax lymphæ eiusmodi vas obstruit, parietes eius subinde ita extenduntur, ut illud rotunditatem leguminis nanciscatur. Tres casus hic narrantur memoratu et lectu digni.

Exfoliatio singularis maxillæ inferioris totius, prægresso morbo, noma\*) dicto in ambobus genis. Addita quoque est icon. p. 192.

Osteosarcomæ menti, quæ diu duravit et fat magna et longa dependebat facci instar et faciem valde defoedavit, uti ex icone apparet, a Nostro sanata est. p. 195.

Epulis scorbutica, spinosa, cum carie et cancro hic a Nostro commemorantur. p. 199.

Bucca fenestrata feliciter a Nostro sanata est. Simile exemplum nos vidimus, quo ductui Stenoniano in dilatatione ulceris pulchre chirurgus parcebat, etiamsi ille incisioni proximus erat.

De difficilibus vulneribus in faucibus et collo per fractas fistulas tabacarias\*\*) tria exempla cum felici exitu proponuntur. Vnus per annum dimidium fractæ fistulæ tabacariæ partem supra scapulam sine molestia tulit, præter febrem lentam, quam ad hunc casum non pertinere credebatur. Non diu post autem apparebat abscessus, quo aperto, fracta pars extrahebatur et aeger sanitati prorsus restituebatur. p. 239.

Aneurysma verum internæ et sinistræ arteriæ carotidis ita compressione sanatum est, ut post quinque p. 255.

\*) vid. comm. nostr. II dæ decad. indic. tripl. verbum *noma*.

\*\*) Nos simile exemplum nuper vidimus, dilaceratio partium in faucibus autem erat tanta, ut aegro esset moriendum. Plures eiusmodi casus plerumque vero letales leguntur apud Auctores.

quinque usque sex menses arteria suum robur, diametrum atque magnitudinem nacta sit. Sequiebatur hoc aneurysma post pugnam, qua globulus plumbeus per selopetum in anteriorem colli partem inter arteriam asperam et ascendentem ramum sinistrae carotidis immissus fuerat. Mirum profecto huius globuli iter et omnino mirus et rarus casus.

p. 267. Caries claviculae sinistrae cum haemorrhagia

p. 275. magna. Aneurysma spurium cum haemorrhagia.

p. 290. Exempla canceri occulti, ubi exstirpatio in vno bis seqq. est instituta, hic collecta sunt, et Cl. ACREL affirmat, donec internum miasma carcinomaticum alterans et corrigens remedium non inueniatur, operationes externas diiudicandas esse, ut palliativa remedia eaque dubia et minus secura, etiamsi multi Auctores exstirpationem pro vnico et certo remedio habeant.

p. 315. Empyema siue abscessus pleurae cum febre ceterisque omnibus symptomatibus malignis, per tredecim septimanas durans mortemque minans decocto anserinae, cuius duas libras aeger quotidie potabat, ita mutabatur, ut omnia in melius vergerent et aeger triginti et octo annorum pristinae valetudini et robori prorsus restitueretur. Tribuit quidem Cl. Auctor hanc celerem et bonam mutationem non soli huic decocto, quoniam incertum ei videbatur, post aliquot dies tamen, cum eo vteretur aeger, haec ipsa est animaduersa. Apparebat quoque tumor, cuius incisionem debilitas summa et timor aegri et incertus euentus huius operationis, qui potius in acceleranda, quam arcenda morte plerumque cernitur, vetabant.

p. 320. De carie costarum tria exempla cum bono euentu proponuntur.



Letalis lenta febris sequebatur abscessum o- p. 357.  
menti. Aperto cadauere omentum omne erat  
consumtum vsque ad colon et ventriculum ita, vt  
vix vestigia adhaesionis in his partibus restarent.  
Mesenterium erat atro coeruleum et ita emacia-  
tum, vt accurate omento simile esset, si omentum  
scilicet deperditum est et solae membranae super-  
sunt, ita vti obseruauit Noster in ascitibus et in  
aliis phthisibus, a visceribus laesis ortis.

Casum enarrat Noster herniae incarceratae p. 395.  
scrotalis, quae operationis ope reponebatur. Qua  
occasione de vtilitate huius operationis per se non  
adeo periculosa disputat Cl. ACREL, eam ostendit  
et ad nonnullas obiectiones respondet.

Anus inguinalis per duos annos durans feli- p. 400.  
citer sanatus est.

Separationem symphyseos ossium pubis si- p. 439.  
stens exemplum hic Noster enarrat, orta a pure  
in ea regione collecto et corrupto, quod cartila-  
ginosam symphyfin arrosit et sese in musculis ab-  
dominalibus extendit. Incisionibus autem rite  
factis et pure euocato, vndecima septimana est  
haec puerpera prorsus restituta sanitati.

De fistulis ani praemissis exemplis, nonnullas p. 432.  
annotationes addit Noster, harum fistularum causas  
potissimum concernentes. Quarum quatuor No-  
ster recenset, ac *prima* quidem corpora peregrina  
deglutita in intestinum rectum delata et vel infe-  
rius vel superius ibidem morantia, *altera* suppurat-  
iones in viciniis recti, quae illud perforant, *tertia*  
varicem perforantem et *quarta* violentos casus,  
rectum ita irritantes et mutantes, vt in eo tumo-  
res, suppurationes cet. oriri oporteat, sistunt.  
Finiunt has annotationes cautiones de cicatrice  
ita formanda, ne fistulae reuertantur.

- p. 457. Varias hic collegit Cl. Auctor sarcocèles species, ut sarcocèle, cum testiculis sphacelosis, cum  
 p. 470. ruptura recti testiculi cet. Porro mentionem facit exstirpationis omnium partium genitalium, quam vir aliquis ob infaustum amoris commercium ipse ita instituit, ut ne de vita periclitaretur.  
 p. 472. Racosis \*) exemplum hic commemoratur. Erat infausta abbreviatio scroti relaxati. Etiam si haec operatio fere semper habuit infaustum eventum, tamen Noster, cautionibus omnibus adhibitis, eam suadet.  
 p. 475. Sarcocelen comparatiuam hic commemorat. Tumor hic sarcoceli similis, erat in partibus genitalibus virginis nouemdecim annorum, ab initio cerasi magnitudine, quem sine ullo molestiae sensu ferebat. Non diu post hic tumor celerrime crescens e genitalibus propendebat nigro colore et carcinomatico foetore, mali magnitudine.

Ligaturis autem, quas praefert Noster exstirpationi in eiusmodi exemplis, quoniam nec adeo facile nec per saepe maligniores reuertuntur post ligaturas, quam post exstirpationem, hic tumor prorsus abscessit.

- Pars II. Progrediamur ad alteram, partem in qua  
 p. 19. exempla calculorum in vesica urinaria imprimis sexu in potiori, cum aneurysmatibus leguntur. Addit Noster instrumenta lithotomica, quibus usus  
 p. 54. est et quae quidem conueniunt cum PALVCCI \*\*) et LE CAT †) instrumentis, attamen numerum eorum

\*) Seu *proptoma* est partis externae, etiam ante lapsum conspicuae et a palpebris, bulbo oculi, lingua ac gurgulione diuersae procidentiae. v. SAUVAGES nosolog. methodic. Tom. II. Part. I. p. 99.

\*\*) Lithotomie perfectionnée. Vienne 1757 av. fig.

†) Parallele de la taille laterale. Amsterd. 1766.



eorum Noster imminuit, vti ex comparatione, descriptione et iconibus patet.

Calculi vesicae vrinariae in sexu sequiori p. 56. sunt rariores ob maiorem vreteris amplitudinem et breuitatem. Interim tamen recentiores et veteres exempla memoriae tradiderunt et Noster quoque quaedam hic addit. Calculi vesicae et p. 63. renum simul. Tres calculi erant vesicae et vnus renalis quorum icones sunt additae. Singularis p. 69. causa dysuria, quae calculosi quid mentiebatur, erat sacculus quidam ex ipsis vesicae membranis conflatus in vesica, qui et hic in icone spectatur. Phthisin cum calculis in vrethra coniunctam Noster p. 77. obseruauit: Insoliti renales et vesicae calculi, insignis quoque magnitudinis interdum, vt quatuordecim et dimidiam vnciarum, hic in iconibus conspiciuntur. Duplicis vteri descriptio et icon hic traditur. Quod ad superfetationem attinet, laudat Noster in actis Suecicis obseruationes collectas \*).

Fracturarum valde complicatarum hic Noster p. 96. mentionem facit. Oedema serosum manus a p. 139. morfu vespae vulgaris LINN. relictum, optime p. 157. discussum est aqua frigida. Aneurysmata spuria p. 166. a venaesectione compressione tentauit machina ab eo inuenta et hic delineata, quae a Cl. POYTEAV \*\*) detecta machina in eundem usum, est prorsus diuersa. SCHARPIO monitore Noster ex ligatura arteriae p. 187. et nerui simul nullam noxam vidit in laesa arteria brachii.

Sphacelus cruris post febrim synocham p. 288. tridam sponte curatus. Hoc appellari potest amputatio

\*) v. comm. nostr. Vol. XII. p. 60.

\*\*) v. Melanges d. Chirurg. 355. comm. nostr. prim. decad. Suppl. p. 140.

putatio cruris spontanea. Cl. ALIX \*) similem casum enarrat. Idem obseruauit Cl. LUDWIG in aduersariis medico practicis \*\*), quae Lipsiae prodierunt.

p. 343. Fracturae patellae non adeo sunt rarae. Fracturae et diastasis tarsi cum vulnere exempla quatuor Noster hic enarrat, nouam methodum sanandi tradit et icones addit.

p. 304. Varios tumores adiposos, serofos, scorbutico aneurismaticum cet. hic Noster collegit, methodo sanandi per ligaturam cet. addita.

p. 437. Ad appendicem progrediamur. Ac primum quidem lentam cranii depressionem hic enarrat Cl. Auctor cum cephalaea, sopore, hemiplegia appetituque prostrato. Trepanatio nihil praestitit et aeger periit. In cerebro nullum apparebat vitium fixum, ventriculi vero et sinus cerebri infugerant serum, a quo symptomata haec supra nominata repetenda erant.

p. 443. Hydroceles ope caustici secundum Cl. ELSE'S †) methodum, cum optimo successu sanatae sunt.

p. 446. De accidentali apertura arteriae femoralis, quae ligaturas poscebat et sine atrophia partis inferioris feliciter eueniebat. Hunc cum felici exitu non frequenter occurrentem seu saltem, uti Cl. ACREL ratur, non tam crebro in libris diligenter memoratum casum accurate hic Noster, uti in omni omnino hoc libro solitus est, tradidit, quaedam exempla ex aliis Auctoribus collegit et totam hanc rem iconibus illustrauit.

XV.

\*) v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 262.

\*\*) v. ib. Vol. XX. p. 675.

†) Essay on the cure of the tunica vaginalis testis.



XV.

CHRIST. FRIDR. MICHAELIS, Med. Doct. de angina polyposa, seu membranacea. Goettingae, sumtibus viduae Abraham. Vandenhoeck 1778. 8. p. 1309.

**R**ecenset Cl. Auctor ab initio libri, diuersas morbi nostri denominationes, quae etiam in iis terris, vbi maxime grassatur, vsu receptae, et a variis Auctoribus sunt adhibitae. Dein ad scriptores de morbo hocce transgreditur, et TVLPIVM primum fuisse, qui ipsum descripserit, contendit. Descriptio morbi haec excipit; est vero p. 10. ab initio febris catarrhali non absimilis, cui mox orthopnoea, sonus inter respirandum peculiaris pipatui pullorum gallinaceorum similis, vomitiones, imo etiam materiae tenacissimae vomitus, artuumque tumores iunguntur. Deglutitio, in tanta respirandi difficultate, quae suffocationem nunquam non minitatur, rarissime laeditur. Vrina sedimento albo distinguitur, et pulsus, qui, cum inciperet morbus, erat celer, fortis, in celerem, debilem, mollem, imo intermittentem mutatur. Materies caseosa multa, imo tubuli membranacei, tussiendo, non sine summo aegrotantium leuamine, saepius eiciuntur. Quibus quidem eiectionis, mortis nondum omnis euauit timor, cum haud raro morbifica ista materies regenerari soleat. Paucissimis vt plurimum strangulare solet diebus morbus noster. Externus corporis, hoc morbo defuncti, habitus, suffocati formae prorsus respondet; ex interni vero inspectione, asperae arteriae inflammatio, corpusque membranaceum, variae longitudinis, atque crassitiei, internam arteriae illius faciem tegens, scrutatorum prome-

Tom. XXIII. Pars II. V ruit

ruit attentionem. Consistentia istius adeo inconstans est reperta, ut in aliis discindi ob tenacitatem aegre posset, in aliis non sine rupturae metu e sede sua extrahi pateretur. Color ipsius vulgo conspicitur albus, qui tamen haud raro rubicundis vel gryseis punctis striisque distinguitur. Organicae structurae honos, ipsi vix concedendus videtur; cum asperae arteriae vero tunica villosa, tunc demum iungitur, si materies purulenta, quae intercedere vulgo solet, deest. Aqua in arteria detegenda haud dubie ab suffocatoria morte profecta videtur. Abdominis inspectio, quam fere omnes neglexerunt, vel frustra susceperunt, Nostro hepatis ex badio nigricans, intestinumque colon ac rectum coarctatum obtulit.

p. 23. Iam naturam corporis huius membranacei indagans, probare annititur polyposae indoli maxime reperiri analogum. Quod vero quo luculentius appareat, in naturam polyporum asperae arteriae inquit; dicit ergo eos esse inorganicos, ex humore quodam inspissato, qui Ipsi, varias ob rationes, lymphaticus esse videtur, ortos, in quo cum cordis vel sanguiferorum vasorum polypis conueniant. Disquirat iam ulterius causas polyporum bronchialium, vel ab effuso sanguine vel ab metastasi lymphatica ortorum. Probat vero concretiones tubulosas anginae huius, ex eadem constare cum polypis modo nominatis materia, eodem reperiri in loco, eademque insigniri figura; ex quibus, non immerito polypis annumerandas esse censet. Neque defectus crustae pleuriticae in sanguine sectione educto, cum omnis lymphaticus humor in polypum hunc iam fuerit formatus, neque crassior polyporum, harumque concretionum caua fabrica, multum obesse, Auctoris videntur sententiae.



CKII \*) vero sententiam, polypum huncce esse membranam arteriae asperae villosam, inflammata, separata, humore multo dilatata, partim cadauerum inspectione, partim aliis iisque grauissimis argumentis refutauit. MYRRAYI \*\*) vero opinioni, ex muco indurato oriri, opposuit, 1) phaenomenum illud rarissime euenire, cum tamen saepius oriretur, si ad mucum in membranas mutandum, nil nisi aëris requireretur aditus, 2) mucum in crustas lemasque fragiles potius, quam in membranas tenaces, exsiccari, 3) has ipsas mucosas crustas in aqua tepida pristinam recuperare naturam, quod in nostris secus se habeat, 4) humiditatem arteriae asperae, exsiccationem muci impedire. Neque lymphae in mucum huiusque in membranam metamorphoses, quas HOMIUS †) proposuit, ob diuersam vtriusque fluidi indolem Nostro satisfaciunt. Triplex vero explicandi ratio, a CALLISENO ††) proposita, vel ex muco catarrhali densato, vel ex crusta aphthosa, vel denique ex muco purulento in viscerum inflammationibus transsudante, mali originem arcessens, Nostro non probatur, partim ob iam dictas rationes, partim propter morbi aphthosi, anginaeque polyposae differentiam. Mucus denique purulentus CALLISENI, verbo solum a lymphâ coagulabili differre Nostro videtur.

Tertia libri sectio annotationes quasdam generales circa morbi huius naturam complectitur.

V 2

Disse-

\*) De angina infantum in patria recentioribus annis obseruata, Praef. SAM. AVRIVILLO. Vpsal. 1764.

\*\*) Nov. Comm. Soc. Gotting. Tom. IV. p. 55.

†) An Inquiry in to the Croup, by FRANCIS HOME. Edinb. 1765. vid. comm. nostr. Vol. XV. p. 334. porro ib. Vol. XXI. p. 645.

††) Actor. Hafnienfium Vol. I.

Differuit hic de locis, in quibus morbus est observatus, casusque istius simul fecit mentionem, de quo olim ad Lectores retulimus nostros<sup>\*)</sup>. Contagiosis morbis, ad quos ab ROSENIO<sup>\*\*)</sup> relatus est, neque hereditariis malis cum BVCHAN †) annumerandus videtur. Referendus autem est morbus non ad infantiles solum, neque ad eos, quibus semel affligi homines solent, neque tandem recentiori demum tempore ortis, etsi ob arduam diagnosin a veteribus vix descriptus reperitur, erit adsociandus. Est vero natura morbi generis inflammatorii, quae ex febre concomitante, dolore circa tracheam, antiphlogisticorum vtilitate, atque ex euidente inflammationis praesentia in cadaveribus reperta patefieri videtur. Procul vero Cl. Auctor abest ab ea quorundam virorum sententia, qui spasticis symptomatibus prorsus carere morbum hunc perhibent, quorum praesentiam, primo ex analogia cum affectibus ab illapsis asperae arteriae corporibus ortis, deinde vero ex tussi, vomitu, voce stridula, dyspnoea inter ipsum morbi augmentum remittente, morte subitanea, emeticisque antispasmodice operantibus, euincere studet. Apathia vero laryngis, in cuius causa indaganda multum occupati fuerunt, Nostro prorsus abesse videtur, plus nempe affici dicit tracheam a corpore hocce leui pededentim nato, pulpaque molli obducto, quam ab similibus, quae irritare alias soleant, corpusculis humanae machinae partes. Refutata CVLLENII ††) definitione Ipse Cl. Auctor quandam substituit, dicit nempe esse *anginam membranaceam*,

<sup>\*)</sup> v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 185.

<sup>\*\*)</sup> v. comm. nostr. 1mae decad. Suppl. p. 96.

†) Domestic. medicine, v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 580.

††) Nosologia methodica p. 160. vid. comm. nostr. Vol. XX. p. 716.



naceam, catarrhalem fistulae aëreae inflammationem, cum metastasi, materiei ad partem affectam lymphaticae, quae nisi vel praematura mors, vel remedia tempestive adhibita, impediunt, in polyposum concretum abeat. Diuisa est angina haec in eam, quae hominibus est propria, atque in eam, qua boues cruciari compertum est. Respectu vero densitatis materiae morbificae in completam atque incompletam est distributa; sicut in simplicem compositamque ob morbos hancee comitantes. Refutantur iam isti, qui pro mero gangrenosae anginae symptomate morbum nostrum habuerunt, inter quos BALDINGERVM \*) esse intelleximus. Diuiditur vulgo in stadium inflammationis suppurationisque, quorum posterius a Cl. Auctore prorsus negatur, cum pulsus mollities viriumque debilitas, ab impedita sanguinis per pulmones via oriatur, album vrinae sedimentum lymphae metastatice ad renes ductae debeat originem, cum mucus porro diu retentus puri, quod obseruasse quidam putarunt, non abssimilis videatur, cumque signa suppurationis incipientis prorsus desint. Ipsa tunicarum sanitas, quae a pure certe tolleretur, membrana polyposa excreta, non statim redire posset. Neque tamen desunt exempla hominum, saepius hoc morbo affectorum, phthistica tandem morte pereuntium.

In quarto segmine, de diagnosi morbi loquitur. Est vero pathognomonicum morbi huius p. 107  
signum adhuc nullum detectum, neque vox stridula, quae a variis pro eo habebatur, hoc nomine est honoranda, quippe quae in morbo nostro aliquando deesse, imo etiam in aliis obseruari  
V 3 solet

\*) *Magazin vor Aerzte* 10 St. p. 926.

solet \*). Ex plurium itaque signorum collectione certa demum formari poterit diagnosi. Enarravit postea eos morbos, quibuscum plurimum conuenientiae alit, inter quos angina gangraenosa eminet. Differt vero haec a morbo nostro signis putredinis, ut insigni oris foetore, lingua sordibus biliosis tecta, vomitu aluique deiectionibus pessime olentibus, faucium carnosino colore, ulceribus, maculisque gryseis os interne crusta obducentibus, deliriis, dolore totius colli, voce rauca, doloribusque post tubulos gangraenosos excretos auctis. Iisdem quoque doloribus, quos ultimo nominauimus, ab angina scarlatinae, aphthisque dignosci facile potest. Ab asthma conuulsuo, a quo gradu solo differe ab vno alteroque immerito creditur \*\*), symptomatibus spasticis in asthma grauioribus, orthopnoea molestiori, vrina tenui, pulsuque discrepat paruo. His ipsis spasmii praesentis symptomatibus, ab catarrho suffocatiuo ET TMÜLLERI †) discernitur. Qui tussi conuulsua aegrotant spasticis symptomatibus, tussique grauiore, certis periodis redeuntibus torquentur, doloris tracheae sunt expertes, anodynisque sanantur. Cynanche trachealis voce non stridente tracheaeque doloribus vehementioribus dignoscitur. Anginae serosae proprii sunt faucium tumores, vocis stridulae defectus, atque dyspnoeae incrementum non remittens. Angina neruosa spasticis symptomatibus grauioribus stipatur. In affectu catarrhali communi vox nunquam mutatur, neque

\*) vid. HOME l. c. et ELLER de cognoscendis et curandis morbis p. 176.

\*\*) a dissertation of the spasmodic Asthma of Children by MILLAR. vid. comm. nostr. secund. decad. Suppl. p. 695.

†) Operum tomo II. pag. 480.



neque tanta excitatur spiritum ducendi molestia. Angina pectoris, ut plurimum senilibus corporibus infesta, acuto sub sterno dolore dignoscitur. Corpora tracheae per exteriorem vim illapsa, fortio-rem excitant dolorem, neque fixo loco inhaerentem. Signa, quibus a peripneumonicis distinguitur affectibus, a vocis stridulae defectu, doloreque tracheae pressione incremente, petenda. A polypis bronchialibus angina nostra aegre distinguitur, atque in causa occasionali forsan unicum erit dignoscendi auxilium, vix unquam enim haemoptoen morbum nostrum sequi dicitur. Sub finem vero huius sectionis in indagandis istis observationibus, quae immerito ad anginam hanc fuerunt relatae, est occupatus.

Causarum prognoseosque scrutinio quinta p. 172. sectio est dicata. Disponunt vero quaevis ad hunc morbum, quae pulmonem debilitant, irritant, adeoque humorum in hoc viscus decubitus efficiunt. Pertinent ad horum censum morbi praegressi pulmonibus infesti, e quibus asthma, morbillos, catarrhalesque affectus pertinaciores commemoravit, dum humida soli aërisque constitutio, infantilisque aetas. Refrigerium, pedum praepriis, unica occasionalis Nostro videtur causa. Est vero angina ista infantibus periculosior, quam adultis; neque intermissionibus morbi spontaneis multum spei est tribuendum. Prognosis infaus- tam suadent respiratio difficillima, pulsus mollis celerque, facies rubra turgens, inquietudo summa, vox perpetuo acutissime stridula, frustulorumque membranaceorum eiectio. Urina alba turbida- que, quae variis resorpti puris vel membranae iam formatae videbatur testimonium, Nostro, quippe ab lymphâ abundante metastatice ad renes

delata oriatur, critica potius videtur. Neque vox stridula, quae ab rimae glottidis coarctatione spastica Cl. Auctori orta videtur, pro certo membranae polyposae iam progenitae signo ab Ipso habetur, cum a lymphæ fluida adhuc produci saepius posse videatur. Orthopnoea vero pro vnico habetur signo, ex cuius praesentia ad membranam formatam colligi possit, etsi ex huius signi defectu, ad membranae ipsius defectum, colligere non audeat.

p. 191. Transimus ad sextam sectionem medendi methodum proponentem. Primum vero remedium, cuius mentionem factam esse videmus, est venaesectio, quae etsi utilitatis contra morbum plurimum afferre solet, tamen cum virium robori saepius instituta non satis prospiciat, duodecim circiter hirudinum collo applicatorum, vel scarificationis usum magis commendandum esse ratur. Alui libertas deriuatioque a superioribus ad inferiores partes, purgantibus antiphlogisticis; materiaeque peccantis eliminatio primis diebus, anodyno-diaphoreticorum remedium, ad quae pediluua tepida pertinent, applicatione conciliatur. Sanguine sectione hirudinibusque extracto, vesicatorium eximiae utilitatis est repertum. Applicandum vero illud Cl. Auctori videtur anteriori colli regioni, quo asperae arteriae proxime adiaceat, et ad stranguriam praecauendam opii particulam addi suadet \*). Loco vesicantis ex cantharidibus, linimentum ex oleo oliuarum et spiritu salis ammoniaci confectum applicari posse affirmat. Ex remediis emollientibus; quorum sorbitionem varii ad inflammationem

\*) R. FORSTEN disp. de cantharidibus Lugd. Bat. 1776. 4. p. 78. v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 676.



mationem asperae arteriae sistendam laudarunt, aquam frigidam, quae nimirum et adstringendo et materiam lymphaticam repellendo agat, antecellere putat. Membrana vero polyposa iamiam formata, ab his prorsus abstinendum erit, et alia, quae iam sumus commemoraturi, tentanda.

Relata sunt ad auxilia medelae huius stadii, primum expectorantia, vt aceti, olei, piperisque vapores, quae vero Nostro ob irritationem, quam producunt, atque virium suarum debilitatem, crassitiei membranae formatae non respondentem, minus probantur. Dein emetica, quorum quidem usum experientiae auctoritate confirmat. Non prius vero adhibenda sunt vomitoria, quam si sanguinis copia remediis antea dictis fuerit imminuta, ne pulmonum augeatur inflammatio. Neque tamen diu expectandum est, donec exhibeantur remedia ista, ne membrana nimis indurescat difficilisque emesi euocari possit. Profunt vero non solum ad membranam e larynge efferendam, verum quoque ad copiosum ventriculi mucum respirationem saepius turbantem euacuandum, atque ad spasmos, anodyna sua facultate compescendos. Emeticis vero, ob nimiam neruorum irritationem, vel ob membranae iusto tenaciorem naturam, frustra propinatis, fomentationes externae emollientes, vesicatoria, opium, ipsaque tracheae discissio substituenda videntur. Refutatis itaque iis, quae varii proposuerunt aduersus hanc operationem dubitationibus, Cl. Auctor probauit, bronchotomiam in hoc casu omni carere periculo. Neque enim asperae arteriae vulnera absolute letalia sunt comperta, neque is glandularum thymicae thyroidaeque situs vt ipsas violare prorsus necessarium sit, neque longitudinalis tracheae incisio, qua ad extrahendam membranam egemus, eae quae ad

orbem finditur, difficilius sanari potest, neque ea membranae contingere videtur crassities, quae incisionem penetrare non valeat, neque tandem fama medici, si sub operatione periturus forsan esset aegrotus, Nostro multum periclitari videtur. Quo facto vnicam in tracheotomia salutis spem positam esse euincere tentauit, argumentis breuiter recensendis. Poterit vero facili negotio non solum educi membrana, cum accreta nulla sui parte cernatur, atque cum Cl. FAVIER \*) experimentis constet, corpora praeter naturam tracheae inhaerentia, aperturae in canalem aëreum factae afferri atque ab natura eiici; verum quoque si vel maxime non eiiciatur, respiratio certe huius operationis auxilio ita emendabitur, remediorumque expectorantium vsus ita adhiberi potest, vt non possit non medicamentis adhibitis membrana diu resistere. Putat vero per aperturam istam tracheae vapores resoluentes optimo cum successu posse admitti. Instituenda autem videtur Nostro in secundi stadii initio, vbi emetica frustra propinata fuerunt, neque, vt quibusdam visum est, ad suffocationis momentum est differenda. Peripneumoniciis affectibus venaesectio medetur. Spasticis symptomatibus vero clysteres anodini, balnea tepida atque emetica anodinis suis virtutibus succurrunt. Prophylaxis ex causarum antea dictarum scrutinio facile formatur. Anginae chronicae huius generis, rarius quidem occurrenti, inque phthisin degeneranti, resoluentia, deriuantia roborantiaque aptissime sunt opponenda. Ex prioribus efficacissimum Ipsi aqua calcis ex testis concharum parata, cum saponis solutione, vel decocto demulcente copulata, videtur. Deriuandi causa  
fetacea

\*) vid. Memoires de l'Academie de Chirurgie de Paris.  
Tom. V.



setacea costis spuriiis applicata, atque ad robur conciliandum corticem Peruuianum vel ferrum commendauit.

Adiunxit operi historias huius morbi a se p. 253. aliisque obseruati, obseruationumque meteorologicarum fasciculum. Plurimae harum historiarum ex libris olim editis a Cl. Auctore sunt petitaе, quaedam tamen nondum descriptae prostant, pertinet ad eorum censum omnium prima, in qua morbus in sorore sua est obseruatus, atque epidemiae Werthheimensis a Cl. SAVER cum Nostro communicata descriptio. Has ideo silentio praetereundas esse censuimus, quod singula mali symptomata iam olim exhibuimus. Tempestas vero tempore harum epidemiarum pluuiosa, frigida ingrataque saepius est reperta, sicuti meteorologicae, quas adiunxit, nos docuerunt obseruationes.

## XVI.

*Abhandlung über die Brustbräune, von CHRISTOPH FRIEDRICH ELSNER. Erster Versuch. Königsberg bey Iohann Iacob Kanter 1778. 8. 84 Seiten.*

i. e.

Tractatus de angina pectoris. Auctore CHRISTOPH. FRIDERICO ELSNER.

**P**rimum de hoc morbo scripsit Cl. HEBERDEN\*) p. 2. vti Noster in hoc primo suo tentamine lectu digno monet, et praemittit cadauerum eodem morbo demortuorum sectiones, ex aliorum medicorum scriptis\*\*) petitas et inter se comparatas.

Quae

\*) vid. Comm. Nostr. Vol. XIX. p. 200.

\*\*) *Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte, 3ter Band p. 182. 198. et 720.*

Quae autem, vti Nostro videtur, causam huius noui morbi proximam non decent. Namque ossificationes cartilaginum, costarum et partium in viciniis cordis positarum, adipis collectio in thorace seu eius hydrops non in omnibus his cadaueribus adfuerunt, quae BONETVS, MORGAGNI alique iam quoque annotarunt et obseruarunt, ideoque causam proximam huius anginae non sistunt.

p. 19. Quae cum ita sint, Noster duo exempla attentione digna ad historiam huius anginae illustrandam hic tradit, quae magnam convenientiam habere videbantur cum hac angina. Ex satis accurata atque diligenti autem horum exemplorum relatione a Nostro hic data, luculenter apparet, causam omnium symptomatum eorumque sat multorum esse arthriticam atque ita causam anginae pectoris. Vnum nempe exemplum anginae pectoris spectabat arthritidem retrogressam et alte-

p. 59. rum arthritidem interne latentem. Confirmat nunc suam sententiam obseruationibus aliorum, HOFFMANNI, STRACKII cet.

p. 66. Omnino hanc anginae historiam imperfectam et incompletam Noster iudicat et requirit accuratiores et diligentiores de ea obseruationes, quam haecenus factae sunt.

p. 79. Ossificationes cartilaginum et valuularum cordis cet. Noster, vt arthritidis sequelas, considerat et exemplis arthriticorum topthorum illustrat. Adipis collectionem in pectore, quam obseruarunt Cl. Auctores, pariter ab arthritica causa repetit. Nam eiusmodi homines, sint affecti regulari seu irregulari arthritide, procliues sunt ad adipis collectionem. Quodsi porro haec materia arthritica secundum nonnullorum sententiam ex ea parte succi nutritii constat, qui ad nutriendum consumi et ad conseruandas solidas partes apponi nequit;



quit, seu largitur saltem, vti posse concedi Noster arbitratur, in paroxysmis arthriticis eiusmodi album lacti simile humidum moueri et ad partes dolentes deferri; facile intelligi potest, quo modo ex hoc humido, donec circulo sanguinis intersit, succo nutritio vero, et modo per stagnationem in articulis naturam suam mutante, adiposae collectiones in pectore oriri queant. Quando nempe arthritica materia ad internas sese conuertat pectoris partes et, doloribus excitatis, quasi stimulo, albam lacti similem materiam allicit ad eas.

Rebus itaque sic sese habentibus, haec angina p. 83. pectoris non est nouus morbus, sed symptoma anomalae arthritidis, asthma arthriticum habet SAVVAGES \*). Methodus medendi cernitur in eo, vt irregularis arthritidis remediis ei congruis fugetur, seu, si natura vult eam in regularem mutare, vt hoc naturae conamen sustentetur. *Prius* efficiunt roborantia et simul resoluentia gummata, vt gummi guaiaci, haederae cet. amara aromaticaque; in primis hic laudatur *liquor mineralis martialis*, qui constat ex liquore minerali HOFFMANNI et limatura martis. Cum iis remediis vel coniungenda sunt antispasmodica balneaque. *Posteriorius* praestant externe irritantia remedia, quorum Noster et electricitatem refert, interne exaestuantia remedia, vt moschus, camphora, liquor cornu cerui succinatus, cet. sunt exhibenda ad febrem excitandam.

## XVII.

\*) vid. Nosolog. methodic. Tom. II. P. II. p. 175. Edit. 8.

XVII.

Commentatio de usu vesicantium in febribus acutis, et speciatim in sananda pleuritide accuratius determinando. Auctore B. L. TRALLES. Vratislaviae sumtu I. C. Meyeri, 1778. 8. mai. plagg. 18. cum praef. et dedicat.

**P**roposuit sibi Illustris Auctor eadem methodo, qua in diiudicandis opii viribus, et in determinandis indicationibus iis, quibus illae respondent, cum omnium fere medicorum plausu est versatus, plurium medicamentorum, eorumque praesertim heroicorum accuratius examen suscipere, eaque, quae ad certiore et securiorem eorum spectent applicationem, solidis principiis superstruere, ut, quae ex tanta opinionum circa quorundam remediorum usum farragine veritati accedant, et quae ab illa sint remotae, exinde appareat. Qua de re, ut aliquam sui propositi absolueret partem, hunc librum curavit edendum, in quo eorum praesertim vesicantium remediorum, quorum basin cantharides constituunt, usum accurate, et, ita exposuit, ut neque experientiae, neque rationi fuerit aduersatus, sed iis solis institerit argumentis, quae recto utriusque huius veritatis cognoscendae praesidii nituntur usu. Et fatendum omnino est, eam viam, qua Illustris Auctor in absoluendo suo opere est progressus, non posse non ad inveniendas veras remediorum vires longe esse aptissimam, quippe qua, quae naturae medicatrici, et quae medicamentis, diaetaeque regi-  
mini debeamus, luculentissime pateant. Est autem Ill. TRALLES in percurrento suo tramite ea versatus ratione, ut, praemissa usus cantharidum



in medicina historia, in principium horum animalium actuum, modumque agendi inquirat, atque internum, externumque eorum in variis morbis usum consideret. Progreditur deinde ad acutas febres, et veram pleuritidem, suasque addit rationes, ob quas locum vesicantibus in his morbis sanandis aegerrime esse concedendum existimat.

In illustranda medici cantharidum usus anti- p. 6.  
quitate nonnullos veterum medicorum locos No-  
ster laudat, eosque testari, censet, veteres his ani-  
malibus interne assumtis aduersus varios morbos,  
externe vero applicatis quam rarissime fuisse usos,  
donec HIERONYMVS MERCVRIALIS, SENNER-  
TVS, HERCVLES SAXONIA, RIVERIVS, alique  
hanc eorum adhibendorum methodum suaferint,  
et aduersus secus sentientes defenderint. Etsi au-  
tem non multum roboris sententiae de canthari-  
dum usus antiquitate locos illos, quos Ill. Auctor  
nominat, afferre fatendum est, quippe cum vero  
propior nobis videatur opinio eorum, qui veteres  
Graeciae medicos aliam Meloës speciem in usum  
vocasse contendunt \*), tamen, cum neutra harum  
opinionum sit, vt nobis videtur, ab omni dubitatio-  
ne prorsus libera, nolumus in diiudicanda TRAL-  
LESII sententia esse prolixi, sed ad difficiliora, et  
disquisitione multo digniora progrediamur mo-  
menta. Atque huc quidem spectat illa disputa- p. 12.  
tio, qua, quale sit principium cantharidum cau-  
sticum, et qua ratione in nostrum corpus, vias-  
que praesertim vrinarias agat, definire student  
naturae

\*) Confer. R. FORSTEN disquisitio medica canthari-  
dum naturalem, chemicam et medicam historiam  
exhibens, vid. comm. nostr. Vol. XXII. p. 676.

naturae scrutatores. Absolutam tamen respon-  
sionem proferre ad vtramque quaestionem Noster  
non audet, sed eorum modo cogitatorum, quae  
nuperi medici super hac re fouerunt, aliquam ex-

p. 25. hibet recensionem, Ipsique prae ceteris WILLI-  
SII ad explicandam cantharidum in secernentes  
lotii partes actionem sententiam probari dicit,  
cum Hofmanniana ad eam clariorem reddendam  
vix quicquam conferat.

p. 26. Relicta autem hac disputatione, ad ipsum  
cantharidum vsum exponendum Noster accedit,  
eorumque miratur audaciam, qui, etsi tot nociuae  
horum animalium vis prostant testimonia, eaque  
ideo a multis inter venena fuerunt relata, inter-  
num tamen eorum vsum laudibus extollunt sum-  
mis; et negandum omnino non est nobisque ipsis  
constat, ab imprudentibus medicis cantharidibus,  
aliisque generosis medicamentis pestiferas in hu-  
mano corpore mutationes fuisse haud raro produ-  
ctas, eaque propter caute et circumspecte iisdem est  
vtendum; omnem autem eorum internum vsum  
nulla ratione prohibendum alii iudicarunt. Exi-  
gua enim dosis in rebellibus quibusdam morbis,  
in quibus ex summorum medicorum auctoritate  
anceps remedium nullo praestat, salutaribus effe-  
ctibus producendis haud raro par fuit. Qua de  
re, si WERLHOFIO\*), aliisque expertissimis medi-  
cis fides est habenda, in hydrophobiae sanatione  
cantharidum internus externusque vsus magni  
p. 30. est faciendus. Quod vero ad ischuriam  
a spastica constrictione, aut inflammatione par-  
tium vrinae secretioni inferuentium ortam, ad  
calculi,

\*) conf. R. A. VOGELS *ausgesuchte kleine akademische  
Schriften, pathologischen, praktischen und chirurgi-  
schen Inhalts, herausgegeben von S. G. VOGEL,  
Lemgo 1778. 8.*



calculi, podagrae et gonorrhoeae sanationem, venereique stimuli excitationem spectat, parum omnino abest, quin Ill. Auctori assentiamur; etenim rationes, quas huius rei demonstrandae causa profert, ad persuadendum admodum sunt idoneae. De hydrope autem euiectum est, pertinacissimum p. 36. hoc morborum genus exigua cantharidum dosi saepenumero fuisse sanatum; neque verendum facile esse arbitramur; ne musculares, atque nervosae hydropicorum fibrae ab hac medicina multum irritentur, aut gangraenosae reddantur, quippe cum humorum stagnantium, partiumque solidarum omni robore destitutarum insignem in corpore reperiatur copiam. Relinquamus autem internum cantharidum usum, et cum nostro Auctore ad eos effectus contemplandos, quos sub emplastrorum forma adhibita haec insecta in corpore producant, nos accingamus.

Ac primum quidem eas expendit Ill. Auctor mutationes, quas cum vniuersa humorum massa, tum illa pars, cui applicati cantharides fuerunt, experiuntur. Constitit autem repetitis BAGLIVII, p. 51. WILLISII, aliorumque observationibus, putridam p. 54. haec insecta corpori inducere dispositionem, ne p. 59. que sanguinis coagulum, quae VERATTI erat opinio, ab iisdem esse extimescendum. Irritant praeterea totum neruorum systema, corpus concutiunt, humorum motum reddunt celeriores, febrisque ortum summopere adiuuant, cutaneum autem habitum, quem attigerunt, inflammant, serumque ex eo proliciunt. Quae cum ita sint, non poterit non facile esse intellectu, sanandis febribus vesicantia nulla ratione conuenire, quippe a quibus potius omnium symptomatum exacerbatio sit expectanda. Patet vero simul ex eorum ef p. 61. fectuum p. 62.

fectuum consideratione, quibus producendis apta atque idonea sunt haec animalia, vsum eorum externum in morbis ex languore, motusque imbecillitate ortis, in quibus sit sanguinis circulatio reddenda celerior, et vis vitae debilis ad iuuantdam coctionem accommodanda, effectus sequi longe saluberrimos. Praeterea in serosae et pituitosae materiei collectione, qua phlegmatici temperamenti homines afficiuntur; in morbis, in quibus cuiusdam corporis partis irritatio procreanda, humorumque ad alias regiones affluxus est auertendus; in topico dolore, qui aliis auxiliis obstitit; in prorsus sufflaminato nerui cuiusdam motu, et in frigidis, humidisque regionibus vesicantia nunquam non concedenda sunt; etenim ita haud raro omnis absolvitur curatio.

Sunt vero ex his ipsis vesicatoriorum indicantibus facile eruendae eae conditiones, quibus impedimur, quo minus haec medicamina adhibeamus; quam ob rem, etsi Ill. Auctor eas studiose annotavit, repetendis tamen iisdem non immorabimur, sed ad febrium acutarum considerationem  
**p. 69.** pergamus. Atque harum quidem naturam et causas si rimamur, inquit Noster, haud facile in stimulantibus remediis medelam reperire poterimus; etenim ex BOERHAAVII et SWIETENII assertis patet, iisdem vim producendae atque augendae febris potius, quam imminuendae esse adscribendam. Quapropter imitanda non est ea quorundam medicorum ratio, qua, etsi repetitae observationes huius asserti veritatem satis euincunt, externum tamen cantharidum vsum in febrilibus quibusdam morbis vehementer commendant, aliisque sanioribus medendi methodis praeferunt. Cum enim animaduertissent medici, in peste, febribusque malignis vesicantia quandoque profuif-  
se



se, ea in benignioribus malis aequè fructuosa fore putarunt. Pertinent autem ad hanc classẽ HER- p. 73.  
CVLES SAXONIA, BOHNIVS, VERATTVS, FREIN-  
DIVS, aliiq̃ue, quorum placita Noster recenset,  
iisque vim persuadendi inesse omnino nullam de-  
monstrat.

Et FREINDIVS quidem in ea versabatur opi- p. 75.  
nionẽ, vt, præter venaesectionem, nullum in fe- p. 82.  
bribus euacuationi promouendae aptius esse reme-  
dium, quam vesicantia, statueret, eaque in acutis,  
et speciatim in variolis, morbillis, febre scarlatina  
et erysipelacea, licet sanguis ardentius aestuet,  
haud tamen infeliciter adhiberi crederet. Iam  
autem, cum quotidiana experientia huic opinioni  
omnino contraria sit, Freindianam medendi me-  
thodum cum Ill. TRALLESIO prorsus reprobare  
cogimur, auctoremq̃ue eius neque diuersarum  
acutae febris periodorum, neque temperamenti  
aegrotorum vllam habuisse rationem censemus,  
cum, vt ex additis ab Ill. TRALLESIO locis pa-  
tet, nullas addiderit conditiones, quibus vesican-  
tium vsum aut restringeret, aut prorsus cohiberet.

Excipit FREINDII de vesicantium vlu sen- p. 92.  
tentiam ea, quam Cl. CLOSSIVS super hac ipsa re  
fouit, et in suo *de noua variolis medendi methodo*  
*tractatu* \*) cum erudito orbe communicauit. Hic  
enim, sua nifus experientia, BOERHAAVIO, TIS-  
SORO, ipsiq̃ue TRALLESIO contrariatur, febrifi-  
camq̃ue cantharidum vim non prorsus quidem  
negandam, neque tamen necessariam semper at-  
que perpetuam esse contendit. Respondet au-  
tem Ill. TRALLES, cantharides omnibus viuenti-  
bus neruis stimulum inferre, eosq̃ue partium, qui-  
bus sub emplastri forma fuerunt applicati, rubo-  
rem,

X 2

\*) Prodiit Traiecti ad Rhenum, 1766. vid. comm.  
nostr. Vol. XV. p. 647.

rem, ipsamque inflammationem procreare, quam pro diuersa subiectorum indole mox citius, mox ferius haec eueniant, ipsique effectus eius interdum euidentiores, interdum remissiores sint.

p. 100. Quapropter dissuadendam prorsus hanc febrium acutarum curandarum rationem arbitratur; etenim longe frequentius accidere potest, vt vesicatoriorum vsus synocham febrem in putridam, et inflammatoriam in gangraenosam diathesin mutet, quam vt sanationem earum adiuuet.

Accedit Ill. Auctor ad aliorum medicorum de vesicantium in febribus vsu sententias. Et MERCVRIALIS quidem, ETTMÜLLERVS, PROSPER ALPINVS, MORTONVS, LANCI-SIVS, HOFFMANNVS, alique celeberrimi medici applicationem huius remedii admodum restrinxerunt; symptomatum enim febrilium, quibus leniendis studendum est, exacerbationem illud haud raro procreasse, aegrosque in summum periculum

p. 106. coniecisse perhibent. Medium autem inter hos et FREINDIVM atque CLOSSIVM locum Ill. PRINGLIVS tenuit, qui vesicanti remedio in curanda febre non omnem denegauerit vim. In altero enim febrium inflammatarum periodo, in qua pulsus nimis debilis animaduertitur, a cantharidibus externe applicatis multum auxilii esse expectandum perhibuit. Est autem, vt nostro Auctori videtur, ipse PRINGLIVS hanc regulam semper et vbique non secutus, cum in angina, dysenteria, hepatitide, ileo, phrenitide et pleuritide vesicantia sine omni discrimine laudauerit. Haud tamen ex adductis a Nostro locis apparet, PRINGLIVM absque omni restrictione externum cantharidum vsum in huiusmodi febribus commendasse; etenim in omni inflammatoria febre naturae vires saepenumero nimis sunt debiles, ea-  
que



que propter, siue fauces occupauerit inflammatio, siue ea in quodam infimi ventris viscere saeuierit, et simul coctionem peccantis materiei prohibuerit, haud absolum putamus, vesicantia in hac ipsa periodo inter indicata cum Ill. PRINGLIO referre, cum innumera experimenta saluberrimum eorum vsum docuerint.

Non soli autem acutae feberi, verum etiam p. 111. vehementibus quibusdam symptomatibus, vt anxietati, deliriis, conuulsioni et aliis haec medicamina conuenire Cl. CLOSSIVS putat; dicit enim, post vesicantium applicationem ea nunquam ingruere, aut, quando iam adfuerint, iisdem admotis breui fugari. Cum vero haec symptomata a viscido inflammatorio, minutissima vasa obstruente dependeant, et ab humorum motu aucto incrementum valde atque augeantur, non possunt extrallesi mente vesicantia conducere; qua de p. 125. re cum TISSOTO ad contraindicata ea refert, et sinapismis potius locum relinquit, quippe quorum vim in ea parte, cui imponuntur, subsistere, neque ad augendum sanguinis motum quicquam contribuere censet.

Accedimus ad febrium malignarum epidemiarum considerationem, et ad vesicantium aduersus eas virtutem. Et RIVERIVS quidem in p. 133. maximo malignitatis gradu quinque diuersis corporis locis haec emplastra adhibuit, eaque prauis et venenatis ichoribus attrahendis admodum idonea fuisse tradidit. Sunt deinde hanc medendirationem MEADIVS, PRINGLIUS, STOERKIVS, alique summi viri secuti, eamque fere cunctis reliquis praestare asseruerunt. Veruntamen, si BAGLIVIO fidendum est, ii, qui cantharidibus vim extrahendi febrium malignarum veneni adscribunt,

- vehementer falluntur; omnem enim eorum usum, nisi vis vitae debilis augenda, aut reuulsio iuuanda sit, esse prorsus superuacaneum expertus est. Ceterum practicae observationes nostrum quoque Auctorem docuerunt, vesicantium usum in fugandis febribus malignis raro esse necessarium. Quod autem ad HAENII et Cl. AEPLI de huius medicaminis in putridis febribus usu opiniones attinet, fatendum est, eos nimium iisdem fauisse, atque salutarem euentum, qui aliis medicamentis debetur, vesicantibus adscripsisse. Iudicat itaque Ill. TRALLES, ambiguis vesicantibus vale dicendum, sinapismis autem in his febribus vtendum esse, qui et securiores sint, et symptomatibus leniendis admodum apti.

- P. 174. His de vesicantium in malignis febribus usu praemissis, ad pleuritidem Ill. Auctor progreditur, eumque inter Anglos primum inualuisse morem dicit, quo dolenti lateri hoc morbo affectorum amplum vesicatorium imponeretur. Quanquam autem diffitendum non est, pleuritidem veram ad grauissimos morbos pertinere, ipsique eapropter generosis remediis esse occurrendum, fuerunt tamen omni tempore eruditissimi medici, qui, vesicantibus prorsus neglectis, pleuritide laborantes egregie restituerent. Et nemini profecto incognitae sunt BAGLIVII, SYDENHAMI, BOERHAAVII, SWIETENII, HOFFMANNI, TRILLERI, HVXHAMMI et SALVAGESII huic morbo medendi rationes, quae quanto sunt ad infringendum sanguinis impetum accommodatiores, tanto maiori cum fiducia a medicis adhiberi solent. Qua de re tantum omnino abest, vt morem eorum, qui vesicantibus pleuritidis curationem absolui optime posse contendunt, imitandum censeamus, vt eum potius  
haud



haud raro maiores noxas attulisse, cum Ill. TRALLE-  
 LESIO sinus persuasi; etenim veram morbi cau-  
 sem auget, atque ad celeriores motum sangui-  
 nem instigat. Recte eapropter BOHNIVS et WE- P. 189.  
 DELIVS partibus dolentibus, si subsit inflamma-  
 tio, vesicantia haud esse applicanda statuerunt,  
 etsi ceteroquin multum ipsis tribuerent. Quan-  
 quam autem ea symptomata, quae pleuritidem  
 concomitantur, satis docent, vesicantia remedia,  
 siue dolenti loco, siue cruribus, aut brachiis ap-  
 plicentur, non posse non morbum peiorem red-  
 dere, ipsumque aegrotum in vitae discrimen con-  
 iicere, multi tamen doctissimi medici ea vehe-  
 menter laudarunt. AC MAYERNIVS quidem puta- P. 197.  
 bat, acre serum, in quo inesset membranam velli-  
 cans quoddam sal, vesicantibus extrahi e corpore  
 debere, hacque ratione pleuritidis causam tolli;  
 at vero, cum ab optimo sanguine, omnis pungen-  
 tis salis experte, vera pleurae inflammatio nasci  
 possit, patet, feri profluuium ad sanandum mor-  
 bum parum conferre, eiusque vehementiam hoc  
 modo non mitigari.

MEADIVS autem, qui magna pollet inter P. 201.  
 eruditos medicos auctoritate, ea utebatur in sa-  
 nanda pleuritide methodo, ut externe vesicantia  
 admoueret, interne vero salia volatilia assumenda  
 curaret, quibus peccantem materiem foras extra-  
 xisse, laterisque dolorem sedasse, perhibet. Iam  
 vero, cum feri extractione neque dolentis loci re-  
 laxatio perfici, neque humorum circuitus immi-  
 nuui, et obstructio tolli possit, assentiendum omni-  
 no Ill. TRALLELIO esse opinamur, qui antiphlo-  
 gisticam methodum indicationi medici egregie  
 respondere, expertus est.

Superfunt ex medicorum vesicantibus in P. 203.  
 pleuritide fauentium classe Ill. PRINGLIUS et Cl.

**CLOSSIVS**, qui venaesectiōem praecipuum quidem indicatum esse, cantharidibus tamen simul dolenti lateri admotis effectus eius admodum augeri, et curationem breuiorem reddi contendunt. Sunt vero vesicantis remedii virtutes a venaesectiōis effectibus adeo remotae, vt **ILL. TRALLES** non dubitet, eodem turbari prorsus, atque auerti salutares huius euentus; etenim calorem reddunt maiorem, febrem augment, ipsumque dolorem

**p. 221.** exasperant. Qua de re, vt appareat, quam male vesicantia in hoc morbo adhibeantur, nonnullas morborum historias, quas **BAGLIVIVS**, **WHYTIVS**, aliique medici consignarunt, **ILL.** Auctor recenset, eaque addit obseruata, quae ipsi circa huius remedii in acutis vsum obuenerunt, atque ex iis colligit, Sydenhamianam methodum, qua in sananda pleuritide nunquam non summo cum fructu vsum est, omni stimulantī medicina longe esse praeferendam.

Quanquam autem tam acriter contra vesicantia **ILL.** Auctor disputauit, vt locum iis derelinquendum esse prorsus nullum videatur, tamen in 45 §. fatetur, non omnem in curanda pleuritide

**p. 227.** iisdem denegandam esse vim. Enumerat proinde conditiones quasdam, quae summe necessarium eorum vsum reddere ipsi sunt visae; namque si largae et repetitae institutae fuerint sanguinis e vena missiones; si praecipua antipleuritica auxilium attulerint nullum; si pulsus non durus; sed mollis et paruus; si totius corporis calor moderatus; si vrina non rubra, sed straminea et pallida apparuerit, neque tamen remiserit dolor, tum ad vesicantia confugiendum esse, ipse Auctor suadet. Haec enim phaenomena, ait, testantur, lenti quid intercostalibus spatiis interesse, quod, cum carneas et nerueas fibras irritet, doloremque superstitem



stitem producat, hac ratione e corpore sit expellendum.

Accedit tandem Ill. TRALLES ad considerationem quorundam topicorum, quae substitui apte vesicatoris in pleuritide posse, et ad propinandum securiora esse putat. Et primum quidem sinapismorum lateri affecto admotorum mentionem iniicit, quorum effectus PRINGLIUS et ROSENSTEIN magnopere deprædicant; deinde saponis veneti usum expendit, eumque salutares effectus in pleuritide proferre posse putat, fatetur tamen, se nunquam hæc medicamenta adhibuisse, sed antiphlogistica methodo suos aegros ut plurimum restituisse. In spirandi autem et excreandi sputi difficultate, vrgentissimo interdum apud pleuriticos symptomate, vesicantibus brachiis vel tibiis admotis omnino utendum est, quippe quae, aliis remediis simul adhibitis, lenimen afferunt certissimum. p. 236. p. 251.

## XIX.

Anatomia vteri humani grauidi tabulis illustrata, Auctore GVILIELMO HVNTER, Serenissimæ Reginae CHARLOTTAE medico extraordinario, in Academia Regali anatomiae Professore et Societatum Regiae et antiquariae Socio. Birminghamiae excudebat Ioannes Baskerville MDCCLXXIV. Londini prostant apud S. Baker, T. Cadell, D. Wilson, G. Nicol et I. Murray, fol. reg.

The anatomy of the human gravid uterus exhibited in figures by WILLIAM HVNTER Professor of Anatomy &c. Printed at Bir-

mingham by Iohn Baskerville 1774. Sold in London by S. Baker and G. Leigh in York-Street, T. Cadell in the Strand. D. Wilfon and G. Nicol, opposite York Buildings and I. Murray in Fleet-Street. fol. reg. c. tab. fig. aen. 34.

**N**on nuper celeberrimus **HUNTERVS** hoc splendidissimum de vtero humano opus, quod hic ad finem perductum tradimus, incepit. Continet triginta et quatuor tabulas aeneas, natura, arte, magnitudine et pulchritudine integras, quae subinde prodierunt. Nam, vti in praefatione ab Ill. Auctore narratur, iam ab anno 1751. cadauera grauidarum diuersa dissecuit et iniectiones anatomicas instituit, auxiliante fratre Nostri **IOANNE**, cuius assiduitatis studium magnopere laudatur in hoc opere conficiendo. Ex artificibus tabularum harum curam habentes potissimum nominatur peritissimus **ROBERTVS STRANGE**. Tabulae aeneae suauiter sistunt membranam deciduam **HUNTERI** eius vasa cet., corpus luteum egregie iconibus est ostensum, vesicula vmbilicalis connexa est cum funiculo cet. Rebus sic se habentibus satis luculenter apparet, Ill. **HUNTERVM** neque operae, neque impensarum, neque temporis rationem habuisse.

Nos vero constituimus summam saltem tabularum ita cum Lectoribus communicare, vti Ill. **HUNTERVS** singuli tabulae eam addidit.

*Tab. I. Decem priores tabulae mulierem exhibent, nono fere grauiditatis mense exeunte, subita morte extinctam. Arteriae a venis, cera diuersicoloris iniectae, distinctae erant, in hac prima, contenta abdominis,*



*abdominis, integumentis decussatim incisis et reflexis, sub conspectum veniunt. Resupinatum est ita, ac cliui situ cadauer, ut superior trunci pars haud paulo esset elatior, et viscera inde abdominalia clarius contemplanda obiicerentur.*

*Tab. II. Conspectus viscerum abdominalium a latere dextro, partibus continentibus Thoracis et Hypochondrii, ac maxima omenti parte, sublati.*

*Tab. III. Viscera eadem abdominalia a sinistro latere, una cum diaphragmate iis supertenso. Facile apparet in delinianda hac figura, coniectum oculi fuisse a parte lateris superiori oblique deorsum, uterus quippe protuberans femur dextrum visui intercludebat.*

*Tab. IV. Uterus, et contenta Pelvis a parte anteriori; ossa pubis, cum integumentis, et superiori pudendorum parte, omnino fuerant abscissa, quo cervix uteri, et vesica simul urinaria ei praetensa in visum incurrerent.*

*Tab. V. Uteri pars anterior et dextra, cauta manu ab adhaerentibus secundinis separata, et in sinistrum latus reflexa. Id eo factum est consilio, ut pars membranae deciduae ac Placentae, cum vasis earundem cera repletis, et superficies uteri, cui adhaeserant, interna oculis exponerentur. Partes lineis designatas proxime sequens tabula sistit integras.*

*Tab. VI. Foetus in utero, prout a natura positus, rescissis omnino parte uteri anteriori, ac Placenta, ei adhaerente.*

*Tab. VII. Sublato foetu, paries uteri conspicitur intimus et posticus, membranis suis adhuc vestitus. Partes lineis adumbratae praecedenti tabula se ad plenum dedere.*

*Tab. VIII. Partes immediate post inpraegnatum uterum sitae; utero ipso sede sua amoto, et in  
pudenda*

*prudenda deuoluto. Ossa pubis, et prius fuerant abscissa. Confer Tab. IV.*

*Tab. IX. Trunco a vertice per mediam spinam diuiso, haec figura repraesentat peluim, eiusque contenta, situ suo naturali, cum aliqua et femoris dextri et lumborum parte. Quod hic deficit circa pubem, ad delineandas praecedentes tabulas, mancama et mutilam, abunde supplebit Tabula 22da.*

*Tab. X. Fig. I. Uteri pars anterior et externa, prout se praebuit omnino siccata, exhibens faciem vasorum uterinorum, qualem prae se ferunt eo loci, ubi Placenta utero adhaeret. Fig. II. Facies interna Placentae, cuius vasa per funiculum umbilicalem cera sunt repleta. Fig. III. Ab alia muliere biduo post partum extincta, exhibet partem superficiei intimae uteri.*

*Tab. XI. Ab alia muliere, nono grauiditatis mense, haemorrhagia uterina e medio sublata. Conspicitur uterus, et ossa pubis iuxta naturam sita. Vasa injecta cera turgida, quaeque ad partem inferiorem et ceruicem uteri dignoscuntur esse amplissima, arguunt Placentam parti illi adhaesisse.*

*Tab. XII. Ab eadem, qua praecedens, muliere; exhibet apertum plane a parte postica uterum cum vagina, quo situs Foetus, parsque inferior Placentae sub Foetus capite indicarentur. Placenta scilicet orificio uteri interno accreuerat; eoque sub finem grauiditatis dilatato, fatali inde diuisione separata est.*

*Tab. XIII. A tertio cadauere, nono grauiditatis mense. Aperto Utero, Vagina et Vesica urinaria integris incisis scilicet, una cum anteriori Uteri pariete, secundinis, ei adhaerentibus, et in fundum Uteri reclinatis, situs Foetus, qui hic erectus est, conspicitur. Vasa uteri cera erant repleta.*

*Tab.*



*Tab. XIV. A quarto cadauere, nono itidem grauiditatis mense. Fasciculi fibrarum muscularium, in parte interna uteri, triplici figura exhibentur.*

*Tab. XV. A quinto cadauere, nono etiam Gestationis mense. Systema arteriosum Uteri quintuplici figura expressum. Fig. I. Facies Uteri inuersi, quo praesertim loco Placenta adhaeserat. Fig. II. Arteriae partem Uteri anteriorem perreptantes. Fig. III. Eaedem per partem posticam distributae. Fig. IV. Eaedem Fundum permeantes. Fig. V. Corpus Luteum in Ouario per medium diuiso, et Fimbriae Tubae Fallopianae.*

*Tab. XVI. A sexto cadauere, octauo mense. Uterus a latere dextro visus, atque ita iniecta cera praeparatus, et scalpello anatomico denudatus, ut vasorum ad eum accessus, eorumque primae ramificationes quam clarissime appareant.*

*Tab. XVII. Idem Uterus a fronte. Primo siue extimo substantiae strato sublato, vasorum ampliorum distributio, eorumque versus Placentam, quae hic parti anteriori et fundo Uteri adhaerebat, progressus melius conspiciuntur.*

*Tab. XVIII. Eiusdem Uteri Fundus, eodem modo praeparatus, ut amplissimorum vasorum, Venarum praesertim Placentae ex aduerso obiectarum, frequentes inter se commissurae contemplandae prostant.*

*Tab. XIX. Idem Uterus, eius facie anteriori incisa et in Fundum reuoluta illaesis secundinis, per quas caput Foetus, obscurius licet, videtur. Hic igitur visui sese offert cum superficies externa Placentae sed dimidiatae, tum pars superficiei internae Uteri, ei respondens, una cum vasis, quae inter Uterum et Placentam intereedunt. Partes Uteri exteriores solis linearum ductibus expressae sunt.*

*Tab.*

*Tab. XX. Idem denuo Vterus, sed omnino apertus, ut Foetum in situ naturali ostendat. Circa Fundum quaquaversus substantia, tam Placentae, quam Vteri. incisa conspicitur.*

*Tab. XXI. A septimo cadauere, septimo graviditatis mense. Aperto cruciformi incisione Vtero, et reclinatis rite cornubus, per membranas Foetum continentes Foetus ipse aquis innatans conspicitur. Reliquae partes nudis lineis distinctae sunt.*

*Tab. XXII. Idem cadauer. Contenta Pelvis, quo situ disposita sunt, ex duplici patet figura: In illa elaborationi, dextro Vaginae latere dissectio et deuoluto, os Vteri in conspectum prodit.*

*Tab. XXIII. Octauum cadauer, sexto Gestationis mense. Vteri ac membranarum parte anteriori sublata, exhibetur Foetus cum parte Placentae et Funiculi umbilicalis. Vteri Vasa cera impleta erant.*

*Tab. XXIV. Ab eodem cadauere. Fig. I. Placenta Fundo et posticae Vteri parti adhaerescens; substantia eius spongiosa iniecta per vasa uterina cera turgescit. Fig. II. Portio aliqua Placentae transfuersim secta, ut substantiae eius spongiosa appareret, eiusdemque cera adimpletae crassities. Fig. III. Sistit arterias. Fig. IV. Venas illius partis membranae Deciduae, quae parietem Vteri anteriorem inuestiuerat.*

*Tab. XXV. Nouum cadauer, quinto mense. Apertus omnino Vterus, ac Foetus inde exemptus, quo subtilius iudicium feratur de Foetu ipso; de partibus eius secum inuicem comparatis et dimensis; nec non de conditione Ceruicis Vterinae, quae sub hoc tempus obtinet.*

*Tab. XXVI. Decimum cadauer, quinto graviditatis mense. Exhibetur status Vteri retrouersi. Fig. I. Apertum decussata incisione. Abdomen, sed contractiori*



tradiori forma exhibitum, cum *Vesica urinaria* praeter morem distenta. *Fig. II.* *Vesica urinaria*, forma pariter minutiori, per mediam diuisa et ad imam partem aperta, ut situs *Oris uterini* hic praeter naturam sursum spectantis appareat. *Fig. III.* Contenta *Pelvis* omnia a parte postica. *Fig. IV.* *Vteri* portione ac *Deciduae* parte sublatis, *Foetus* per pellucas membranas, *Chorion* nempe et *Amnion*, conspicitur.

*Tab. XXVII.* *Vndecimum* cadauer, mense quinto ineunte. *Fig. I.* *Vterus* cum appendicibus suis a tergo viso; *Vagina* secundum longitudinem incisa, *Cervicis* et *Oris uterini* status apparet. *Fig. II.* *Vtero* omnino aperto, membrana *Decidua Reflexa*, *Chorion* inuestiens, cernitur, cum *Foetu* translucente, et *Cervicis* *Orisque uterini* facies interna.

*Tab. XXVIII.* *Fig. I.* Idem *Vterus*, quem exhibet figura secunda *Tabulae* praecedentis, sed inversus (i. e. fundo decliuiori) ut contentis suo pondere a *Cervice* Fundum versus deuolutis, margo *Placentae* clarius distinguatur, ac *Decidua*, quae ibidem ab interno *Vteri* pariete in externam *chorii* superficiem reflexa, nomen *Decidua Reflexae* assumit, melius conspiciatur. *Fig. II.* Facies eiusdem *Vteri* interna, prout auulsa *Placenta* se exhibuit *Linea* illa irregularis asperam et inaequalem superficiem circumscribens, extremos indicat *Placentae* limites, ubi *Decidua* ab *Vtero* circumquaque in *Chorion* fuerat reflexa.

*Tab. XXIX.* *Quinque* figuras exhibet, quarum tres priores ex eodem sunt cadauere. *Fig. I.* *Ouum* utero exemptum. *Fig. II.* *Pars Deciduae* vitro adhibito amplificata. *Fig. III.* *Ovarium* cum *Corpore luteo*. *Fig. IV.* *Portio* membranarum nono mense. *Fig. V.* *Pars Vteri* et *Placentae* cum membranis.

*Tab.*

*Tab. XXX. A duodecimo cadauere, quarto mense decurrente: Uterus a parte antica apertus, vasis cera repletis. Praecipue hic notanda occurrunt, superficies Placentae externa; Vasa in Placentam ex Utero se immergentia: Ceruicis Uteri externa Facies, qualis sit, et, respectu ad Vesicam urinariam, Vrethramque habito, quem situm obtineat.*

*Tab. XXXI. Tres figurae ab eodem cadauere. Fig. I. Uterus a parte postica ita apertus, ut Facies membranae Deciduae externa, ac status Ceruicis uterinae visui exponantur. Fig. II. Parte postica Uteri, membranaeque Deciduae sublata, Foetus ipse per pellucas membranas apparet. Fig. III. Quarium apertum Corporis lutei cauum ostendit.*

*Tab. XXXII. Duae a decimo tertio cadauere Figurae, tertio mense elapso. Fig. I. Uterus a parte anteriori patefactus, Foetum cum Ceruice uterina contemplandum obiicit. Fig. II. Idem Uterus secundum longitudinem, cum Placenta et membranis, diuisus; adiacente etiam Foetu, ac per funiculum umbilicalem adiuncto.*

*Tab. XXXIII. Oua tria abortu perdit, sex figuris expressa. Fig. I. Conceptus nouem circiter hebdomadarum, ex parte, quae tota membranacea est oculis obiecta. Fig. II. Eiusdem sectio secundum longitudinem. Fig. III. Conceptus alter post octo fere hebdomadas. Fig. IV. Idem Conceptus ad examen paulo curiosius reuocatus. Fig. V. Chorion nudum, i. e. ab ambiente Decidua expeditum. Fig. VI. Idem Conceptus apertus.*

*Tab. XXXIV. Fig. I. Conceptus, quinta circiter hebdomade, nempe Chorion cum omnibus suis contentis. Fig. II. Idem Conceptus, conspicio amplius, Chorion parte anteriori excissa, et Amnio Embryonem continente in latus reflexo. Fig. III. Conceptus integer, quartae circiter hebdomadis.*

*Fig.*



*Fig. V. Conceptus integer, circa tertiam hebdomadam. Fig. VI. Idem parte anteriori sublata. Fig. VII. VIII. IX. Figurae quaedam fictae Uteri in grauidis, secundum longitudinem dissecti, ut eius diversus, in primis grauiditatis hebdomadis, status, qualis mihi videbatur, innotesceret.*

XIX.

Hortus Romanus iuxta systema Tournefortianum paulo strictius distributus; a GEORGIO BONELLI *Moregalensi in subalpinis*, Publico Medicinae Professore: specierum nomina suppeditante, praestantiorum, quas ipse selegit, adumbrationem dirigente LIBERATO SABBATI *Maeuanienfi in Umbria*, Chirurg. Prof. et horti custode; adiectis unicuique volumini rariorum plantarum tabulis C. aeri incis. Tom. I. Romae 1772. sunt. Bouchard et Grauiet fol.

Veniam nos a Lectoribus impetraturos esse confidimus, quod libri huius, splendidissimi sane, non prius fecerimus mentionem; si ipsis, librum hunc in manus nostras serius peruenisse, dixerimus. Proposuerunt sibi Editores, singulorum plantarum, quae in horto Romano aluntur, viuis coloribus depictas tradere formas, easque ad TOURNEFORTII methodum disponere. Etsi vero hoc Cl. virorum consilium, incremento botanices plurimum commodi videatur promittere: tamen fatendum nobis est, hos labores votis nostris non prorsus reperiri consentaneos. Neque enim omnes, quae Romae vegetant, plantae pingi merentur, cum plures illarum iam alibi fucatas cernere liceat, hac ipsa enim re pretium libri

praeter necessitatem nimiumque augetur, eademque de causa in botanicorum usum magis efficitur ineptum. Neque ita nobis videntur depictae plantae, ut formae naturali prorsus conveniant, vel ut partes omnes satis accurate discerni queant. Negari tamen non debet in multis plantis habitum externum, et eas partes, quae Tournefortiano systemati inseruiunt, ita delineatas esse, ut cognitioni generaliori sufficiant, arti tamen vel curiosiori disquisitioni non respondeant. Color enim a pictore electus non solum naturae legibus saepius repugnat, verum quoque incurie in partibus maxime essentialibus exprimendis sunt versati, quod potissimum de genitalibus, de pedunculis, atque pube partium valere videtur. Tournefortianum tandem systema, etsi nobis magnopere placet, Linneano tamen propterea non anteponendum videtur, quod hoc magis cognitum, magisque sit breue atque perspicuum. Nomina enim, quibus utitur LINNEVS, multum omnino videntur conferre ad herbarum acquirendam cognitionem. Studuit quidem Cl. BONELLI Tournefortiani systematis prae reliquis omnibus praestantiam in praefamine libri demonstrare; argumenta tamen quibus usus est, neque noua, neque graua esse videntur.

Ex horti Romani historia notamus, hortum  
 p. i. hunc pro antiquissimo ab Auctore haberi, cum primam eius foundationem ab NICOLAO V. anno 1450. factam esse probabile sit. Primus, horti curam gessisse MERCATVS fertur; a scriptoribus tamen celebratur primus, huius horti administrator PII IV. temporibus IACOBVS BONVS FERRARIENSIS. Inter huius successores praeprimis nominari merentur IOANNES FABER BAMBERGENSIS, qui anno 1600. horti curam suscepit PAVLI V. iussu



iussu per tres annos iter inuestigandarum herbarum causa suscepit, et hac ratione numerum plantarum horti mire auxit. PETRVS CASTELLVS dein laudandus venit FABRI successor, qui custodiam horti Romani cum Messanenſi commutauit. Hunc hortum CASTELLVS noster, et quidem ad mentem CAESALPINI, praeceptoris sui, fundauit. Distribuit nimirum singulas plantas secundum seminum structuram, in quo MORISONO praeiuit. Cum huic minus seduli succederent, factum est, vt hortus in Vaticano adhuc situs, sensim interiret, atque tandem in Ianiculo denuo exstrueretur anno circiter 1660. Huic horto postea J. B. TRIUMPHETVS est praefectus, qui non solum plantarum cohortem egregie auxit, sed etiam effecit, vt CLEMENS XI. aulae pentagonam insignis structurae horto finitimam a fundamentis exstrueret, in qua non solum botanicae demonstrationes fiebant, sed etiam plantae per hyemem contra frigus custodiebantur. Successores, qui TRIUMPHETTO contigerunt, adeo fuerunt in colendo negligentes, vt ipse hortus procul dubio interiisset, nisi BENEDICTI XIV. cura factum esset, vt loco vnus botanici duo constituerentur, quorum alter theoreticam, cui iam praest 10. FRANC. MARATTI, alter practicam, nunc Cl. SABBATI, botanices curet partem. Hortus vero in monte Ianiculo ad fontes Paulinos reperitur, diuiditur aquaeductu in duas partes, aliam superiorem planiorem, inferiorem aliam in conuallem compressam. Destituitur hybernaculo commodo, ventisque expositus est borealibus. Huius delineatio addita videtur non accurate satis pictorum regulis respondere.

Plantae in hoc tomo delineatae ad primam et p. 11, secundam Tournefortiani systematis classem pertinent, ad eos nimirum *monopetalos*, quibus flo-

res *campaniformes*, et *infundibuliformes* s. *rotati* competunt. In explicandis atque denominandis plantis, ratione iam exponenda, sunt versati. Praemiserunt nimirum characteres classis illius, ex qua plantas postea sunt tradituri; dein sectionum singulae classis distributione facta, notas pluribus herbis communes h. e. genericos characteres exponunt, quibus tandem specificae descriptiones C. BAVHINI potissimum, rariusque LINNEI subiunguntur. His tandem vel de viribus plantae, vel de habitu ipsius additae sunt obseruationes.

p. 12. Ex his notamus *Nolanae prostratae* faciem, respectu floris habito, cum *Atropae Belladonnae* forma eandem videri; multum tamen discrepantiae inter vtriusque florem a nobis reperiri fatendum est, quippe cum illius flos sit *campaniformis patens*, huius contra *campaniformis stricte sic dictus*.

p. 13. *Symphyti* atque *Cerinthos* affinitas, merito arguitur. *Asclepiadas* quinque staminibus gaudere ab Auctoribus adhuc docetur \*). *Tami* species corollis praeditas esse docetur, reprehenditur nimirum LINNEVS floribus femineis denegans corollam, et nectarium LINNEI, corollam potius

p. 22. esse nominandam statuitur. Vituperatur LINNEVS *Momordicam Elaterium* et *Cucumerem colocynthidem* genere diuidens, nobis vero characteres genericos Linneanos secutis, magna vtramque in-

p. 29. tercedere videtur discrepantia. Scriptorum in hoc opere laudatorum, et plantarum delineatarum catalogus, librum ipsum finiunt. Plantae rariores, quae nostram prae reliquis meruerunt attentionem, sunt *Atropa Mandragora* tab. 1. et 2. *Convolvuli* species tab. 20. quam nos pro *Conu. hederaceo* LINN. habemus. *Euphorbia* tab. 29. quam, cum spinis sit destituta, *Euph. capiti medusae* annueran-

\*) vid. supra JACQUIN misc. no. 4.



numerandam esse censemus. *Oxalis stricta* in tab. 31. caule villoso et pedunculis umbelliferis, a *O. corniculata* differens. *Cotyledon umbilicus* ♀. racemo simplici, et floribus pendulis, ab LINNEI descriptione differt, planta in tab. 35. cernitur. *Cynanchum Monspeliacum* tab. 39. *Malope malacoides* tab. 50. *Tamus communis*, cuius ramus in tab. 59. depictus nobis monoicus esse videtur, pertinet vero planta ad dioicarum classem. *Trichosanthes Anguina* tab. 71. *Campanula persoliata* tab. 75. *Ipomoea quamoclit* tab. 85. et *Gentiana persoliata* tab. 100. Reliquarum plantarum, quae insunt, catalogum propterea omittimus, quod in nostris regionibus non solum sint vulgatiores, sed etiam, quod iam ab aliis fuerint depictae.

Praeter colorem vero, qui, vt supra iam monuimus, nobis rarius probatur, tab. 18. errasse nobis videntur Auctores eo, quod *Convolvulum farinosum* Linn. Syst. Nat. Ed. XIII. p. 168. pro *Scammonea* vera habuerint. *Euphorbiae* species tab. 25. tradita, procul dubio est *E. tirucalli* LINNEI, cui tamen folia lanceolato linearia non respondent. Planta in tab. 31. nobis potius *Portulacae* species, quam *Glaux* esse videtur. Nimia pictoris assiduitas, qua factum est, vt *Alceae roseae* folia vermibus comesa in tab. 44. sint delineata, nobis propterea non probatur, quod lepidos magis delectet, quam herbarum inuestigatores instruat. *Hibiscus trionum* tab. 55. depictus, habitui plantae naturali minime conuenit. In tab. 84. pro rubro colore florum *Mesembryanthemi ringentis canini*, luteus substituendus erit. Tenerior filorum fabrica, quibus *Menyanthis trifoliatae* superbiunt corollae, in tab. 88. prorsus est neglecta. De colore, quo flores *Vincarum* sunt pictae, naturae nostro iudicio non respondenti, nil dicamus.

XXI.

1. I. VAN DEN BOSCH Medici Hagani historia constitutionis epidemicae verminosae, quae annis 1760, vsque ad initium anni 1763. per Insulam Ouerflacque et contiguam Goedereede grassata fuit cet. Editio noua. Curante IO. CHRIST. GOTTL. ACKERMANN Med. D. Norimberg. Impensis Io. Georg. Lochner MDCCLXXIX. 8. pagg. 426. praeter dedicationes, praefationes, contentorum capitum et sectionum elenchum.

**I**ndicamus lubenter huius libri utilis et medicis practicis summe necessarii nouam editionem, quam Cl. ACKERMANN curauit et Cl. DELIO dicauit. In ipso libro, uti Editor Ipse scripsit in praefatione praemissa, nihil est mutatum, sed tradit Lectoribus librum talem, qualem Cl. VAN DEN BOSCH edidit. Nos vero praeterea hic nihil dicemus, cum Cl. VAN DEN BOSCH editionis, quae prodiit Lugduni Batauorum 1769. eadem forma in nostris commentariis \*) iamiam dederimus summam, ex qua utilitas et dignitas huius libri satis luculenter intelligentur.

XXII.

Noua Physico Medica.

Facultatis Medicae in perantiqua Studiorum Universitate *Tubingensi Eberhardina - Carolina* Professores hoc tempore sunt:

GEORG. FRID. SIEGWART, P. P. O.

CHRIST.

\*) v. Vol. XVII. p. 212.



CHRIST. FRID. IAEGER, P. P. O.

G. C. C. STORR, P. P. O.

C. P. DIEZ, P. P.

C. F. REVSS, P. P.

G. G. PLOVQVET, P. P.

Societas Regia Scientiarum *Hafniensis*, d. 7. Maii 1779. elaborationum *super acidi nitrosi origine* disquisiuit praestantiam, et praemium optimae super hac re disputationi promissum, concessit tractatui Gallico, cui inscriptio erat *in paucis multa utinam bona*. Cl. Auctor vero se nominari recusavit. Ex quaestionibus denuo propositis et ad nos pertinentibus notamus hanc:

*An seminium vermium intestinalium, taeniae, gordii, ascaridis, fasciolae etc. animalibus connatum, an ab extus intromissum: observationibus et argumentis probare, remediaque in illo casu recensere.*

Praemium erit nummus aureus centum thalerorum Danicorum valore. Elaborationes ante finem Augusti 1780. ad Ill. DE HJELMSTIERNA, solutis vectigalibus, sunt mittendae.

Societas *Lipsica* scientiarum *Tablonowskiana* inter alias quaestiones, quas, cum ad nostra non pertineant studia, omittimus, has proposuit:

„*Quaenam est utilissima agriculturae cum re pecuaria proportio respectu diversitatis agrorum.*

„*Quae ex theoriis de lumine et colore Newtoniana vel Euleriana est probabilior.*

Praemium optimi tractatus super singula harum quaestionum, est moneta ex auro confecta viginti quatuor aureos Hollandicos pondere

aequans. Traſtatus latine ſcripti ante finem Octobris 1779. ad Cl. CLODIVM Phil. Ord. Profeſſ. qui Societati a ſecretis eſt, ſunt mittendi.

Cl. RUMPELT in ſchola veterinaria *Dreſdenſi* Profeſſor eſt designatus. Cuius rei cauſa per Germaniae, Belgii, Galliae atque Angliae celeberrima loca ſuntibus publicis iter inſtituit.

Cl. ADRIANVS VAN ROYEN *Lugduni Batauorum* aetatis anno ſeptuageſimo quarto d. 28. Februarii 1779. vitam cum morte tranſmutauit.

Cl. ANTONIVS MATANI Med. Doct. et Prof. Piſanus, Soc. Scient. Gottingenſis Correfpondens d. 21. Iunii 1779. aetatis anno quadra-geſimo eſt mortuus *Piſae*.

Cl. IOACH. FRIDERICVS HENCKEL, *Berolini* hac 1779. aeſtate e viuis diſceſſit.

CHRISTIANVS VAN PAECKEN Imperii Tribuna-  
lium Conſiliarius, Collegii Medici Supremi  
Petropolitani Cancellarius \*). *Petropoli* a-  
poplexia hoc 1779. anno obiit.

Cl. IO. GEORG. EISEN, qui olim verbi diuini mi-  
niſter apud Tormenſes in Liuania erat; dein  
vero oeconomiae Profeſſor *Mitauiae*; tandem  
vero in villa *Iaropolcz*, cui Illuſtriſſimus Co-  
mes DE TSCHERNISCHEFF praeſt, absque  
munere publico viuebat, *ibidem* die 15. Fe-  
bruarii 1779. aetatis anno ſexageſimo ſecun-  
do deſiit viuere. Celebris eſt praeter alia, arte  
herbas apte ſiccandi a ſe inuenta.

\*) vid. comm. noſtr. Vol. XI. p. 715. Vol. XIII. p.  
153 et 167.



XXIII.

Index scriptorum physico medicorum, quae  
anno 1775 prodierunt \*).

Philosophical Transactions cet. Vol. LXV. (v. comm.  
nostr. Vol. XXI. p. 1.)

*Auserlesene Abhandlungen aus den philosophischen  
Transactionen. Zweyter Theil. (v. ib. Vol. XXII.  
p. 563.)*

Medical commentaries. Tom. III. Lond. 8.

*Medicinische Commentarien einer Gesellschaft der  
Aerzte zu Edimburg. 1. Band. Altenb. 8.*

*Neue Versuche und Bemerkungen aus der Arzney-  
kunst und übrigen Gelehrsamkeit, einer Gesellschaft  
zu Edimburg vorgelesen, und von ihr herausgege-  
ben. Als eine Fortsetzung der medicinischen Ver-  
suche und Bemerkungen, 3. Band. Aus den Engl.  
Altenburg. 8. m. K.*

Köngl. Vetenskaps Academiens Handlingar, (v. com.  
nostr. Vol. XXI. p. 625.)

Nova acta Upsalienfia. Tom. II. (v. ib. Vol. XXII.  
p. 387.)

*Neue Sammlung verschiedener Schrifften der größten  
Gelehrten in Schweden für Liebhaber der Arzney-  
wissenschaft, der Naturgeschichte, der Chymie und  
Oekonomie. Aus den Schwedischen. 1. Band. Kop-  
penhagen. 8. Tractatus Suecici hic sequentes  
lectu digni versi sunt. I. CHRIST. POLHEM, in-  
stitutio de ferro, chalybe, cupro, aere, stanno*

Y 5

et

\*) Cogimur iterum iterumque, vti iamiam fecimus v.  
comm. nostr. Vol. XVI. p. 171. ne nimis tarde libros  
indicemus, nonnullis voluminibus duos annos ali-  
quoties colligere. Fiet autem eodem, quo polliciti  
sumus et haecenus fecimus, modo. (v. comm. nostr.  
Vol. XXI. p. III. et idcirco iam supra duo supple-  
menta praemisimus.

et plumbo, iis dicata, qui horum metallorum officinas construere cupiunt. 2. MORÆI, præfide WALLERIO defenſa diſſ. de montibus cupriferis Fahluneniſibus. 3. ABRAH. BÄCK, de uſu noſodo-chiorum ratione ipſius artis medicæ. 4. DE GEER de generatione inſectorum. 5. IOH. FRID. KRÜGER de climatis Suecici præſtantia. 6. GERH. MEYER de metallis ſubinde rectius tractatis. 7. EWALD RIBE de uſu cognitionis phyſicæ in curandis morbis.

Societatis Hauniensis collectanea. Vol. II. (*v. comm. noſtr. Vol. XXII.*)

Prodromus præuertens continuata acta medica Hauniensia, quæ per clementiſſima Regia auſpicia ad veneranda maiorum exempla in ſincera incrementa quarumcunque ſcientiarum, quæ ullo modo forum medicum ſpectant, quotannis a collegii medici regii membris ex ſuis et ſociis aliorum operis publici iuris ſiunt. Editio noua. Hauniae et Lipſiae apud Fridericum Chriſtianum Pelt. 4. c. f. (*Prima huius libri editio prodiit eadem forma atque inſcriptione iisdemque figuris æneis 1753. et a nobis iam ſumma eius eſt narrata. v. comm. noſtr. Vol. VI. p. 105.*)

Verhandlingen te Harlem. Vol. XVI. (*v. comm. noſtr. Vol. XX. p. 203.*)

Verhandlingen te Vliffingen (*v. comm. noſtr. Vol. XXI. p. 359.*)

*Abhandlungen der Seeländiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Vliffingen. Des erſten Theils, erſter Abſchnitt, welcher die zur Medicin und Chirurgie gehörigen Aufſätze in ſich enthält. Ueberſetzt und mit einigen wenigen Anmerkungen verſehen, von ANDREAS BÖHME, fürſtl. heſſendarmiſt. Bergrath und der Weltweiſheit und Meſskunſt erſten Lehrer zu Gießen. Gießen. 8. m. K.*

*Abhand-*



*Abhandlungen aus der Naturgeschichte und practischen  
Arzneykunst und Chirurgie, aus den Schrifften der  
Harlemer und andern Holländischen Gesellschaft-  
ten. 1. Band. Leipzig. 8. m. K.*

Eruditi viri hac lingua non gnari cum continua-  
tionem coeptae iam anno 1758. huius transla-  
tionis Germanicae ab Ill. KAESTNER non nuper  
optarunt, editor secum constituit, ea solummo-  
do Germanico vulgari, quae ad historiam natu-  
ralem, medicinam chirurgiamque spectarent et  
reliqua omittere, vt voluminibus et pecuniae  
parceretur. Hoc volumen continet ea, quae in  
quatuor prioribus tomis Harlemensium actorum  
sunt collecta. Quibus sequentibus tomis aequae  
ita excerptis, Roterodamensia et Middelburgen-  
sia seu Vlissingensia acta, non multis nota, eodem  
consilio Germanice vertet editor. Praeterea in  
hac versione minus utilia et necessaria omittun-  
tur insimulque satis iamiam nota, vti scilicet BA-  
STERI obseruationes, de aqua calcis et spiritu  
MINDERERI, item de aëre in hoc volumine con-  
tentae sunt, missae. Scripta praemiis condeco-  
rata pariter hic non commemorabuntur et ean-  
dem ob causam GRASHUIS elaboratio, de colica  
pictonum non in Germanicam linguam hic trans-  
lata est.)

*Acta Academiae Theodoro Palatinae. Tom. III.  
(v. ib. Vol. XXII. p. 3.)*

*Abhandlungen der Churfürstlichen Bayerischen Acade-  
mie der Wissenschaften. 9ter Band. München. 4.  
mit K.*

*Bernisches Magazin der Natur, Kunst und Wissen-  
schaften. 1. Band. Bern. 8. m. K.*

Editur hic liber a Cl. WYTENBACHIO, estque ita  
institutus, vt versionibus e diariis eruditorum An-  
glicis,

glicis, Gallicis, Italicisque immisceantur tractatus  
et relationes de rebus nouis. Nos itaque, omis-  
sis versionibus, pauca de posterioribus comme-  
moremus. p. 61. Hirudines motu s. quiete muta-  
tiones tempestatis indicant, suntque thermome-  
tra et barometra uiua. Cl. WYTTENBACH de  
naturae productis Helueticis. Coniicit in Hel-  
vetia olim fuisse montes igniuomos. Ex Insectis  
Helueticis climata Heluetica determinat. GAU-  
BII observata de Phosphoro Hombergico. H. ST.  
experimenta, Viride Brunswicense, a fratribus  
GRAVENHORST paratum, concernentia. EIVSD.  
correctio olei oliuarum et lini. *Idem*, noua de  
affinitate corporum communicat cogitata. VER-  
DEIL de animalculo, a puella vomitu euacuato,  
quod taeniae simile erat, et de origine animalium  
in hominibus. De calcis natura coniecturae.  
Nouveaux mémoires de Berlin. (v. comm. nostr. Vol.  
XIX. p. 683.)  
Novi commentarii Gottingenses Tom. V. (v. ib.  
Vol. XX. p. 597.)  
*Neue Mannichfaltigkeiten. Berlin. 8.*  
*Beyträge zur Naturgeschichte des Schweizerlandes,*  
I. - 3. Stück. Bern. 8. mai.  
*Beschäftigungen der Berlin. Gesellschaft.* (v. comm.  
nostr. Vol. XXI. p. 632.)  
*Berlinische Sammlungen. 7. Theil.* (v. ib. Vol. XXII.  
p. 307.)  
*Der Naturforscher, v. supra.*  
Onomatologia historiae naturalis completa Tom. V.  
et VI. Ulm. Francof. et Lips. 8.  
*Schauplatz der Natur nach den neuesten Beobachtun-*  
*gen und Versuchen. Erster Band. Leipzig. 8.*  
Raccolta di opuscoli physico medici. Florenz. 12.  
(Auctor est Cl. TARGIONI et compilatio uti-  
lissima).



Nuova raccolta d' opuscoli scientifici e filologici.  
Vol. XXVII. In Venet. 8.

Catalogue des curiosités naturelles, qui composent  
le cabinet du M. de \*\*\*. à Paris. 8.

Catalogue du Cabinet d' histoire Naturelle du feu  
M. VILLIEZ Negociant de Nancy. à Nancy. 8.

Correspondence d' histoire naturelle ou lettres sur  
les trois regnes de la nature contenant des ob-  
servations sur les animaux, les végétaux & les  
minéraux. Vol. VIII. à Paris. 12. (*Plurima ex  
aliis libris collecta continet.*)

Nouveau dictionnaire raisonné de physique & des  
sciences naturelles, contenant l' histoire généra-  
le des animaux, des végétaux, des minéraux &  
de tous les phénomènes de la nature avec l' hi-  
stoire des sciences physico mathématiques & de  
tout ce, qui a rapport à la physique & à l' hi-  
stoire naturelle, par une Société de Physiciens.  
Vol. VIII. à Paris. 12.

I quadrupedi di Sardegna. Sassari. 8. c. f.

*Die Säugthiere in Abbildungen.* (Auctore SCHREBE-  
RO, v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 42.)

A natural history of Britis'h birds etc. with their  
portraits accurately drawn and beautifully co-  
loured from nature. Fol. Imper. Paper. (Auctor  
*huius avium Britannicarum historiae dicitur Cl.  
HAYE, idque opus simile PENNANTI zoologiae Bri-  
tannicae. v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 408. Ico-  
nes in naturali magnitudine, et si saepe nimis sint  
splendidae, laudantur et huius operis continuatio  
optatur. In hac parte quadraginta tabulis totidem  
aves ex Falconis, Fringillae, Pari, Anserum et Pha-  
siani generibus delineantur. Descriptio est Latina  
Linneanis verbis et Anglica).*

Onomatologia botanica completa. Francof. et  
Lips. 8.

Lettre

Lettre sur les arbres à epiceries avec une instruction sur leur culture et leur preparation et lettre sur le Caffé. à Paris. 12.

*Mineralogische Geschichte des Sächsischen Erzgebirges. Hamb. 8.*

*Geschichte der Steinkohlen und des Torfs, von dem Verfasser des Lehrbegriffes sämtlicher oekonomischen und Cameralwissenschaften. Mannheim. 8. (lectu dignus liber.)*

*Historische Mineralogie oder Beschreibung der Mineralogie und Anzeige der Oerter, wo sie gefunden werden. Für Anfänger. Breslau und Leipzig. 8. (Auctor Cl. VOLTELEN pauca mineralium loca nouit.)*

*Dizzionario universale economico rustico. Vol. V. et VI. Mayland. 8.*

*Gazette d'agriculture, commerce, arts et finances pour l'année. 1775. à Paris. 4.*

*Essays relating to agriculture and rural affairs. Part. II. 8. c. f. aen.*

*Sammlung neuer und nützlicher Abhandlungen und Versuche aus der Oeconomie, Mechanik und Naturlehre. Nürnberg. 8. m. K.*

*Der Preussische Sammler zur Kenntniß der Naturgeschichte zur Verbesserung der Stadt und Landwirthschaft der Policey und Finanzwesens zur Ausbreitung der Preussischen Geschichte und Alterthümer. 2ter Band, Königsberg. 8.*

*Neues Verfahren, kalte, nasse, und unfruchtbare Ländereyen, vornämlich kläyichte oder thonartige Grundstücken zu verbessern, besonders eine Anweisung den Kleytorf und die Maulwurfshaufen auszubrennen, nebst einem Anhang, welcher die in dem*



dem Feld und Gartenbau gemachte allerneuesten Entdeckungen der Teutschen und Ausländer überhaupt enthält. Aus dem Englischen. Münster und Leipzig. 8. m. K.

Pharmacopoea Suecica (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 353.

Instructions pour l'usage de la houille pour faire du feu sur la maniere de l'adapter à toutes sortes de feux et sur les avantages, qui resulteroient de cet usage. à Avignon. 8.

Von denen Arzneykräften der Gesundbrunnen und ihrem gehörigen Gebrauche. Rodenburg. 8.

Untersuchungen und Nachrichten von des berühmten Selzerwassers Bestandtheilen, Wirkungen, richtigen Gebrauch, dieses und anderer Sauerbrunnen, wie auch von denen verschiedenen bey der Sauerbrunnencur, vorkommenden schädlichen Vorurtheilen und Fehlern. Leipzig. 8.

Système physique et morale de la femme au tableau philosophique de l'état des organes, des moeurs et des fonctions du Sexe. à Paris. 12.

Preceptes sur la santé de gens de guerre ou hygiène militaire. à Paris. 12. (*Auctor dicitur COLOMBIER*).

Instruction courte mais interessante, sur les suites facheuses, aux quelles on expose la Santé par la pollution volontaire de soi meme, en forme de Supplement tres necessaire, au livre anglois, intitulé *l'Onania*, augmentée par des extraits de diverses lettres, qui sont preuve de la maniere la plus interessante de la vertu, et de l'efficacité des medicamens, approuvé contre toute maladie causée par l'abus du vice surmentionné, et plusieurs autres maux etc. 8vo.

Bemerkungen über den Cacao und die Chocolate etc. Leip-

*Leipzig. 8. (Est Franco Gallica versio, v. comm. nostr. Vol. XX. p. 309.)*

The modern family Physician or the art of healing made easy by being a plain description of diseases, with the methods of cure. Lond. 8.

Recherches sur les remedes capables de dissoudre la pierre et la gravelle. Traduit de l'Anglois. ibid. 8.

Precis du traitement contre les tenia ou vers solitaires cet. à Paris. 12. (*v. comm. nostr. Vol. hoc. p. 206.*)

Opisanie moramaj jazw' ii, b' iiwschej w' stolitfch-nom' ghoradje Moskwje f' 1770 pro 1772. ghod', f' prilozcheniem wszech dlja prekraschtschenija onoj toghda ustanowtenn' iich' utschrechdeny; po wsew' iipotschajfchemu poweljenijn napetsch anno 1775. ghoda w' Moskwje pri Imperatorfkom' uniwersitetje. h. e. Descriptio pestis Moscoviticae, ab anno 1770-1772. graffantis, cum remediis illae oppositis. Supremo jussu typis expressa anno 1775. Moscoviae in typographia academica. (Auctore SCHAFONSKY.)

Dissertation sur cette pensée, quelles sont les causes principales de la mort d'un aussi grand nombre d'enfants et quel's sont les preservatifs les plus simples pour les conserver la vie. à Geneve. 8.

Adversaria medico practica. Vol. III. P. IV. (*v. comm. nostr. Vol. XX. p. 674.*)

Description de la boete d'autre pot pour le secours des noyés. à Paris.

*Sammlung würdiger Erfahrungen, die den Werth und Nutzen der Pocken - Inoculation näher bestimmen können, 1 - 3. Stück. Berlin. 8.*

*Ueber*



*Ueber die Magnetencuren an einen Arzt, von einem Naturforscher (f. l.)*

*Abhandlung über die Kenntniss und Heilart der Schlagflüsse. Langensalza. 8.*

*Sammlungen auserlesener Abhandlungen, zum Gebrauch practischer Aerzte. 2. Bandes 1. und 2. Stück. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 368.)*

An historical account of all the voyages round the world, performed by english navigators, including those lately undertaken by orders of his present Majesty, the whole faithfully extracted from the journals of the voyagers. Lond. 8. Vol. 4.

A Journey to the western Islands of Scotland. ib. 8. (Cl. JOHNSON *Auctor huius libri, qui instar Supplementi in Cl. PENNANTI iter cernitur: hic hominum mores atque observationes de phaenomenis et soli climatisque productis, ut et consuetudines et characteres incolarum describuntur.*)

*Bemerkungen einer Reise im Russischen Reiche, im Jahr 1772. Petersburg. 8. 2. Theil. (Auctor est I. CH. GEORGI, rei pharmaceuticae deditus et comes Cl. PALLAS egregiaque insunt obseruata.)*

On the improvement of medecine in London on the basis of public Good. London. 8.

Sammling af rön och af handlingar rörande landtbruket. Tom. I. Stockholm. 8.

*Mémoire sur les maladies contagieuses du betail. à Paris. 4.*

*Recherches historiques et physiques sur les maladies epizootiques avec les moyens d'y remedier, publiés par ordre du Roi. ib. 8. Tomes. II.*

*Consultation sur la maladie epizootique, qui regne en Guyenne et dans les pays circonvoisins. à Bordeaux. 4.*

Maladie sur les bestiaux, ayants à la suite le remède contre cette maladie. à Bordeaux. 8.

Consultation de l' Université de médecine sur la maladie epidemique, qui regne parmi les bêtes à corne et qui ruine la province de Languedoc. à Montpellier. 4.

Instructions et avis aux habitans des provinces meridionales de France sur la maladie putride et pestilentielle, qui detruit le betail. Publiées par ordre du Roi. à Paris. 4.

Extrait du mémoire instructif sur l'exécution du plan adopté par le Roi, pour parvenir à detruire entierement la maladie qui s'est repandue sur les bestiaux en Guyenne et dans les provinces circonvoisines. à Versailles. 12.

*Geschichte der Einimpfungen der Hornviehseuche, welche anno 1770-1772. in Dännemark auf Königliche Kosten vorgenommen worden. Kopenhagen. 8.*

Sur la formation des jardins. Par l' Auteur des considerations sur le jardinage. à Paris. 8. (*Distincte et accurate scriptus liber.*)

Epistolae ab eruditis viris ad HALLERVM scriptae. Vol. V. Bern. 8. mai.

*Briefe über Thiere und Menschen. Leipzig. 8. (Versio bona libri lectu digni.)*

*Der philosophische Arzt. 1. Stück. Frankf. 8.*

*Schreiben 2 Aerzte aus Nordhausen an einen Freund und Arzt in Eisleben. 8. (f. l.)*

*Der Schlesische Arzt, oder Betrachtungen über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft. 2. Theil. Breßlau. 8.*

*Beschreibung des sogenannten Mantuanischen Gefäßes, welches in dem Braunschweigischen Natural-Cabinet befindlich ist. Braunschweig. 8. (f. a.)*

*Kurze Anweisung für das Landvolk, zu Besorgung der Wälder, nebst einen Waldcalender. Zürich. 8.*

Arz-



*Arzneyen wider physicalische ökonomische und diätetische Vorurtheile. 12. Stück, nebst Vorrede zum ersten Jahrgang, von F. A. WEBER. Heilborn. 8.*

*Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneykunde. Langensalza, 8.*

*Kritische Sammlungen, zur neuesten Geschichte der Gelehrsamkeit. 2. Bandes 2. Stück. Bützow und Wismar. 8.*

*Hamburgische Gartenbibliothek, worinnen mancherley lehrreiche und angenehme physicalische, moralische, historische, satyrische und poetische Schrifften, zur Bildung und zum Vergnügen des Verstandes, des Witzes und des Herzens, wie auch verschiedene, die Gartenkunst betreffende nützliche Aufsätze zu finden sind. Erster Band. Hamburg. 8.*

IO. CHR. GOTTL. ACKERMANN, de trismo commentatio medica. Gotting. 8.

EIVSD. diss. Ima de dysenteriae antiquitatibus, Hal. 4.

I. I. ACKERMANN observationum medico chirurgicarum specimen inaugurale academicum. Resp. H. I. Koch. Kil. 4.

FIVSD. progr. de variolarum insitione. ib. 4.

OLOF ACRELLS chirurgiske händelsier cet. Stockholm. 8. c. f. (*Est hic liber denuo editus et valde auctus, quem non diu ante indicavimus 1777, a Cl. MURRAY in linguam translatus Germanicam*).

I. M. AEPLI *Abhandlung von den böartigen Fiebern. Zürich. 8.*

A Specimen of the medical Biography of Great Britain: with an Address to the Public. By IOHN. AIKIN. Surgeon. 4.

ALBINVS de natura hominis, (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 162.)

*Zootomische und physicalische Entdeckungen von der innern Einrichtung der Bienen, besonders der Art*  
Z 2 *ihrer*

*ihrer Begattung entworfen, von I. F. E. ALBRECHT. Erfurt. 8. (Partes genitales apium describit aliasque egregias observationes subiungit).*

\* ALLOUCH diss. de patellae transuersae fractura. Auctore et Resp. *Franc. Math. Didier de Lauroi.* Paris. 4.

N. M. AMBODICK diss. de hepate. Argentor. 4.

Trattato della acque minerali di NICOLA ANDRIA. (*Inter alia refert Cl. Auctor, aquas minerales, quae Olmitelli scatent, esse alcali et phlogisto penetratas, uti in colore coeruleo Berolinensi. Praeterea mercurium dulcem, kermes minerale, atque aurum mineralisatum invenit.*)

IO. ARDUINI saggio fisico mineralogico di lithogonia et orognofia. Padua. 4. mai.

EIUSD. Notizia sopra una sorgente di acqua acidula medicinale, scoperta nei monti di Arzignoro. ib. 12.

Icones rerum naturalium: ou figures enluminées d'histoire naturelle de Nord. Par M. ASCANIVS. Cahier III. à Coppenhagen.

Histoire des plantes de la Guiane Francoise. Par M. FUSEC AUBLET. 4. c. tab. aen. Vol. IV.

Recueil d'observations sur les methodes pour guerir la maladie épidémique des bêtes à cornes: par FELIX VICQ D'AZYR. à Paris. 4.

Institutiones medicae in vsum auditorum suorum. Vol. I. Auctore IERM. AZZOGNIDI. Bologna. 8.

ERN. GODOFRED. BALDINDER diatribe de optima medicamentorum mixtione. Gotting. 4.

EIUSD. progr. de malignitate in morbis ex mente HIPPOCRATIS per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem illustrata. ib. 4.

EIUSD. diss. inaug. sistens vires chamomillae. Resp. Io. Daniele Carl. ib. 4.



ERNEST. GODOFR. BALDINGER progr. sistens vestigia irritabilitatis Hallerianae in veterum monumentis, exemplo calidi innati. Gotting. 4.

EIVSD. progr. sistens vindicias irritabilitatis Hallerianae. ib. 4.

EIVSD. *Magazin vor Aerzte. Leipzig. 8.* (Per partes haec collectio vulgata a Cl. Auctore, duodecima parte ad finem perducta est. Continuat vero Cl. Auctor hoc opus iam ita inscriptum: *Neues Magazin vor Aerzte.*)

Diff. sur cette pensée quelles sont les causes principales de la mort d'un aussi grand nombre d'enfants et quelles sont les preservatifs les plus simples pour leur conserver la vie. Par JACQUES BALLEXFERD, à Genev. 8.

GOTTL. BARKHAVSEN specimen botanicum sistens fasciculum plantarum ex flora comitatus Lippiaci. Gottingae. 4.

Observations historical, critical and medical on the wines of the ancients and the analogy between them and modern wines. By EDWARD BARRY. Lond. 4.

I. BATY diss. inaug. sistens descriptionem quorundam morborum Hungaris endemiorum et remedium iisdem familiarium et quasi domesticorum. Ultraj. 4 maj.

W. BAVER über die Wirkung der von Herrn MESMER entdeckten Magnetcur. Wien. 8.

I. W. C. BAYMER diss. de meningibus. Giesae. 4.

*Kurze Lehrsätze über die Pocken zur Erforschung der wahren Natur dieser Krankheit von D. W. BAYLIER. Aus dem Englischen übersetzt von D. A. B. KOELPIN. Stettin. 8.*

A. BEAUME' *Experimentalchymie. Aus dem Französischen. Leipzig. 1 und 2 Theil. 8. (v. supra.)*

\* \* BECHSTEDS vollständiges Niedersächsisches Land- und Gartenbuch. Flensburg und Leipzig. 8. 3 Band. Grundsätze der deutschen Landwirthschaft von 10.

BECKMANN, 2te Ausgabe. Göttingen. 8.

EIVSD. physisch öconomische Bibliothek, 5ten Bandes 4tes Stück, und 6ten Bandes 1stes Stück. Göttingen. 8.

Diff. histor. med. epist. de peripneumonia in vomica versa, ab HORAT. BELLINI. Rom. 8.

Discorso apologetico delle febbre biliose nell' a 1772. del D. GVID. ANTONIO BENELLI. Bologna. 8.

Dal latte per uso della medicina, del Dottore LVIGI BERTINI. Perugia. 8 mai.

Beobachtungen über den Gesundbrunnen bey Baulet im Fürstenthum Würzburg und Anweisung zu dessen Gebrauch von CHRIST. 10. BERGER. Meiningen. 8.

EIVSD. super chirurgiae genuina indole et recta discendi ratione ad medicinae studiosos allocutio. Hamburg. 8.

TORB. BERGMANN diff. inaug. de niccolo. Resp. Io. Afzelio Arvidron. Upsal. 4.

EIVSD. diff. inaug. de magnesia alba. Resp. Carol. Nörell. ib. 4.

Nymphomania de BIENVILLE translated in English by EDW. SLOANE WILMOT. Lond. 8. (v. comm. nostr. Vol. XIX. p. 696.)

P. BIERCHENS Abhandlung von den wahren Kennzeichen der Krebschäden, wie auch der scrophulösen und venerischen Geschwüre und Geschwülste. Aus dem Schwedischen übersetzt von D. ADOLPH MURRAY. (v. ibid. 513.)

Précis d'operations de Chirurgie. Par M. LE BLANC Tom. I et II. à Paris. 8.

10. LOR. BÖCKMANNS Naturlehre oder die gänzlich umgearbeitete Malerische Physik. Carlsruh. 8 maj. mit Kupfern.



G. R. BOEHMER an pastus pecorum in stabulis potius, quam pratis instituendus. Resp. C. F. Schneider. Viteberg. 4.

PHIL. ADOLPH. BOEHMER diss. inaug. de cortice Peruviano speciebus debilitatis magis accommodando. Resp. Theodos. Gottlieb Neigefind. Hal. ad Salam. 4.

EIVSD. diss. inaug. de difficili saepe caussarum scrutinio in morbis, exemplo icteri in puero verminoso observati illustrat. Resp. Paul. Joach. Scheele. ib. 4.

Herrn HERRMANN BOERHAAVEN Beschreibung der Arzneymittel und Recepte, die sich auf seine vom Freyherrn VAN SWIETEN erläuterten Lehrsätze von Erkenntnissen und Heilungen der Krankheiten beziehen. Aus dem Lateinischen übersetzt, 2te Auflage. Wien. 8.

G. D. BOESEL. Grundlegung zur Hebammenkunst vor die Hebammen und Frauen, so Wehmütter werden und sich unterweisen lassen wollen, vor die Schwängern, Gebährenden und entbundenen Frauen, kurz, ordentlich, deutlich und gründlich nach der Vernunft und Erfahrung abgefaßt, und mit den besten in dieser Kunst berühmtesten Verfassern bekräftiget etc. durch I. G. SONTAG. Leipz. 8. (Editio nova.)

BOLTEN von künstlichen Magneten in einer Nervenkrankheit. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 147.

EIVSD. fortgesetzte Nachrichten von den mit dem künstlichen Magneten gemachten Versuchen in der Nervenkrankheit der Jungfer \*\*\*. Hamburg. 4.

Dictionnaire raisonné universal d'histoire naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux, minéraux, celle des corps celestes, des météores, et des autres principaux phénomènes de la nature; avec l'histoire et la description des drogues simples tirées des trois regnes; le détail

de leur usage dans la médecine dans l'économie domestique et champêtre, et dans les arts et métiers; avec une table concordante de noms latins cet. Par M. VALMONT DE BOMARE, à Paris. 6 Vol. 8 maj.

L. BONNETS *Betrachtungen über die organisirten Körper übersetzt und mit einigen Zusätzen herausgegeben von E. A. C. GÖTZE. Lemgo. 8.*

Recherches sur les maladies chroniques, leurs rapports avec les maladies aiguës, leurs périodes, leur nature, et la manière dont on les traite aux eaux minérales de Barèges et des autres sources de l'Aquitaine; par Mess. ANTOINE; THEOPHILE et FRANÇOIS DE BORDEU. Tom. I. à Paris.

A. BORN *Index fossilium. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 705.)*

EIVSD. *Abhandlungen. (v. ib. p. 322.)*

G. H. BOROWSKI *systematische Tabellen über die allgemeine und besondere Naturgeschichte zu weitem Erklärungen in Vorlesungen. Berlin. 8. (Tabulae nominales, hinc inde mutato systemate.)*

ERN. GOTTLÖB BOSE *diff. inaug. aduersaria de apostematibus sistens. Resp. et Auct. C. Frey. Lips. 4.*

EIVSD. *progr. inaug. de miasmate morbofo in corpore errante. Lips. 4.*

PHIL. ADOLPH BOEHMER *diff. de notabilibus quibusdam, quae fetui in vtero et partu contingere possunt ad illustrandum infanticidium. Resp. I. G. Zierhold. Hal. 4.*

Experiments, researches, and observations on the vitreous Spar, or Sparry Fluor. Being a complete



plete supplement to the discoveries made by the learned Mr. SCHEELÉ. By the ingenious Chymist and Alchymist at Paris M. BOVLLANGER. Translated in to English from the Authors Ms. by Mr. P. H. D. G. M. D. Lond. 8.

P. BOVNTER diff. exhibens nouam methodum remouendi a partu omnia, quae praeuideri possunt. Argentor. 4.

\* BOVRRETS *Schilderung seiner Reise nach den Savoyischen Eisgebürgen. Aus dem Französischen. Mit Anmerkungen. Gotha. gr. 8. 2 Theile.*

I. A. BRAMBILLA *chirurgischpractische Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen. Aus dem Italienischen übersetzt von I. G. P. Wien. 8.*

I. G. BRENDÉLII opusculorum medicorum. Tom. III. et vltimus, Curante H. A. WRISBERG. Goetting. 4.

Oeconomical and medical observations. By RICHARD BROOKLESBY. Lond. 8 maj.

H. L. VON BROCK *wahre Gründe der physical und experimental allgemeinen Forstwissenschaft, als ein Handbuch für Forstbediente zu gebrauchen. Leipz. 8. 4ter Theil.*

EIVSD. *Beantwortung der Frage, wie ohne Nachtheil der Festigkeit des Holzes das Wachsthum der Forsten beschleuniget werden könne. Berlin. 4.*

LADISLAI BRVZ diff. inaug. de gramine Mannae seu Festuca fluitante. Vienn. 8. c. fig.

Médecine domestique cet. Par M. BVCHAN. Traduit de l'Anglois par I. D. DVPLANIL, à Paris. 12. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 580. ibidem et Germanicae versionis est mentio facta.)

Collection des planches enluminées et non enluminées représentant au naturel ce qui se trouve de

plus interressant et de plus curieux parmi les animaux, les végétaux et les minéraux, pour servir a l'intelligence de l'histoire générale des trois regnes de la nature. Par M. BUCHOZ, à Paris. 12.

Histoire naturelle du regne végétal, ou nouveau Dictionnaire physique et oeconomique de toutes les plantes, qui croissent sur la surface du globe ; contenant leurs noms botaniques et triviaux dans toutes les langues, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et leurs especes ; les endroits ou on les trouve le plus communément ; leur culture ; les animaux aux quels elles peuvent servir de nourriture ; leurs analyses chimiques ; la manière de les employer pour nos alimens, tant solides que liquides ; leurs propriétés non seulement pour la médecine des hommes, mais encore pour celle des animaux ; les doses et les manières, de les formuler et les differens usages pour les quelles on s'en peut servir dans les arts, et métiers, on y a joint une bibliothèque raisonnée de tous les livres de botanique, l'explication des differens termes usités dans cette partie de l'histoire naturelle ; une notice de tous les systems, enfin la liste de professeurs et des jardins botaniques de l'Europe. Ouvrage orné de 1200 planches, gravées en taille douce par les meilleurs maitres et dessinées d'apres nature. ib. fol.

Oeuvres complètes de M. le Comte DE BUFFON, ornées de plus de 360 figures des animaux, dont 60 n'avoient point paru. ib. (*Haec nova editio prodibit in 4 et in 12.*)

EIVSD. *allgemeine Naturgeschichte, 7ter und letzter Theil, Berlin. 8 maj.*



DE BUFFON *Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere*,  
3ter Theil. ib. 8 maj. m. K.

EIVSD. *Naturgeschichte der Vögel. Aus dem Fran-  
zösischen mit Anmerkungen und Zusätzen von D.  
OEHMEN übersetzt, 1 Theil. Leipzig. 4. m. K.*  
(Idem liber a Cl. MARTINI. Berolini. 8vo. c. fig.  
in Germanicam linguam est translatus et anno-  
tationibus additamentisque auctus.)

*Unterricht in der Naturgeschichte für diejenigen, wel-  
che wenig oder gar nichts von derselben wissen, ertheilt  
von ANTON FRIDR. BÜSCHING. Berlin. 8 min.*

*Travels through the middle Settlements in North  
America in the Years 1759 and 1760. with ob-  
servations upon the state of the colonies. By  
the rev. ANDREW BURNABY. London. 4.*

*Some thoughts on the nature of fevers, on the  
causes of their becoming so frequently mortal  
and on the means to prevent. By JOHN BUR-  
RY. Lond. 8.*

*An account of puerperal fevers, as they appear in  
Derbyshire and some of the Country adjacent.  
BY WILL. BUTTER. ib. 8.*

*Bibliothèque litteraire, historique et critique de la  
médecine ancienne et moderne. Par M. c \*\* à  
Paris. 4.*

*Reponse de M. CADET a plusieurs observations de  
M. BAYME', sur l'ether vitriolique. ib. 4.*

*Saggi d'agricoltura del Medico ANTONIO CAMPI-  
NI sulla cultura delle terre, loro diversità e na-  
tura, sulla seminazione de grani, loro stato na-  
turale e morbooso, e sulla coltivazione de prati  
naturali ed artificiali. Turin. 8.*

FRID. LUDW. CANCRINI *erste Gründe der Berg-  
und Salzwärkskunde. 6ter Theil, welcher die Mark-  
scheidekunst enthält. Frankf. 8 maj. m. K.*

Teoremas y problemas para examinar i salees usan  
qualesquiera aguas minerales. Par ANTON CAP-  
DEVILA. Madrit. 4.

Traité theorique et pratique des maladies inflam-  
matoires. Par M. I. F. CARRERE. à Paris. 8.

EIVSD. traité des eaux minerales de Rouffillon.  
ibid. 8.

I. F. CARTHEVSE diff. nonnullae selectiores phy-  
fico chymicae ac medicae varii argumenti post  
nouam lustrationem ad prelum reuocatae. Franc.  
ad Viadr. 8.

*Betrachtungen über das Verfahren, den Urin aus der  
Blase zu ziehen, nebst Beschreibung eines besondern  
Instruments, mit welchem man sicher denjenigen  
Urin abziehet, welcher mit dem Catheter nicht ab-  
geführt werden kann, von ALEXANDER CELLAI.  
Aus dem Italienischen übersetzt von IOHANN DA-  
VID HOMBERG. Breßlau. 8. m. K.*

*Versuch einer Vertheidigung der Einpfropfung der  
Blattern, worinnen gezeigt wird, daß weder das  
Gewissen dadurch verletzt, noch die Religion belei-  
digt werde. Aus dem Französischen des Herrn  
CHAIS durch M. H. BENEZE. Gotha. 8.*

*Ueber die Orientalische Gartenkunst. Aus dem Engl.  
des Herrn WILLIAMS CHAMBERS. Gotha. 8.*

A treatise of a cataract, its nature, species, causes  
and symptoms with a distinct representation of  
the operations by coaching and extraction. By  
GEORGE CHANDLER. Lond. 8.

Lezioni anatomiche recitate nel teatro del Spedale  
di S. Maria nuova dal Dr. COCCHI. Livorno. 4.

COLLIN observationes circa morbos cet. (v. comm.  
nostr. Vol. XXI. p. 137.)



Preceptes sur la fanté des gens de guerre ou hygiene militaire. Par Mr. COLOMBIER, Tom. I. à Paris. 8. (*Est continuatio libri Cl. COTE de médecine militaire.*)

Letera fulla circolazione del fluido scoperta in varie piante dell. Abb. BONAVENTURA CORTI. Modena. 8.

Du genre de philosophie propre à l'étude et à la pratique de la médecine. Par M. COSTE. a Nancy. 8.

DOMINICI COTVNNII de sedibus variolarum liber. Neapol. et Bologn. 8. (*v. comm. nostr. Vol. XIII. p. 411.*)

EIVSD. a treatise on the nervous sciatica, or nervous Hip Gout. Lond. 8. (*Latinum librum iam indicauimus, v. ib. Vol. XVIII. p. 125.*)

Nouvelles expériences et observations sur le fer; relativement a ce que M. DE BUFFON a dit de ce métal dans l'introduction a l'histoire des minéraux, qu'il vient de publier. Par M. du CORDRAY. à Upsal et à Paris. 12.

Le Dentiste Observateur, ou recueil abrégé d'observations tant sur les maladies, qui attaquent les gencives et les dents, que sur les moyens de les guerir etc. Par HONORE GAILLARD COVRETOIS. à Paris. 12. c. f.

A. CRAMERS *Anfangsgründe der Metallurgie, darinnen die Operationen sowohl im kleinen als großen Feuer ausführlich beschrieben und mit deutlichen Gründen und Erläuterungen begleitet sind; 2 und 3ter Theil. Blankenburg und Quedlinburg. Fol. m. K.*

CRAMER de vitlandsche Kapellen in Asia cet. (*v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 204.*)

CVLLEN synopsis nosologiae methodicae cet. aucta a I. B. M. SAGAR. Amstelodami. 4 maj. (Cl.

CVLLEN

(CVLLEN *librum v. comm. nostr. Vol. XX. p. 716*  
*et Cl. SAGAR systema morborum symptomaticum*  
*v. ibid. Vol. XVIII. p. 448. Praeterea Germa-*  
*nica versio Cl. CVLLEN exstat in libro, qui inscri-*  
*ptus est: W. CVLLEN Anfangsgründe der practi-*  
*schen Arzneywissenschaft. Erster Theil, welcher*  
*die Fieber und entzündungsartigen Krankheiten be-*  
*greift. Nebst einem Anhange, in welchem die sy-*  
*stematische Eintheilung der Krankheiten dieses Ver-*  
*fassers befindlich ist. Leipzig 1778. 8.)*

EIVSD. a letter to Lord CATHCART, concerning the  
 recovery of persons droroned and seemingly  
 dead. Lond. 8.

Flora Londinensis, or Plates and Description of  
 such Plants, as grow wild in the environs of  
 London with their descriptions in Latin and En-  
 glish, their uses in medicine, cet. By WILL.  
 CVRTIS. Fasc. I-X. ib. fol. c. f.

D'AUBENTON planches d'histoire naturelle. (v.  
*comm. nostr. Vol. XXI. p. 11.)*

DAWSON's cases in the acute rheumatism cet. (v.  
*ib. p. 594.)*

Exposition raisonnée des différentes méthodes l'ad-  
 ministrer le mercure dans les maladies vénérien-  
 nes. Par M. DE HORNE. à Paris. 12. (*lam de*  
*hac materia egit Cl. Auctor v. comm. nostr. dec.*  
*IIdae Suppl. III. p. 510.*

HEINR. FRID. DELIVS diss. inaug. sistens cau-  
 telas nonnullas circa secundinarum educationem.  
 Resp. C. H. Schreyer. Erlang. 4.

EIVSD. diss. inaug. sistens aduersariorum physico  
 medicorum collectionem. Resp. I. A. Ruth.  
*ibid. 4.*



- H. F. DELIVS diff. inaug. sistens aduersariorum cet.  
Resp. A. S. Muller. Erlangae. 4.
- EIVSD. diff. inaug. sistens aduersaria medica theore-  
tico practica et chemica nonnulla. Resp. H. L.  
Schmitjan. ib. 4.
- L'art du destillateur des eaux fortes. Par DE MA-  
CHY. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 22.
- Lettres et observations anatomiques, physiologi-  
ques et physiques sur la vie des enfans nais-  
sans, avec un mémoire sur l'établissement, d'un  
prix medaillique par M. l'Abbé DESMONCEAUX.  
à Paris. 8.
- Physique du monde démontrée par une seule cau-  
se et un seul principe commun à tous les corps.  
Par M. P. B. DELHAYES. à Versailles. 8.
- HENR. DEVENTERS *neues Hebammenlicht, 2 Theile.*  
*2te Auflage. Iena. 8. m. K.*
- Précis des maladies chroniques et aiguës. Par M.  
DIDELOT. à Nancy et Paris. 12. Tom. I et II.
- I. G. L. F. DIETRICH'S *Anfangsgründe zu der Pflan-*  
*zenkenntnis. Leipzig. 8. m. K.*
- F. M. DISDIER diff. inaug. sistens de transuersis iu-  
guli vulneribus theses anatomicas chirurgicas.  
Resp. M. Bousquet. Paris. 4.
- VAN DOEVEREN de cognoscendis mulierum mor-  
bis. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 61.)
- IAC. DOUGLAS myographiae comparatae specimen.  
Edimb. 8.
- DRURY'S Illustrations of natural history, Vol. II.  
(v. ib. Vol. XVIII. p. 145.)
- Catechisme sur l'art des accouchements pour les  
sages femmes de la campagne cet. Par M.  
AUGIER DUFOT. à Soissons. 12.
- Histoire de la chirurgie depuis son origine jusqu'à  
nos jours. Par M. DUJARDIN, Tom. I. à Pa-  
ris. 12.

Medical commentaries. By ANDR. DUNCAN. London. 8.

I. IAC. EBERTS *kurze Unterweisung in den Anfangsgründen der Naturlehre zum Gebrauche der Schulen. Leipzig. 8. m. K.*

S. P. EHLEN *diff. de fontibus medicatis prope Kissingen et Boclet. Resp. suo filio. Herbipol. 8.*

I. F. EHRHARDT *diff. de variis sulphur antimonii auratum parandi methodis eiusque vfu medico. Erford. 4.*

I. C. EHRMANN *diff. de colchico autumnali. Paris. 4.*

*Beyträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, aus den Danziger Wassern, von I. C. EICHORN. Danzig. 4. m. K. (Bona observata autodidacti, qui noua putat cuncta, quae vidit: omissa synonyma omnia, nec icones bonae, ita vt descriptiones saepe non sufficiant. Cl. O. F. MULLER dedit explicationem nonnullorum animalium in Naturae scrutatore.)*

A description of the Mangostan, and the Breadfruit: the first esteemed one of the most delicious; and the other the most useful, of all the fruits in the East Indies. By JOHN ELLIS. To which are added directions to Voyagers, for bringing over these and other vegetable productions, which would be extremely beneficial to the inhabitants of our West India Island. With figures. 4.

EIVSD. *Anweisung, wie man Saamen und Pflanzen aus Ostindien und andern entlegenen Ländern frisch und grünend über See bringen kann. Nebst einem Verzeichniß dergleichen ausländischen Pflanzen, deren Bau in den Amerikanischen Colonien zum Besten der Arzneywissenschaft, des Ackerbaues, und der Handlung befördert zu werden verdient. Aus dem Englischen übersetzt, mit einer Kupfertafel. Leipz. 8.*



- G. V. ENGESTROEM *Beschreibung eines mineralogischen Taschenlaboratoriums und insbesondre des Nutzens des Blaserohrs in der Mineralogie. Aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. F. C. WEIGEL, Greifswald. 8. m. K.*
- I. C. POL. ERXLEBEN *Anfangsgründe der Chymie. Göttingen. 8.*
- EIVSD. *physicalische Bibliothek. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 728.)*
- R. ESCHAFFERIAVX *diff. de cortice Peruuiano Monspel. 4.*
- C. E. ESCHENBACH *progr. in quo e principiis medicis sanguinem et aquam e CHRISTI crucifixi latere perfosso effluxum miraculi defectu non laborantem proponit. Rostock. 4.*
- FABRICII *systema entomologiae. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 197. v. supra p. 19.)*
- An essay on Bath Waters, Vol. II. By WILLIAM FALKONER, M. D. Lond. 8.*
- Treatise on the qualities of mercury. By M. N. D. FALK. Lond. 8.*
- EIVSD. *Abhandlungen über die venerischen Krankheiten in 3 mit Kupfern versehenen Theilen abgefaßt. Aus dem Engl. Hamburg. 8 maj.*
- EIVSD. *a description of Patagonia cet. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 729.)*
- EIVSD. *Beschreibung von Patagonien cet. nebst einer neuen Charte der Südlichen Theile von Amerika. Gotha. 8.*
- Enquiry into the propriety of bloodletting in consumptions. By SAMUEL FARR. Lond. 8.*
- Le Médecin de soi-même, ou methode simple et aisée pour guerir les maladies vénériennes, avec la recette d'un chocolat aphrodisiaque, aussi utile qu'agréable. Nouvelle Edition augmentée des analyses raisonnées et instructives de tous*  
*Tom. XXIII. Pars II. Aa les*

les ouvrages, qui ont paru sur le mal vénérien depuis 1740. jusqu'à présent, pour servir de suite a la Bibliographie de M. ASTRUC; et de la traduction françoise de la Dissertation de M. BOEHM. Par M. LE FEBVRE. à Paris. Tom. II.

*Bewährtes Mittel, den verborgenen und offenen oder eiternden Krebs aus dem Grunde zu heilen, von WILHELM REINHARD LE FEBVRE. Aus dem Französischen übersetzt von GEORGE ADAM IVNER. Strasburg. 8.*

ANTON. FEDERICI de causa mechanica praecipuarum luminis proprietatum Rom. 4.

M. I. N. FELDNER diss. inaug. exhibens prodromum ad historiam fungorum agri Vindobonensis. Vienn. 8.

P. FERMIN'S ausführliche historisch physicalische Beschreibung der Colonie Surinam, I Theil, aus dem Französischen übersetzt. Hamburg. 8. m. K.

EIVSD. höchstnöthiger Unterricht an das Landvolk von der thierischen Haushaltung als eine Fortsetzung von TISSOTS Unterricht, aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von M. F. ALIX. Frankfurt. 8.

Catechisme sur l'art des accouchements pour les sages femmes de la campagne. Par M. AVGIER DU FOI. à Paris. 12.

Riccerche filosofiche sopra la fisica animale del Signor Abbate FELICE FONTANA. Tom. I. Florent. 4.

EIVSD. Saggio di osservazioni sopra il falsa ergot o la tremelle. ib. 4.

A critical enquiry in tho the ancient and modern manners of treating the diseases of the urethra, with an improved methode of cure. By IESSI FORT. Lond. 8.



FORSKÅL descriptiones animalium. (v. comm. nostr.  
Vol. XXII. p. 503.

EIVSD. flora Aegyptiaco Arabica. (v. ib. p. eadem.)

FORSTEN de cantharidibus. (v. ib. 675.)

Dictionnaire raisonné d'hippiatrique cavallerie, manège et marechallerie. Par M. LA FOSSE. à Paris. 8 Vol. 4.

Observations sur les fievres putrides et malignes avec des reflexions sur la nature et la cause immediate de la fievre. Par M. FOVRNIER. à Dijon.

I. W. FRIES diss. sistens memorabilem casum in virgine de emollitione ossium. Argentor. 4.

L. F. FRISCH *Natursystem der vierfüßigen Thiere in Tabellen, zum Nutzen der erwachsenen Schuljugend.* Glogau. 4.

I. L. FÜSLINS *Verzeichniß der ihm bekannten Schweizerischen Insecten mit einer gemahlten Kupfertafel, nebst der Ankündigung eines neuen Insectenwerks.* Zürich und Winterthur. 4 maj. (Entomologis acceptissimus insectorum Helueticorum, quorum numerus est 1204, catalogus. Nomina Linneana, additis vernaculis, subiunctaque icone Schaefferiana, Roeseliana, aut alia vivis coloribus picta: tum locus natalis et interdum observatio sequitur. 20 novae species, e quibus in tabula addita bene depicta sunt sequentia insecta. f. 2. Cerambyx scabricornis. f. 1. Melloë fasciatus. f. 5. Gryllus cantans. f. 2. Papilio (Plebei. ruric. caudatus) coluteae. f. 6. Papilio (Plebei. ruric. caudatus) Melampus. f. 4. Aranea sanguinolenta LIN.? Liber simul indicatus est: SVLZERI succincta insectorum historia, de qua alio tempore.)

Chymie hydraulique pour extraire les sels essentiels des végétaux, des animaux et des minéraux par

le moyen de l'eau pure par le Comte DE LA GARAYE, augmentée des notes par M. PARMENTIER. à Paris. 12.

Detail de la nouvelle direction du Bureau des Nourrices de Paris; pour servir de Modele à de pareils etablissmens. On y a joint deux consultations medico legales relatives à cet objet. Par I. I. GARDANE. à Paris. 8.

EIVSD. *entdecktes Geheimniß der SVTTONS.* (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 135.)

\*\* GATTENHOFI progr. de abdominis crassi et obesi fatis. Heidelberg. 4.

EIVSD. diss. inaug. sistens inflammationis causas et euentus. Resp. I. G. Wendt. ib. 4.

EIVSD. progr. de viribus vitalibus. ib. 4.

DE GEER mémoires des insectes, Tom. V. (v. comm. nostr. dec. III. suppl. I. p. 92.)

IO. LVDOV. GERICKE diss. inaug. sistens miasmatalogiam generalem. Gotting. 4.

DAVID VAN GESSCHEER *Abhandlung von der Nothwendigkeit der Amputation.* Aus dem Holländischen von MATTHAEVS MEDERER. Wien. 8.

Memoria di G. ANTON GIACONVILLO sopra l'uso e gli utilissimi effetti del gipso nell' agricoltura. Venez. 4.

Lupulogie, ou traité des tumeurs connues sous le nom de Loupes, avec des details sur les effets et la manière d'agir des caustiques, des recherches sur le ganglion, le goître, les tumeurs encystées des paupières, la ranule, l'hydropisie de la moëlle epiniere et des reflexions sur les moyennes de perfectionner l'art de guérir. Par M. GIRARD. à Paris.

IOS. GISI diss. de necessario instrumentorum in arte obstetricia usu. Argentor. 4.



I. A. GLADBACH index in SWIETENII commentariorum tomos. V. L. B. 4.

*Geschichte und Heilung einer sieben und zwanzigjährigen äußerlichen Krankheit, welche durch den Aufenthalt eines Steins von 2 Lothen in der Harnröhre verursacht worden. Beschrieben von G. GLADBACH. Göttingen und Gotha. 8.*

F. G. GLAESER *Versuch einer mineralogischen Beschreibung der Grafschaft Henneberg, Churfürstlichen Antheils. Leipzig. 4.*

GLASER, M. D. *mit Anmerkungen und Erläuterungen verbesserte Preisschrift, wie die Feuerlöschanstalten in den kleinen Städten und Dörfern zu Verhütung großer Feuersbrünste zu verbessern sind. ib. 8.*

I. G. GLEDITSCH *systematische Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthümlichen physicalisch ökonomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaft, 2ter Band. Berlin. 8. (Systematicus atque in scientia forestali praestantissimus liber.)*

IO. FRID. GMELIN de alcalibus cet. (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 228.

EIVSD. *Abhandlung von den giftigen Gewächsen Deutschlands. (v. ibid. Vol. XXII. p. 422. vbi et reliqua huc pertinentia scripta de venenis Cl. Auctoris possunt reperiri.)*

S. G. GMELIN *Reise durch Rußland. (v. ibid. Vol. XXI. p. 303.)*

An history of eart and animated nature. By OLIVIER GOLDSMITH. Lond. 8.

E. G. GRAF diff. inaug. de petechiis sine febre. Gotting. 4.

An essay on the pestilential fever of SYDENHAM, commonly called the caol, hospital, ship, and camp fever. By WILL. GRANT, M. D. Cadell. 8.

- WILL. GRANT *Beobachtungen über die Fieber.* (v. comm. nostr. Vol. XXI. p. 549.)
- C. G. GRVNER *semiotica.* (v. *ibid.* p. 601.)
- EIVSD. *progr. Neque Eros neque Trotula, sed salernitanus quidam medicus, isque christianus auctor libelli est, qui de morbis mulierum inscribitur.* Ienae.
- EIVSD. *diff. inaug. sistens experimenta nonnulla cum calculis vesiculae felleae humanae instituta.* Resp. B. G. F. Conradi. *ib.* 4.
- G. S. GRVNER'S *Naturgeschichte Helvetiens in der alten Welt.* Bern. 8 maj.
- EIVSD. *Versuch eines Verzeichnisses der Mineralien des Schweizerlandes.* *ib.* 8.
- BERN. GVERARDS *Anfangsgründe der Geburtshülfe zum Gebrauch seiner Vorlesungen und Vortheil aller Geheyratheten.* Düsseldorf. 8.
- IO. GOTTL. HAASE *diff. inaug. de hydrocele interna.* Resp. et Auctore *Christ. Frider. Scheffler.* Lips. 4.
- ANT. DE HAEN *liber de magia.* Lips. 8 maj.
- EIVSD. *rationis medendi continuatae,* Tom. II. Vienn. 8 maj. c. fig.
- EIVSD. *Abhandlung von der sichersten Heilungsart der natürlichen Pocken.* *ib.* 8 maj.
- I. D. HAHNI *oratio de medico speculatore.* L. B. 4.
- EIVSD. *oratio de venenis.* Lips. 8. (*Prima editio Traiecti ad Rhenum est edita et a nobis recensita, v. comm. nostr. Vol. XX. p. 307.*)
- ALBERT. DE HALLER *appendices in SCHEVCHZERI agrostographiam.* Tigur. 4. (v. *ib.* Vol. XXI. p. 50.)
- EIVSD. *bibliotheca chirurgica,* Tom. II. (v. *ibid.* p. 503.)
- EIVSD. *Anfangsgründe der Physiologie des menschlichen Körpers. Aus dem Lateinischen übersetzt von* I. SAM. HALLEN. 7ter Band. Berlin. 8 maj.



DV HAMEL DV MONCEAU *Abhandlung von Obſtbäumen.* - *Aus dem Franzöſiſchen überſetzt von c. c. OELHAFEN.* Nürnberg. 4 maj. m. K.

EIVSD. *Naturgeſchichte oder ausführliche Beſchreibung der Erdbeerpflanzen.* ib. 4 maj. m. K.

Fauna Norvegica red CHRISTOPHER HAMMER. Kiöben.

Elements of the practice of Midwifery. By ALEX. HAMILTON. Lond. 8.

The english Lepidoptera: or the Aurelians Pocket companion: containing a Catalogue, of upwards of 400 Moths and Butterflies, the food of their reſpective caterpillars, the time of changing into chryſalis, and appearance in the winged ſtate; alſo, the places, where they are uſually found, with a concise deſcription. By MOS. HARRIS. 8.

PETR. IMMAN. HARTMANN in paedicatorem noxium et infeſtum reipublicae ciuem. Reſp. *Dav. Henric. Stoltenberg.* Traj. ad Viadr. 4.

EIVSD. diſſ. inaug. de cardialgia colicaque funeſta ab ingeſtis orta et multiplici ſpaſmorum genere, inprimis St. *Viti ſtipata.* Reſp. *D. F. Kruger.* ib. 4.

*Beſchreibung der Reiſe um die Welt und Entdeckungen im Südmeer. Engliſch und Deutſch von HAWKESWORTH und I. F. SCHILLER, hiſtoriſch zuſammengefaßt und beſchrieben von I. L. SCHWARZ, I und 2ter Theil. Hamb. (v. comm. noſtr. Vol. XX. p. 464.)*

CHRIST. AVG. HELD de tempeſtuo corticis Peruviani uſu in febribus inflammatoriis. Gotting. 4.

An eſſay on glandular ſecretion, containing an experimental enquiry into the formation of Pus: and a critical examination into an opinion of M.

JOHN HUNTERS, that the Blood is alive. By JAMES HENDY, M. D. Lond. 8.

HENKELS *Abhandlung der chirurgischen Operationen, VII. Stück.* (v. comm. nostr. decad. II. dae Suppl. p. 728.)

Dictionnaire d'Histoire naturelle, qui concerne les Testacées ou les Coquillages de Mer, de Terre, et d'eau douce, avec la Nomenclature, la Zoömorphose, et les differens systêmes de plusieurs célèbres Naturalistes, anciens et modernes. Ouvrage, qui renferme la description détaillée des figures des coquilles, l'explication des termes usités, les propriétés de plusieurs, et les notes en partie des endroits où elles se trouvent. Par l'Abbé FAVART D'HERBIGNY, 3 Tomes. à Paris. 8. (*Ad doctrinam de conchyliis utilis liber.*)

F. S. HERMANN diss. inaug. de vera natura cuticulae eiusque regeneratione ex mente Cl. KLINGKOSCH. Prag. 8.

J. L. HERRMANN'S *Abhandlung und gegründete Wahrnehmung von der Kriebelkrankheit, so in Niederhessen vom Jahr 1771 bis zum Ende des Heumonnats 1772 epidemisch grassiret, zum Beytrag einer vollständigen Geschichte von dieser Epidemie.* Cassel. 8.

J. L. HEYDERICH diss. inaug. sistens principia musti. Tyrnaviae. 8.

IO. HILL horti Malabarici nova editio. Lond. 4. (*Iam quaedam de hac nova editione edisseruimus. v. comm. nostr. Vol. XX. p. 152.*)

ELIUSD. enquiries into the nature of a new mineral acid discovered in Sweden etc. To which is added an Idea of an artificial arrangement and of a natural method of fossils etc. ib. 8. (*Id, quod additur, est tantummodo nova editio systematis Auctoris. Minerale, in quod inquisiuit Cl. HILL, est fluor*



*fluor spatiosus s. fluor mineralis WALLERII, a Cl. SCHEELE in actis Academiae Regiae Suecicae anni 1771. Vol. XXXII. v. comm. nostr. Vol. XX. p. 275. iam examinatus. Cl. HILL autem putat inesse huic spato combinationem acidi Vitriolici cum steatite.)*

*Theorie der Gartenkunst von C. C. L. HIRSCHFELD. Leipzig. 8.*

*IO. HOFMANNS Anleitung zur Naturlehre für Ungelehrte. ib. 8.*

*CHRIST. GOD. HOFMANN commentarius de coemeteriis ex vrbibus tollendis. Francof. 8.*

*F. HOFMANNS Abhandlung von der gewissen Vorhersehung des Todes in Krankheiten, zum nützlichen Unterricht anfangender Aerzte sowohl, als auch besonders derer Herren Geistlichen auf dem Lande. Aus dem Lateinischen übersetzt, und mit praktischen Anmerkungen erläutert von B. W. RÖDDER. Fr. und Leipzig. 8.*

*I. R. S. HOLDEFREVND Erzählungen merkwürdiger Krankengeschichte. Braunschweig und Wolfenbüttel, 8.*

*I. D. HOMBERG anatomisch und chirurgische Fragen und Antworten zum Nutzen und Gebrauch derer, die sich der Heilungskunst befleißigen. Breslau. 8.*

*S. HORVATOVSKY flora Tyrnaviensis indigena P. I. Tyrnav.*

*Exposition raisonnée des différentes méthodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes précédée de l'examen des preservatifs. Par M. DE HORNE. à Paris. 12.*

*Remarks on the observations made in the late voyage towards the North Pole for determining the acceleration of the pendulum in latitude 79° 50. By SAMUEL HORSLEY in a letter to CONSTANT. JOHN PHILIPPS. Lond. 4.*

HOVTTYN nautuurlyke historie der Dieren. ( *u comm. nostr. Vol. XXI. p. 555.* )

Anatomia vteri grauidi tabulis illustrata Auctore  
GUIL. HUNTER. (*Hunc splendidissimum librum  
non diu ante indicauimus.*)

IO. IACQVEREZ diss. inaug. de partu quodam natu-  
rali laborioso propter gangraenam in vtero prae-  
existentem et rupturam vteri. Argentorat. 4.

N. I. JACQVIN flora Austriaca seu plantarum sele-  
ctarum in archiducatu Austriae sponte nascentium  
icones et descriptiones, Tom. III. Vienn. fol.

IO. HENR. JAEGER spicil. inaug. de pathologia ani-  
mata, praemissa tractatione de generatione  
aequiuoca. Gotting. 4.

G. F. IAEGENSCHMIDT *Unterricht für die Hebam-  
men etc- 1ster Theil, welcher die Geburtshülfe ent-  
hält.* Carlsruhe. 8.

G. I. IAENISCH diss. inaug. sistens phthiseos ex vl-  
cere curationes antiquas. Gotting. 4.

IO. IASKIEWICZ diss. inaug. sistens pharmaciam re-  
gni vegetabilis. Vienn. 8.

IAC. FRID. ISENFLAMM diss. inaug. de vi corpo-  
rum primitiua. Resp. L. C. Voigt. Erlang. 4.

*Sendschreiben an den Herrn Stadtchirurgus HELLMANN in Magdeburg, dessen Urtheil, die Lobsteini-  
schen Staarmesser betreffend von IO. HEINR. IVNG.  
Fr. am Mayn.* 8.

BALTH. IO. IVRTZICK diss. inaug. de noxiis reper-  
cutientium effectibus. Hal. Sax. 4.

*Das unumstößliche Naturzeugniß der besten Abhol-  
zungszeit von MELCHIOR CHRIST. KAEPLER.  
Meinungen.* 8.

*Anmerkungen über die Marktscheidekunst, nebst einer  
Abhandlung von der Höhenmessung durch das Ba-  
rometer von A. G. KAESTNER. Göttingen.* 8.



- AFFANASEI KAWERSNIEW** *von der Abartung der Thiere. Leipzig. 8.* (In nutrimentis et climate ponit varietatum causas.)
- I. G. A. H. KEYSERS** *Unterricht von den Nutzen und besondern Heilungskraft der Eicheln, in Absicht auf die Darrsucht oder Auszehrung der Kinder. Braunschweig. 8.*
- \* \* **KIES** *diff. de effectibus electricitatis in quaedam corpora organica. Resp. C. H. Koeslin.*
- IOS. THED. KLINKOSCH** *dissertationes medicae selectiores Pragenses. Vol. I. Prag. 4 maj. c. tabb. aen.*
- IAC. KOECHLIN** *diff. de felicitate empiricorum medicastro- rum diuersa a felicitate veri medici. Basil. 4.*
- I. KOPP** *diff. de Sinapi optima medicina. Duisb. 4.*
- CAR. ERNST. KOSITZKI** *diff. inaug. de noxis fasciarum, gestationis et thoracum. Gotting. 8.*
- IAC. KOSTERZEWSKI** *diff. de gratiola. Vienn. 8.*
- IO. AVG. KRATZER** *physikalische Discourse über die sämtliche Bienenzucht. Wien. 8 maj.*
- G. R. KRICK** *diff. sistens arthritidis vagae decursum, ex recentibus exemplis descriptum. Duisb. 4.*
- I. G. KRÜNIZ** *ökonomische Encyclopedie oder allgemeinen System der Land- Haus- und Staatswirthschaft in alphabetischer Ordnung, 4ter Band. Berlin. 8 maj. m. K.*
- DE KRZOWITZ:** *historia febrium. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 322.)*
- Discours prononcé aux écoles de médecine pour l'ouverture solennelle des écoles de chirurgie le 29 November 1775. par M. CLAUDE LAFISSE. à Paris. 4.**
- P. A. LAMPE** *de noxis ex sepultura in templis. Argentor. 4.*

Ricerche fisiche interno alla salubrità dell' aria di  
MASSIGLIO LANDRIANI. Mayland. 8.

I. H. LANGENS *Briefe über verschiedene Gegenstände  
der Naturgeschichte und Arzneykunst. Lüneburg  
und Leipzig. 8.*

W. I. N. LANGSVERT *historia medica morbi epi-  
demici siue febris putridae ann. 1771 et 1772.  
Prag. 8.*

\*\* DE LASSVS *diff. de hernia inguinali congeni-  
ta. Resp. P. I. Pellutan. Paris. 4.*

EIVSD. *diff. sur la nymphe, qui a remporté le prix  
double de physique en 1773. proposé par l'Aca-  
demie de Lyon. Genev. 8 maj.*

LEAKE *über verschiedene Krankheiten der Kindbette-  
rinnen etc. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 79.)*

M. F. LEDERMÜLLERS *physicalisch microscopische Ab-  
handlung von Asbest, Amiantstein oder Erdflachs  
und einigen andern mit derselben verwandten Fos-  
silien. Nürnberg. 4. m. K.*

J. D. LEERS *flora Herbornensis exhibens plantas  
circa Herbornam Nassoviorum crescentes. Her-  
born. 8. c. fig.*

ANTON DE LEFFLERAN *diff. inaug. de paralyfi.  
Vienn. 8.*

L. B. LENTINS *Beobachtungen einiger Krankheiten  
und der Entstehung des Mutterkorns. Göttingen. 8.*

IO. GOTTFR. LEONHARDI *de salibus fuccineis.  
Lips. 4.*

EIVSD. *observationes chemicae. (v. comm. nostr.  
Vol. XXI. p. 229.)*

LEPECHIN *Tagebuch der Russischen Reise. (v. ib. Vol.  
XXII. p. 136.)*

NATHAN. GODOFR. LESKE *progr. physiologiae ani-  
malium commendatio. Lips. 4. (Generalia de  
corde et pulmonibus animalium, iam cognita,  
simul-*



simulque ostenditur, quanta etiamnum in Zootomia detegenda restent.)

EIVSD. theses philosophicae. ib. 4. (*Praemittuntur quaedam de conservatione corporum naturalium.*)

Le voyageur Naturaliste, ou Instruction sur les moyens de ramasser les objets d'Histoire Naturelle, et de les bien conserver, avec des observations propres à étendre les recherches relatives aux connoissances humaines en general par I. C.

LETTSON, Doct. en Med. etc. traduit de l'anglois. La seconde edition, corrigée et augmentée. à Amsterdam. 12mo.

Connoissance pratique des medicamens les plus salutaires par M. LEWIS. à Paris. 12.

LIDBECKS afhandling om nyttan of medicinal växters etc. (v. comm. nostr. Vol. XXII. p. 359.)

PAVL. CHRIST. LINCKE ep. grat. de hellebori viridis in fluore albo venereo usu medico. Servest. 4.

JACOB LIND'S *Abhandlung vom Scharbocke. Nach der 2ten Ausgabe aus dem Englischen von D. 10.*

NATHAN. PEZOLD. Riga. 8.

LINNAEI vollständiges Natursystem von MÜLLER. v. comm. nostr. Vol. XX. p. 28.)

EIVSD. *Gattungen der Pflanzen und ihre natürliche Merkmale nach der Anzahl, Gestalt, Lagen und Verhältniß aller Blumentheile. Nach der 6ten Ausgabe, und der 1 und 2ten Mantiße übersetzt von I. I. PLANER. Erfurth. 8 maj.*

EIVSD. *Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem von C. F. DIETRICH. Leipzig. 8.*

EIVSD. diff. inaug. sistens plantas Surinamenses. Resp. Jacob. Alm. Upsal. 4

EIVSD. diff. inaug. de scorbuto. Resp. Ern. D. Salomon. ib. 4.

- LINNAEI diff. inaug. sistens medicamenta purgantia. Resp. *Io. Rotheram*. Upsal. 4.
- EIVSD. diff. inaug. de ledο palustri. Resp. *Io. P. Westring*. ib. 4.
- EIVSD. diff. inaug. bigas insectorum sistens. Resp. *Andr. Dahl*. ib. 4. c. fig.
- EIVSD. diff. inaug. sistens canones medicos. Resp. *Sueno And. Hedin*. ib. 4.
- EIVSD. diff. inaug. de perspiratione insensibili. Resp. *Nicol. Avellan*. ib. 4.
- EIVSD. diff. de opio. Resp. *Georg. Eberh. Georgio*. ib. 4.
- Saggio e memoria della cura preservativa da l'idrofobia eseguita in dieci persone ott ese da cane rabioso da *IGNATIO LOTTI*, in Venet. 4.
- Ladifesa degli oleosi nella cura della malattia biliosa di *ANTONIO LIZZARI*. ib. 8.
- Elemens de la theorie et de la pratique de la chimie. Auctore *MACQVER*. à Paris. 8.
- I. MARCVS diff. inaug. de diabete. Goetting. 4.
- CHRIST. GVIL. HENR. DE MARE'ES diff. inaug. de animi perturbationum in corpus potentia. ib. 4.
- An essay on gleets. By *I. P. MARAT*. Lond. 4.
- EIVSD. de l'homme ou des principes et des loix, l'influence de l'ame sur le corps et du corps sur l'ame. Tom. I. à Amsterdam. 8.
- Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre epidemique, fait et imprimé par ordre du Gouvernement. Par *M. MARET*. à Diion. 12.
- Delle acqua termali di Vinadio usate in lavando, bagno doccia, stuffa, fango, mufse, commentario di *GIOV. ANT. MARINO*. Turin. 8.
- Hortus Romanus, secundum systema *I. P. TOVRE FORTII* a *NICOLAO MARTELLIO*; Linneanis characteribus expositus, adiectis singularum plantarum analysi ac viribus. Species suppedi-  
tabat



tabat ac describebat LIBERATVS SABBATI.  
(*Huius continuati operis tomum primum paulo ante  
recensuimus.*)

IO. IAC. MARTIN diff. sistens experimenta et cogi-  
tata nonnulla circa lixiuim sanguinis. Argent. 4.

F. H. W. MARTINI *allgemeine Geschichte der Natur*,  
2ter Band. Berlin. 8 maj. (Mortuo Auctore, a  
Societate Physicorum continuabitur.)

EIVSD. *neues systematisches Conchyliencabinet*. 3ter  
Band. 3te Ausgabe. Nürnberg. 4. m. K. (Cl. CHEM-  
NIZ continuationem libri vtilissimi suscepit.)

Elements of natural History. By THOM. MARTYN,  
B. D. Cambridge et London. 8. (*Est synopsis  
historiae naturalis iuxta systema LINNAEI. Spe-  
cies tamen ex BUFFONO, PENNANTO aliisque au-  
ctae sunt. Hoc volumen mammalia tantum con-  
tinet.*)

Reflexiones de natura, causis et curatione cancri  
cet. Auctore CAIETANO MARVLLA. Florent. 8.

IO. GOTTLÖB MATTHIAS diff. inaug. sistens gene-  
ralissimam dispositionis haereditariae et morbo-  
rum inde determinatorum theoriam. Hal. ad  
Sal. 4.

F. L. F. MAXIMILIAN diff. inaug. de alcali vegetabi-  
li, quatenus sit eductum et productum. ib. 4.

Reliqua proxime.

---

Contenta in hac parte.

I. Journal de medéc. Par M. ROUX. Tom. XLIII et XLIV.	pag. 195
II. Chimie experimentale et raisonnée. Par M. BAYME. Tom. II.	211
III. Florae Danicae. Vol. III. et IV.	235
IV. JACQVIN miscellanea Austriaca ad botanicam, cet.	241
V. KOELREUTERS <i>entdecktes Geheimniß der Cryptogamie.</i>	247
VI. LUDWIG de sexu muscorum detecto	251
VII. WURTZ conamen mappae generalis medicamentorum cet.	252
VIII. MURRAY apparatus medicaminum cet. Vol. II.	260
IX. GRVNER via et ratio formulas conscribendi	265
X. <i>Neue Sammlung von Versuchen und Anmerkungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, I Theil</i>	268
XI. PROCHASKA de carne musculari.	273
XII. EIVSDEM de structura neruorum.	276
XIII. BÖHMER diff. de nono pare neruorum cerebri.	277
XIV. ESENFLAMM von Nerven.	279
XV. ACRELLS <i>chirurgische Vorfälle, I und 2ter Theil.</i>	284
XVI. MICHAELIS de angina polyposa.	293
XVII. ELSNER von der Brustbräune.	303
XVIII. TRALLES de vesicantibus.	306
XIX. HUNTER de vtero grauido.	329
XX. Hortus Romanus. Vol. I.	337
XXI. BOSCH hist. constitutionis epidemicae verminosae.	342
XXII. Noua physico medica.	ibid.
XXIII. Index scriptorum physico medicorum, quae anno 1775 prodierunt.	345